

DESIGNATIO
PLANTARUM
QUAS
HORTUS

AUGUST. FRIDERICI WALTHERI
PATHOLOGIAE PROFESSORIS LIPSIENSIS
COMPLECTITUR
ACCEDUNT NOVAE PLANTARUM
ICONES XXIV.

LIPSAE A. M DCC XXXV.

APUD JOH. FRID. GLEDITSCHII B.
FILIIUM.

Joh. Th. Hoefel.

RECEIVED

LIBRARY

OF

THE

UNIVERSITY OF

CHICAGO

ILLINOIS

1892


NOV 12

1892

1892



PRAEFATIO.

uintus iam agitur annus, ex quo plantis exoticis, atque indigenis colligendis, aptare hortum priuatum, et in eo paullo curiosius illas colere, ac propagare coepimus. Quarum numerus beneuolentia amicorum, proprio labore, et qualibuscunque impensis ita adauctus est, ut, postquam cunctas, licet alienis saepe nominibus acceptas, cum melioris notae iconibus comparauimus, nunc demum opportunum esse videatur, designationem earum typis imprimendam maturare. Id plantas, atque icones conferendi studium, ordinemque omnium et singularum constituendum iuuat, ac plurimum promouit insignis Horti Lugduno-Bataui Index, quem Clarissimus BOERHAVEN, summo cum Botanophilorum adplausu, ante aliquot annos euulgauit. Quos hic Celeberrimus Vir rei herbariae Scriptores, una cum iconum delectu, quam diligentissime facto, adhibuit, eos, si paucissimos exceperis, nos quoque consulimus; quanquam subinde diuersis librorum editionibus, noua TABERNAE MONTANI, alia, et non nihil diuersa JOH. BAUHINI, LOBELII, et nonnullorum aliorum usi sumus. Inter alia, quae quidem passim hoc

P R A E F A T I O.

opusculo suppleuimus, ex recentiori, et ab Cl. DILLENIO in lucem edito Horto Elthamensi accesserunt loca; et haec citantur, quoties literae *H. E.* leguntur. Cum vero Botanophilorum nemo opere illo, indiceque locupletissimo Horti Lugdunensis hodie carere facile possit; nos in hoc Catalogo laudati Auctoris studio, atque doctrina multum confisi, fere synonymis, et signis, quae penes illum occurrunt, perpetuo utimur. Praeterea quarundam plantarum, nouiter detectarum, aut dubiarum icones, deinde desideratas alias, denique paucas, et quidem rarius apud Botanicos Scriptores obuias, utcunque fieri iam potuit, adiicere non dubitauimus; et ubi praesens instituti nostri ratio tulisset, alias plures desideratas adiiciendo, tabularum defectum, quem hac occasione deprehendimus, tam nostri, quam aliorum causa supplere studuissimus. Quare non miraberis, LECTOR BENEVOLE, si ad calcem operis ramos sine floribus subinde delineatos conspicias. Nam quod in hoc genere, perinde, ac in delineatarum plantarum descriptione deest; id vel leuiori opera alii addent, vel nos, ubi commode fieri poterit, aliquando luculentius exhibebimus.

1850



Asplenium adnigrum L.
Folia ovata, basi cuneata, apice emarginata.



Abrotanum incanum et odoratum
folio tridentato Hort. Carolin.



CLASSIS PRIMA

PLANTARUM

IN

HIBERNACULO ADSERVAN-
DARUM.

A.

No.

A BRO TANUM Africanum, folio tereti, tri-
dentato, *Horti Carolsruh; ramum vid.*
nostra Tab. I.

- - Africanum subincanum, *Plukn. Phyt. T.*
121. F. 2.

ABSINTHIUM latifolium arborescens, *Dodon.*
1. 2. 1. Boerb. I.

- - maritimum, Lauendulae folio, *5. Moris.*
f. 6. T. 1. Boerb. V.

- - folio tenui, multifido, camphoram spi-
rans; *Col. Rar. 1. 54. Boerb. VIII.*

A CACIA vera, folio scorpioidis leguminosae,
Dod. prima, 6. 1. 13. Boerb. I.

- - Indica Farnesiana, folio scorpioidis le-
guminosae, *Barell. ic. 1138. obs. 1366.*
Boerb. III.

A

ACA-

- No. ACACIA, quae Acaciae similis Americana, spinis cornu similibus, *H. A. P. I. F. 107. Boerb. IV.*
- - Americana, spinis albis, longis, crassioribus, *H. Pis. T. 1. F. 1. Boerb. V.*
 - - spinosa, floribus oblongis, luteis, trunco adhaerentibus, *H. Pis. T. I. F. 3.*
 - - Africana, quae Acaciae similis, foliis myrti parvis, aculeatis, pinnatis, flore coccineo, tetrapetaloide, *Boerb. XII. ramum vid. nostra Tab. II.*
- ACAJOU, seu Anacardium officinarum; Acaiaiba *Pison. p. 120. H. M. 3. 65; Boerb. P. II. 262.*
- ACANTHUS fatuus, mollis Virgilii, *Rivin. Monopetal. Boerb. I.*
- ACER maximum, foliis trifidis, aut quinquefidis, Virginianum; *Plukn. Phyt. T. 123. F. 4. perperam Negundo dictum; Boerb. V.*
- - Virginianum odoratum; Liquidambari arbor Styraciflua, *Plukn. T. 42. F. 6; H. A. P. I. 191; Boerb. VI.*
- ACETOSA arborescens, subrotundo folio, Insul. Fortunat. *Plukn. Phyt. T. 252. F. 3. Boerb. IV.*
- ACRIVIOLA, flore pleno, maiore; quo differt ab annuo Cardamindo, *Rivin. Pentap. Boerb. I.*
- ADHATODA maior; Ecbolium, *Riv. Monop. Boerb. I.*
- - minor Zeylanensium, angustifolia, flore luteolo, *Plukn. Phyt. T. 280. F. 1. Boerb. II.*
- AGERATUM; quod alias vocatur Ptarmica Orientalis fantolinae folio, flore maiore; *Boerb. V.* AGE-



*Acaciae foliis Myrti minoris
aculeatis similis.*

11

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



Alaternoides Ilicis folio.



Alhenna vel Henna Arabum

- No. AGERATUM Peruvianum, arboreum, folio lato, ferrato, *Plukn. Phyt. T. 27. F. 1. Boerb. VII.*
- ALATERNOIDES Africana, Ericae folio, floribus albicantibus, et muscosis, *H. A. P. II. F. I. Boerb. I.*
- - Africana, Telephii legitimi Imperati folio, flore viridi, *H. A. P. II. F. 2. Boerb. II.*
- - Africana, Lauri ferratae folio, *Commel. Prael. 61. F. II. Boerb. III.*
- - Africana, Ilicis folio crasso, hirsuto; *Boerb. IV; ramum vid. nostra Tab. III.*
- ALATERNUS Hispanica, folio latiore, *2. Tabm. p. 1456; Celastrus Theophrasti Clus. Cur. post. p. 4; Boerb. I.*
- - latifolia, Celastrus dicta, folio ex aureo et viridi variegato, *Boerb. II.*
- - Africana, Lauri ferratae Stapelianae foliis, *Plukn. Phyt. T. 126. F. 1.*
- - argentea, seu foliis ex albo variis, *Boerb. VII.*
- ALHENNA, sive Henna Arabum; Alcanna *Rauwolfii*, flore luteolo, odorato, *L. 4. itin. nro. 60; videtur esse Mail-Anschi Hort. Malab. Tom. I. F. 40. p. 73. ubi vid. fructus et semina; siccatum ramum exhibet nostra Tab. IV; cum planta, ex semine nata, nondum apud nos floruerit.*
- ALKEKENGI, fructu paruo verticillato; *Morif. Solanum vesicarium 20, Barell. ic. 149; Boerb. VII.*
- ALOE, vulgari similis, maior, maculis albis picta, succo foetidior; vera vulgaris *Munting. Aardg. Fig. 96; Boerb. II.*

- | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. | ALOE vera, minor ; Succotrina angustifolia, spinosa, flore purpureo <i>H. A. P. I. F. 48; Boerb. III.</i> |
| - | - Americana , muricata , <i>J. B. Munt. Aardgew. F. 91; 2. Moris. f. 4. T. 22; Boerb. V.</i> |
| - | - Americana, muricata, foliorum margine luteo, <i>H. Carolsr.</i> |
| - | - Americana, folio viridi, rigidissimo, foetido ; Piet dicta; <i>H. A. P. II. F. 18. Boerb. X.</i> |
| - | - Americana, folio Yuccae, arborescens, <i>Commel. Prael. 64. F. 14; Boerb. XLV.</i> |
| - | - Zeylanica, pumila, folio variegato, <i>H. A. P. II. F. 21. Boerb. XLII.</i> |
| - | - Africana, caulescens, foliis glaucis, caulem ambientibus, spinosis , <i>H. A. P. II. F. 14. Boerb. XXI.</i> |
| - | - Africana, caulescens, folio crasso, obscure viridi, spinis ad latera, et in dorso armato , <i>Comm. Prael. 71. F. 20; mitraeformis spinosa, H. E. p. 21. F. 19; Boerb. XXXIX.</i> |
| - | - Africana, caulescens, maculata, spinosa maior , <i>H. E. p. 17. H. A. P. II. F. 5. Boerb. XIX.</i> |
| - | - Africana, caulescens, perfoliata, glauca, non spinosa, <i>Commel. Prael. F. 23. p. 74; Crassula altissima, perforata, H. E. p. 114; Boerb. XII.</i> |
| - | - Africana, arborescens, montana, non spinosa, folio longissimo, plicatili, flore rubro, <i>H. A. P. II. F. 3. Boerb. XXXIV.</i> |
| - | - Africana, margaritifera maior, folio in summitate triangulari, flore subviridi, <i>H. A. P. II. F. 10. Boerb. XXIX.</i> |

- | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. | <p>A L O E Africana, margaritifera minor, <i>H. E. p. 19. F. 17, H. A. P. II. F. 11.</i></p> <p>- - Africana, margaritifera, minima, <i>H. E. p. 20. F. 18. Boerb. XXX.</i></p> <p>- - Africana humilis, spinis inermibus, et verrucis obsita, <i>Commel. Prael. p. 77. F. 26; Pl. Rar. F. 46; H. Pis. T. 6. Boerb. XXIII.</i></p> <p>- - Africana, folio breuissimo, crassissimo, flore subuiridi, <i>H. A. P. II. F. 6. H. Pis. Tab. 5.</i></p> <p>- - Africana, sessilis, foliis carinatis, verrucosis, <i>H. E. p. 22. F. 20.</i></p> <p>- - Africana, humilis, arachnoidea, <i>Commel. Prael. F. 27. p. 78.</i></p> <p>- - Africana, minima, atrouiridis, spinis herbaceis numerosis ornata, <i>Boerb. XL. cum icon.</i></p> <p>- - Africana, humilis, triangularis, folio ex albo et viridi variegato, <i>Commel. Prael. F. 28. pag. 79; Pl. Rar. F. 47; Boerb. XXIV.</i></p> <p>- - Africana, ab utraque parte albicantibus maculis, <i>Commel. H. A. P. II. F. 8. Boerb. XXXV.</i></p> <p>- Africana, flore rubro, folio plano, verrucis, ab utraque parte albicantibus notata, <i>H. Pis. T. 8.</i></p> <p>- - Africana, erecta, rotunda, folio paruo, et in acumen rigidissimum exeunte, <i>H. E. p. 16. Comm. Prael. F. 32. Boerb. XXXIII.</i></p> <p>- - Africana, folio triangulo, longissimo, et angustissimo, floribus luteis, foetidis; Iris uvaria, vulgo dicta; <i>H. A. P. II. F. 15. Boerb. XLIII.</i></p> |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- No. ALOE Africana eadem; sed omni parte longe maior, et laetius seminifera, *Boerb. XLIV.*
- - Africana, erecta, triangulari folio viscoso, *Commel. Prael. p. 82. F. 31. H. E. p. 15. Boerb. XXXII.*
 - - Africana, humilis, folio ex albo et viridi variegato, florum petalis reflexis, rubris, *H. Pis. T. 7.*
 - - Africana, caulescens, foliis magis glaucis, caulem amplectentibus, et in mucronem obtusiorum desinentibus, *Comm. Prael. 68. F. 17. Boerb. XIII.*
- ALTHAEA frutescens Lusitanica, folio rotundiore, undulato, ad solem micante; *Boerb. III.*
- - peregrina, erecta, flore purpureo, striato; *Althaea frutex, 1. Clus. H. XXIV. Lobel. obs. p. 373; Boerb. VII.*
 - - maritima, arborea, Veneta, *H. Eyst. Aest. O. 6. f. 6. Fig. 1; paruo flore; Boerb. IX.*
- AMARANTHUS Siculus, radice perenni, *Boccon. Rar. T. 9. p. 16. Boerb. XVII. gen. 2.*
- AMYGDALUS nana, flore pleno, quo differt ab *Munting. Aardg. Tab. 7.*
- ANACAMPSEROS frutescens, folio Portulacae maiore; *Crassula H. E. p. 120; Telephium Portulacae folio, 4. Moris. Boerb. I.*
- ANAGYRIS foetida, Cretica, oblongis foliis, floribus luteis, *Dodon. 6. 2. 27. Boerb. P. II. 27.*
- ANANAS aculeatus, fructu pyramidato, carne aurea, *H. A. P. I. F. 57. Boerb. I.*
- - aculeatus, fructu pyramidato, carne rubra; idem *Boerb. I.*

- No. A N A N A S syluestris, Brasiliana; Kerbita *Plukn. T. 258. F. 3; Boerb. II.*
- - Americana, syluestris; *Plukn. T. 258. Fig. 4; Pinguin dicta; Boerb. III.*
 - - non aculeatus, Pitta dictus, *Plukn. T. 258. F. 2. Boerb. IV.*
 - - folio vix ferrato, lucide virens, *H. E. p. 25. F. 23. 24. Boerb. V.*
- A N E M O N O S P E R M O S Africana, folio Cardui benedicti, florum radiis intus sulphureis, externe, ex luteo purpurascens, *H. A. P. II. 43. F. 22.*
- - Africana, folio Cardui benedicti, florum radiis intus albicantibus, extus purpurascens, *H. A. P. II. 45. F. 23.*
 - - Africana, folio Jacobaeae, tenuiter laciniato, flore aurantio pulcherrimo, *Boerb. IV. cum icon.*
- A N O N I S purpurea praecox, *Zanon. 66. F. 26. Boerb. VIII.*
- A N T I R R H I N U M, angusto folio Linariae, eleganter variegato, flore rubro, rictu luteo, *Boerb. XI.*
- A P O C Y N U M Americanum, folio Androsaemi maioris, flore Lilii conuallium suauiter rubente, *16. Moris. Bocc. Rar. T. 16. F. 3. Boerb. X.*
- - erectum, fruticosum, folio subrotundo, glauco, *3. Raii, J. B. 2. 134. Boerb. XI.*
 - - erectum, Africanum, Salicis folio, fructu villoso, *2. Raii, Herm. P. B. 24. Boerb. XVI.*
 - - erectum, foliis breuibus, obtusis, et crassissimis, cruciatim positissimis, forma illis Cenanam Tezcoquensis *Recch. 362.*

No.

similibus; an telephii folio *Par. Bat.*
p.26? vel *Boerb. XIII?*

APOCYNUM Canadense ramosum, flore ex vi-
ridi albicante, filiqua tenuissima, 14.
Morif. f.15. T.3.

AQUIFOLIUM, folio aurato, *Munting. Aard-*
gew. p.164. F.38. Boerb. II.

- - echinata folii superficie, *Corn.180. Boerb. X.*

ARBOR saponaria, Americana, *Raii Tom. II. p.*
1548; *Quity Pison. p.162.*

ARBUSCULA Afra, folio aculeato Ilicis, *H.E.*
p.36, *Boerb. P. II. p.263.*

- - Americana, alatis foliis integris, ad Iasmi-
num vulgatus accedentibus, rachi
in alas foliaceas explicata; an *Boerb.*
II.263? ex nucleo, viridi pulpa, o-
leo fragrante turgida, obducto, plan-
tam, hoc anno natam, vid. *nostra Tab.*
V. F.1.

ARBUTUS, folio ferrato, *Dodon. p.792. Borell.*
vulgaris, *ic.674. obs.1361. Boerb. P. II.*
p.217.

ARISTOLOCHIA, flore ex purpureo nigro;
rotunda vera *offic. Riv. Monop. J.B.*
3.559. *Boerb. I.*

- - Indica, aromatica, *H. Carolsr.*; folio mi-
nori, radice lignosa, et fibrosa, ab
antecedente differt.

- - Cretica, Pistolochia dicta, *Riv. Monop.*
Boerb. III.

ARUM Africanum, flore albo, odorato, mo-
schato, *H. A. P. I. F.50. Boerb. VI.*

ARUNDO sativa, hortensis, *J.B. 2.486. Boerb. II.*

- - Indica variegata, *Munting. Aardgew. p.*
367. *F.108. Boerb. III.*

ARAN-

Arbuscula Americana
alatis foliis.



Fig. 1.




Fig. 2.

- | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. | <p>ARUNDO saccharifera, <i>Munting. Aardgew. F. 109. Boerb. IV.</i></p> <p>ASCLEPIAS Africana Aizooides, Aphylla, 4. <i>Moris. f. 15. T. 3; Fritillaria crassa minor; Boerb. IV.</i></p> <p>- - Africana Aizooides, flore pulchre fimbriato, maior, <i>Comm. Rar. F. 19. Boerb. V.</i></p> <p>- - Africana Aizooides, folio compresso digitato; <i>Volckam. Flor. Norimb. Apocynum p. 39. et Fig. p. 30; Boerb. VI.</i></p> <p>ASCYRUM Balearicum, frutescens, flore luteo, foliis minoribus, subtus verrucosis; Myrto-Cistus Pennaei, <i>Clus. H. 68; Boerb. II.</i></p> <p>ASPARAGUS, foliis acutis; <i>Corruda I. Clus. H. CLXXVII; 1. Moris. f. 1. T. 1.</i></p> <p>- - aculeatus, spinis horridus; <i>Corruda III. Clus; Boerb. III.</i></p> <p>- - aculeatus, tribus, aut quatuor spinis, ad eundem exortum; <i>Corruda II. Clus; Boerb. IV.</i></p> <p>ASPHODELUS, flore albo, striato, <i>J. B. 2. 632; minimus albus; B. IV.</i></p> <p>ASTER maritimus, flauus; <i>Crithmum chrysanthemum, folio tereti, crasso, tridentato; 16. Moris. f. 7. T. 21. Boerb. XIV.</i></p> <p>- - folio in summo obtuso; ceterum praecedentis similis, <i>Boerb. XV.</i></p> <p>- - Africanus, frutescens, foliis angustis, plerumque coniunctis, <i>H. A. P. II. 53. Boerb. XXVII.</i></p> <p>ASTERISCUS annuus, foliis ad florem rigidis; <i>Chrysanthemum 25. Moris. sect. 6. T. 5; Boerb. I. b.</i></p> <p>- - maritimus, patulus; <i>Aster supinus II. Clus.</i></p> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

No.

*Clus. luteus Barell. ic. 1151. obs. 1122.
J. B. 2. 1045. Boerb. VI.*

ASTERISCUS maritimus, perennis, patulus;
*Bocc. Mus. T. 129. p. 161; foliis crassio-
ribus, et paullo latioribus, ac floribus
maioribus, quam in Astere II. Clus.
supino, Boerb. VII.*

- - seu Asteriscoides, radio longiore, angu-
stifolius; Aster Austriacus *III. Clus.
H. XIII. Boerb. X.*

ASTRAGALOIDES Lusitanica, T. Astragalus
Boeticus *Clus. H. CCXXXIV; Boerb.
P. II. 46.*

ATRIPLEX, seu Halimus frutescens latifo-
lius; Portulaca maritima *Dodon;
Boerb. IX.*

- - seu Halimus angustifolius, fruticosus,
procumbens, *Boerb. XI.*

AURANTIUM Hierichunteum, cortice tenuio-
ri, medulla dulci, rubente, *H. Pis.
T. 16.*

AURANTII 15. species *Boerb. P. II. 239. et aliae
plures.*

AZEDARACH, seu Arbor Fraxini folio, flore
coeruleo, *J. B. 1. 554. H. A. P. I. F. 76.
Boerb. I.*

B.

BANILLAS vel Vaynillas *offic; Vanillias
Plukn. T. 320. F. 4; Thloxochitl, seu
Aracus aromat. Hernand. p. 38.*

BARBA IOVIS, flore albo, *Riv. Tetrap. Munting.
Aardgew. p. 215. F. 53. Boerb. I.*

- - Africana, foliis viridibus, pinnatis, flore
coeruleo; dicitur *Genista Ruteri; it.
Spar-*

200



Bupleurioides

- No. Spartium Africanum, Riv. Tetrap;
Boerb. II.
- BARBA IOVIS lagopoïdes, Cretica, frutescens,
incana, flore spicato, purpureo, *Ba-*
rell. ic. 377. Boerb. IV.
- - incana, flore luteo, *Barell. ic. 378.*
- BELLIS Africana, latifolia, flore maiore.
- BENZOINIFERA Americana, Citri folio, *H.*
A. P. I. F. 97. Boerb. P. II. 259.
- BERMUDIANA, Iridis folio, flore coeruleo,
Tournef. T. 208. H. E. p. 48; dicitur
etiam Silyrinchium Iridis folio;
Boerb. I.
- BIDENS Indica, Hieracii folio, caule alato;
Chrysanthemum Curassauicum, *H.*
P. B. p. 125. H. A. P. I. F. 3. Volck. p. 105;
Boerb. VI.
- BIGNONIA, Americana arbor, flore luteo,
Fraxini folio; Clematis *Plukn. Phyt.*
T. 162. F. 4; Boerb. III.
- BRYONIA Zeylanica, foliis profunde lacinia-
tis, floribus luteis, baccis rubellis, *H.*
Malab. P. 8. p. 37. H. L. B. 97. Herm. P.
B. 107. Boerb. IV.
- - Africana, laciniata, radice tuberosa, flo-
ribus herbaceis; ceterum eiusdem
cum praecedente formae; *Boerb. V.*
- BUPLEURIODES, siue Arbor umbellifera;
Simpla nobla Canariensis; *Boerb. P. I.*
72. ramum vid. nostra Tab. VI.
- BUXUS arborescens offic. *Matth. 169, Boerb. I.*
- - foliis auratis, variegatis, *Munting. Aard-*
gew. F. 122. p. 435. Boerb. III.

No.

C.

CALAMINTHA montana, praealta, Pulegii odore, dentatis foliis, floribus coeruleis dilutis, *Bocc. Mus. T. 40. Boerb. VI. b.*

CAMPANULA maior, lactescens, pyramidalis; Lutetia *H. Eyst. Aest. O. I. F. 7; Boerb. I. b.*

CAMPHORA officinarum; Camphorifera arbor, *H. A. P. I. F. 95. Breyn. Cent. I. p. 12; Boerb. P. II. 261.*

CAMPHORATA Africana, umbellata, frutescens, *Herm. H. A. P. II. 79; Santolina Ericaefolio, congestis flosculis singularibus, albis, Boerb. VII.*

CANNACORUS latifolius, vulgaris, flore rubro; Canna Indica *Riv. Monop; Boerb. I.*

- - flore coccineo, splendente, *Boerb. II.*

- - flore luteo, punctato, *Boerb. III.*

- - angustifolius, flore flavescente; *Riv. Monop; Boerb. IV.*

- - latifolius, flore coccineo, punctato, semine minore, ex Mechoacan, *H. Carolsr.*

- - maiori, angustiore, et acutiore folio, flore magno flavescente, punctis rubris vario, *H. Carolsr.*

- - latifolius, vulgaris, foliis variegatis, *Hort. Carolsr.*

CAPPARIS spinosa, fructu minore, folio rotundo; vera offic. *Lobel. p. 353. Boerb. I.*

CAPSICUM Brasiliense, siliquis minimis, oblongis, flavis. *b.*

CARDUUS ferox, *Munting. Aardgew. F. 126.* folio et facie Atractilidis; Acarna caule non folioso; *Morif. 16. f. 7. T. 33. Boerb. XXIV.*

CAR-



Carthamus Africanus frutescens
flore aureo

No.

CARTHAMUS Africanus frutescens, folio Illicis spinoso, flore aureo, *Boerb. II. ramum vid. nostra Tab. VII.*

CARYOPHYLLUS, ex spica prodeunte flore rubente.

- - flore cinereo.

- - flore luteo.

- - siue Tunica syluestris, flore pallido roseo, prolifero, id est, uno post alterum ex eodem perianthio succrescente.

CASSIA Americana foetida, foliis oblongis, glabris Orobi, odore opii viroso, *Pisonis 185; senna, H. A. P. I. 51; Boerb. I.*

- - Americana, foliis longis, glabris, odore minus viroso; Cassia Fistula Alexandrina, *H. A. P. I. 215. Fig. 110. Conna, H. Mal. P. I. Fig. 22; Boerb. III.*

CATARIA angustifolia maior, flore coeruleo purpurascente, *Boerb. IV.*

- - Lusitanica, erecta, folio Betonicae, tuberosa radice, flore coeruleascente, *Bocc. Mus. T. 36. Boerb. V. b.*

- - quae Horminum spicatum, flore et odore Lauendulae, *Bocc. Rar. T. 25. Boerb. VII. b.*

CEDRUS, folio Cypressi, fructu flavescente; Oxycedrus *Clus. H. 39; Boerb. I.*

CELTIS, fructu nigricante; Lotus arbor *Matth. p. 211; Boerb. I.*

CERASUS Hottentottorum, folio fere oblongo, rotundo, crassissimo, *Plukn. Phyt. 82. Fig. 5. Boerb. VII.*

- - Africana, folio angustiore, de reliquo similis praecedentis; et haec potius convenire videtur cum ista icone *Plukn.*

CEREVS

- | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. | <p>CEREUS erectus, altissimus, Syrinamensis, spinis fuscis, costarum numero varians <i>Boerb. I.</i></p> <p>- - erectus, fructu rubro, non spinoso, lanuginosus, spinis albis, <i>Herm. P. B. p. 114. Boerb. IV.</i></p> <p>- - erectus, spinosissimus, spinis flavis, polygonus, lanugine alba, pallescente, <i>Par. Bat. 115.</i></p> <p>- - erectus, quadrangulus, costis alarum instar adfurgentibus, <i>Boerb. IX.</i></p> <p>- - scandens minor, trigonus, articulatus, <i>Plukn. Phyt. T. 29. F. 3. Boerb. X.</i></p> <p>- - scandens maior, trigonus, lucidus, variegati coloris.</p> <p>- - scandens minor, polygonus, articulatus, <i>Herm. P. B. p. 118. Boerb. XI.</i></p> <p>- - Indicus, scolopendrii folio, plano, glabro, brachiato, <i>H. E. p. 73. F. 74; Boerb. Opuntia XI.</i></p> <p>- - erectus, gracilis, polygonus; an <i>Boerb. XII?</i></p> <p>CHAMAELAEA tricoccus, <i>Tabm. p. 1484. Boerb. P. I. 254.</i></p> <p>CHENOPODIUM, fedi folio minimo; Sedum frutescens, Ericae folio, <i>Munting. Aardgew. F. 130; Boerb. II.</i></p> <p>CHRYSANTHEMOIDES osteospermon, Africanum, odoratum, spinosum, viscosum, <i>H. A. P. II. 85. Boerb. I.</i></p> <p>- - osteospermon, Africanum, arboreum, populi albae folio, <i>H. E. p. 80; Breyn. Cent. I. p. 156; Boerb. II.</i></p> <p>CHRYSANTHEMUM, Leucoii foliis incanis, et sericeis, crassis; an Chrysanthemoides</p> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

No.	des ex Infulis Charibaeis, <i>Plukn. T. 115.</i>
	<i>F. 4 ; Boerb. III?</i>
	CINARA acaulos, <i>H. Pis. T. 20.</i>
	CIRSIIUM tuberosum, lactucae capitulis spicatis, floribus paruis purpureo-violeaceis, <i>H. E. T. 72. F. 83.</i>
	CISTUS, mas, salviae folio, oblongo, incano; Hypocistis 3. <i>Matth. p. 158; Cistus mas, I. Clus. H. 68. Boerb. V.</i>
-	- mas, maior, folio rotundiore, flore purpureo, <i>H. Lugdun. 222. Boerb. VI.</i>
-	- mas, foliis undulatis, et crispis, <i>V. Clus. H. 69. Lobel. p. 549. Boerb. VII.</i>
-	- foemina, viridibus foliis salviae, elatior, flore albo, <i>Lobel. p. 549. Boerb. XI.</i>
-	- ladanifera Monspeliensium; Ledum <i>Matth. p. 160; Boerb. XII.</i>
-	- foliis rosmarini; Ledon <i>IX. Clus. H. 80. Boerb. XVII.</i>
	CITREUM vulgare; <i>Boerb. I.</i>
-	- dulci medulla, <i>Boerb. II.</i>
	CLEMATITIS Canadensis trifolia, dentata, flore albo, <i>Boerb. IV.</i>
	CLUTIA; Frutex Aethiopicus Portulacae folio, flore ex albido virescente, <i>H. A. P. I. p. 177; Boerb. P. II. 260.</i>
	CNICUS perennis, flore coeruleo; Tingitanus <i>H. L. B. p. 163. Boerb. I.</i>
	COLOCASIA; Arum Aegyptiacum <i>Matth. p. 339. Moris. maximum Aegyptiacum f. 13. T. 6; Pr. Alpini Exot. Colocasia Strogyloriza p. 236; Boerb. I.</i>
	COLUTEA Orientalis, flore sanguinei coloris, <i>T. Coroll. 44. Boerb. III.</i>
-	- Aethiopica, flore phoeniceo, folio Bar-

- No. Barbae Iouis , *Breyn. Cent. I. p. 70. Riv. Tetrap; Boerb. I V.*
- COMA aurea Africana, fruticans, foliis linariae angustis , *H. A. P. II. 89. F. 45. Boerb. II.*
- aurea Africana, elatior, lini folio, similis Germanicae; sed flore maiore.
- CONVOLVULUS maritimus, rotundifolius; Soldanella minor *Offic. Brassica maritima 7. Matth. p. 368; Boerb. I. in gen. 1.*
- Syriacus, Scammonium nigrum dictus, *offic. Boerb. II. in gen. 1.*
- argenteus, umbellatus, erectus; qui Dorycnium Dioscoridis, *Munting. Aardgew. Fig. 155.*
- minor, Spicae folio , *Barell. ic. 311. Lobel. Adv. 274. Boerb. VII.*
- Althaeae, vel Bryoniae folio, flore carneo, *10. Moris. Barell. ic. 312. obs. 34. Boerb. XVI; noster, modo crescendo suo, accedere magis videtur ad Helxinen cissampelon Dioscor. Zanon. F. 40.*
- CONYZA Africana, tenuifolia, subfrutescens, flore aureo, *H. E. p. 104. F. 103. Boerb. VII.*
- CORONA SOLIS arborea, folio latissimo Platani; *Moris f. 6. T. 7. n. 55; Boerb. XIV.*
- CORONILLA minima, Valentina; Polygala Valentina, *Clus. H. 98; Boerb. I.*
- Hispanica frutescens, maior; Colutea scorpioides maior, *J. B. 1. 382; Boerb. II.*
- scorpioides argentea, Cretica, *Pr. Alp. Exot. p. 16. Boerb. III.*





*Cotyledon Afric: foliis
depressis cruciatis.*

- No. COTINUS, coriaria Plinii, *Matth.* 187. *Barell.*
icon. 528. *obs.* 1368. *Boerb.* P. II. 228.
- COTYLEDON, Afra, arborescens, maior, fo-
 liis glaucis, oblongioribus, flore lu-
 teo, *Boerb.* III.
- - Afra, frutescens, foliis orbiculatis, glau-
 cis, limbo purpureo, et maculis viri-
 dibus ornatis; similis Sedo 39. *Morif.*
f. 12. *T.* 7. Sedum, *H. L. B.* 551; *Boerb.* IV.
- - maior, arborescens, Afra, foliis minori-
 bus, crassissimis, viridioribus, minu-
 tissime punctatis; Capensis, folio se-
 milobato, *H. E.* p. 113. *Boerb.* V.
- - Afra, frutescens, flore umbellato, cocci-
 neo, *Commel. Rar.* p. 24. *Boerb.* VIII.
- - Afra, folio crasso, lato, laciniato, floscu-
 lo aureo, *Boerb.* X. *cum icon.*
- - Afra, folio minori, tereti, acuminato, vi-
 ridi, Ficoidis facie, flore albo; Sedum
 Africanum, umbellatum, album, *H.*
L. B. 552: 21. *Morif.* *f.* 12. *T.* 7.
- - Afra, frutescens, foliis longis, retusis, de-
 pressis, et cruciatis, flore luteo, *H. Ca-*
rolsr; *ramum vid. nostra Tab.* VIII.
- CRITHMUM; Foeniculum maritimum mi-
 nus; 2. *Matth.* p. 381. *Dod.* 5. 4. 14. *offic.*
Boerb. I.
- - maius, odore Apii, 2. *Morif. sect.* 9. *T.* 7.
Boerb. II.
- CYPRESSUS, meta in fastigium conuoluta,
Boerb. I.
- - ramos extra se spargens, mas, *Matth.* p.
 116. *Boerb.* II.
- CYTISUS, glabris foliis, subrotundis, frute-
 scens; Trifolium arborescens, *H.*
Eyst. *Boerb.* V.

- No. CYTISUS, minoribus foliis, ramulis tenellis, villosis, Canariensis, *H. A. P. II. F. 52; Boerb. IX.*
- - Africanus, argenteus, *Riv. Tetrap. flore phoeniceo, Boerb. XI.*
 - - argenteus, humilis, angustifolius, *I. r. b. Boerb. XVI;* folia tenuiora, et minora sunt, quam in praecedente.
 - - viridis, *Lobel. Aduers. p. 387.*
 - - angustissimis, et incanis foliis, an *Plukn. Phyt. T. 278. Fig. 4 ?*
 - - Indicus, folio molli, longiori, incano, flore luteo, venis purpurascens, *H. Carolsr.*

D.

DIGITALIS, Canariensis, Acanthoides, frutescens, flore aureo, *H. A. P. II. 105. Boerb. IX.*

DORIA, quae Jacobaea Orientalis, Limonii folio, *Boerb. IV.*

- - quae Jacobaea Africana, frutescens, crassifolia, et succulentis foliis, *H. A. P. II. p. 147; Boerb. VIII.*

DORYCNium Montpelienſium, *Lob. Adv. 389; fruticosum, J. B. 1. 388; Boerb. P. II. 37.*

DRACUNCULOIDES; Haemanthus, Colchici folio, perianthio herbaceo, *H. E. 167. T. 140; Boerb. P. II. 266.*

E.

ELICHRYSUM, sylvestre, latifolium, flore parvo, singulari; *Barellieri Chrysocome minima, icon. 425; Boerb. I.*

ELI-

- | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. | ELICHRYSUM, sylvestre, folio angustiori, longiori, superius viridi, inferius incano, flore singulari; Heliochrysum saxatile, <i>Bocc. Mus. T. 104; Borell. 426.</i> |
| - | - foetidissimum, Africanum, latifolium, calyce aureo, <i>Boerb. VIII. b.</i> |
| - | - foetidissimum, Africanum, latifolium, calyce argenteo, <i>H. A. P. II. F. 56. Plukn. T. 243. F. 1. Volckam. p. 194. Boerb. IX. b.</i> |
| - | - Africanum, arboreum, folio Salviae, odore Rorismarini; Elichryso affinis, <i>H. L. B. 229; Boerb. XI.</i> |
| - | - Africanum, frutescens, folio oblongo, subtus incano, <i>H. E. p. 128. Boerb. XII.</i> |
| - | - angustissimo folio, flore aureo, <i>J. B. 3. 155. Boerb. XIX.</i> |
| - | - Africanum, foliis incanis, longioribus, frutescens, <i>H. A. P. II. F. 55. p. 109.</i> |
| | EPHEDRA, maritima, maior; <i>Lobel. obs. p. 462. Uua marina, et Tragus; Boerb. I.</i> |
| | ERYNGIUM, marinum, <i>J. Matth. p. 505. Moris. 6. J. 7. T. 36. Boerb. I.</i> |
| | EVONYMUS, Africanus, Lycii crassioribus foliis, semper virens, <i>H. A. P. I. 163. Boerb. III.</i> |
| | EVONYMO AFFINIS, Aethiopica, semper virens, fructu globoso, scabro, foliis Salicis, rigidis, ferratis, <i>Plukn. T. 176. F. 3. Boerb. IV.</i> |
| | EUPHORBIIUM, enneagonum, Cerei effigie, caulibus crassioribus, spinis validioribus armatum, <i>H. A. P. I. F. 11. Lobel. p. 642. Boerb. II.</i> |
| - | - octogonum, Cerei effigie. |
| - | - heptagonum, Cerei effigie. |

- No. EUPHORBium, heptagonum, spinis longissimis, in apice frugiferis, *Boerb. III. cum icone.*
- - Afrum, polygonum, spinosum, caule tuberibus ornato; Tithymalus aizoides, spinis validissimis, *Commel. Prael. p. 59. F. 9; Boerb. IV.*
 - - tetragonum, et pentagonum, spinosum; Tithymalus, *H. A. P. II. F. 10. 4; Boerb. V.*
 - - Afrum, caule simplici, squamato, tuberoso; Tithymalus, *Commel. Prael. p. 57. F. 7; Boerb. VI.*
 - - Afrum, caule simplici, squamato, Chamaenerii folio; Tithymalus, *Commel. Prael. 58. F. 8.*
 - - Afrum, minus, caule squamato, tuberoso, et simili Asclepiadis aizoidis minoris, *Boerb. VII.*
 - - trigonum, seu verum antiquorum, *H. A. P. I. F. 12; Schadidacalli, H. Mal. P. II. F. 42; Boerb. X.*
 - - trigonum, erectum, minus, brachiatum; Tithymalus, *Commel. Prael. 55. F. 5.*
 - - angulosum, foliis Nerii latioribus; Tithymalus aizoides, arborescens, *Commel. Prael. p. 56; Boerb. XI.*
 - - quod Anteuphorbium, *Dodon. p. 374. Moris. P. III. f. 7. T. 37; Boerb. XII.*

F.

FABAGO, Belgarum, sive Peplus Parisiensium; Capparis leguminosa *Matth. p. 456; Boerb. I.*

- - Afra, frutescens, minor, flore flauo, magno, unguibus petalorum fuscis; Capen-

- No. Capensis minor, *H. E.* 142. *Boerb. III.*
FICOIDES, Africana, quae Mesembrianthemum, Tripolii succulento folio, flore argenteo, *H. E.* p. 230. *F.* 220. *b.*
 - - Africana, quae Mesembrianthemum, Bellidiflorum, *H. E.* p. 244. *F.* 233.
 - - Afra, erectior, folio Calendulae, flore aureo; Chrysanthemum *Breyn. Cent.* 160; *Boerb. III. in 3. gen.*
 - - Africana, acaulos, foliis Aloes latissimis, crassissimis, lucidis, flore aureo, amplo; Mesembryanthemum, folio scalprato, *H. E.* p. 235. *Boerb. X. 3. gen.*
 - - Africana, acaulos, folio triangulari, lucido, obtuso, flore aureo, magno, *Volck. p.* 165. Mesembryanthemum, folio linguaeformi, longiore, *H. E.* p. 238.
 - - Africana, acaulos, foliis triangularibus, longissimis, punctatis, *H. Carolsr;* Mesembryanthemum, rostrum ardeae referens, *H. E.* p. 240. *F.* 229.
 - - Africana, quae Mesembryanthemum tortuosum, foliis Semperuiui, congestis, candidis floribus, *H. E.* p. 233. *F.* 222.
 - - Africana, folio variegato, aspero, ad apicem stella spinosa ornato, flore violaceo; Mesembryanthemum radiatum, ramulis prolixis, recumbentibus, *H. E.* p. 245. *F.* 234; *Boerb. XI. 2. gen.*
 - - Africana, folio variegato, aspero, ad apicem stella spinosa ornato, flore purpureo-violaceo; Mesembryanthemum radiatum humile, *H. E.* p. 246.

No.

F. 235; Boerb. XII. 2. gen.

FICOIDES, Africana, folio triangulari, securis forma; Mesembryanthemum folio dolabriformi, flore extus coccineo, intus aureo, *H. E. p. 248. F. 237; Boerb. XIV. 1. gen.*

- - Africana, folio triangulari, glauco, perfoliato, breuissimo, apice spinoso; Mesembryanthemum perfoliatum, foliis minoribus, diacanthis, *H. E. p. 250. F. 239; Boerb. XVII. 1. gen.*

- - Africana, frutescens, perfoliata, folio triangulari, glauco, punctato; Mesembryanthemum perfoliatum, foliis maioribus, triacanthis, flore dilute purpureo, *H. E. p. 251. F. 240; Boerb. XVI. 1. gen.*

- - Africana, folio triangulari, crasso, breui, glauco, ad tres margines aculeato; Mesembryanthemum deltoides, et dorso, et lateribus muricatis, minus, flore purpurascente, *H. E. p. 255. F. 246; Boerb. XXI. 1. gen.*

- - Africana, quae Mesembryanthemum, deltoides, et dorso, et lateribus muricatis, maius, floris colore violaceo, *H. E. p. 254. F. 245. et 247.*

- - Africana, fruticans, folio triangulari, scabro, tenui; Mesembryanthemum purpureum, scabrum, staminibus expansis, *H. E. p. 261. F. 250; Boerb. XXIII. 1. gen.*

- - Africana; Mesembryanthemum crassifolium, repens, flore purpureo, *H. E. p. 266. F. 257.*

- - Africana, quae Mesembryanthemum, foliis

No.

- liis veruculiformibus, floribus melinis, umbellatis, *H. E. p. 268. F. 259.*
- FICOIDES, Africana, quae Mesembryanthemum frutescens, flore purpureo, rariore, *H. E. p. 279. F. 267. et 268.*
- - Africana, siue Mesembryanthemum acinaciforme, flore amplissimo, purpureo, *H. E. p. 282. F. 270.*
 - - Africana, siue Mesembryanthemum falcatum, maius, flore purpureo, mediocri, *H. E. p. 285. F. 273.*
 - - Africana, siue Mesembryanthemum falcatum, minus, flore carneo, minore, *H. E. p. 287. F. 274.*
 - - Africana, fruticosa, caule, lanugine argentea ornato, folio tereti, paruo, longo, guttulis argenteis, quasi scabro; Mesembryanthemum pilosum, micans, flore saturanter purpureo, *H. E. p. 289. F. 277; Boerb. VIII. 2. gen.*
 - - Africana, fruticosa, foliis teretibus, tenuibus, acutis, longioribus; Mesembryanthemum pilosum, micans, flore purpureo pallidior, *H. E. p. 290. F. 280; Boerb. X. 2. gen.*
 - - Africana, quae Mesembryanthemum micans, flore phoeniceo, filamentis atris, *H. E. p. 292. F. 282.*
 - - Africana, quae Mesembryanthemum pugioniforme, flore amplo, stramineo, *H. E. p. 280. F. 269.*
 - - Africana, erecta, foliis oblongis, triangularibus, glaucis, et punctatis, flore luteo, *H. Carolsr; forma Mesembryanthemi falcati maioris, H. E. p. 272. F. 261.*

- No. FICUS, communis offic. fructu vario, *Matth. p. 234. Boerb. I.*
- - humilis, *J. B. 1. 128. Boerb. VI.*
 - - Malabarenfis, folio cuspidato, fructu rotundo, gemino, *H. Mal. P. I. p. 47. Plukn. T. 177, F. 2. Boerb. VII.*
 - - Bengalensis, folio subrotundo, *H. A. P. I. F. 62. Boerb. VIII.*
 - - Americana, folio latiore, venoso, Lauri maiore, *H. Mal. P. III. p. 87. Plukn. T. 177. F. 1.*
 - - Indica, Nymphaeae folio; an Tiliae folio, *Plukn. T. 178?*
- FOENICULUM, tortuosum; Sefeli Masfiliense Penae, *Lugd. 749. Lobel. Adv. p. 352; Boerb. VIII.*
- FRUTEX Africanus, Ambiram spirans, flore albo; Comae aureae similis, *B. IX; ramum vid. Tab. nostra IX.*
- FRUTEX peregrinus, horto Bosiano Yerva mora dictus; *ramum vid. Tab. nostra X.*

G.

GALANGA, maior, *Parkinsf. Th. 1585; Boerb. P. II. 128.*

GALE, frutex odoratus Septentrionalium; Rhus Myrtifolia, Belgica, *C. P. P; Lobel. Adv. p. 417; Gage, Germanorum J. B. 1. 225; Boerb. II.*

- - seu Rhus Myrtifolia, Monspeliaca, *Munting. Aardgew. F. 62; Boerb. III.*

GALLIUM, album, Linifolium, *Bocc. Mus. T. 75; Rubia Linifolia, Borell. icon. 356; Boerb. V.*

GENI-



*Frutex Africanus Ambram
Spirans*



- No. GENISTA, iuncea, Hispanica, Riv. Tetrap. Boerb. I.
- GENISTELLA, herbacea, flore luteo; Chamae-
spartium *J. B. 1. 393. Borell. icon. 570.*
obs. 1382; Boerb. I.
- GERANIUM, Africanum, Alchimillae, hirsuto
folio, medio, obscuriore circulo no-
tato, floribus rubicundis, Riv. Pen-
tap. Commel. Prael. 51. Boerb. II.
- - Africanum, arborescens, Malvae folio,
argentato, Boerb. III.
 - - Africanum, arborescens, Malvae folio,
plano, flore eleganti, kermesino, Riv.
Pentap. H. E. p. 151. Boerb. IV.
 - - Africanum, foliis inferioribus Afari, su-
perioribus Staphidisagriae, splen-
dentibus, et Acetosae sapore, Com-
mel. Prael. 52. Boerb. V.
 - - Africanum, Vitis folio, odore Melissae,
H. E. p. 152; Afrum, folio Malvae, la-
ciniato, Riv. Pentap. Boerb. VII.
 - - Africanum, Alchimillae, hirsuto folio,
floribus albidis, H. L. B. p. 283. Riv.
Pentap. Boerb. X.
 - - Africanum, triste, noctu olens, folio lon-
go, laciniato, hirsuto; Riv. Pentap.
Cornut. Hist. Canad. p. 110. Boerb. XI.
 - - Africanum, tuberosum, et nodosum, A-
quilegiae folio, noctu olens, Riv. Pen-
tap. H. L. B. p. 285. Boerb. XV.
 - - Africanum, frutescens, foliis crassis, glau-
cis, Acetosae sapore, Commel. Prael.
54. Boerb. XVI.
 - - Africanum, Betonicae folio, Riv. Pentap.
H. L. B. p. 281. Boerb. XVIII. b.
 - - Africanum, frutescens, Alceae folio, flore
coccineo, fulgidissimo; de reliquo

No.

simillimum figurae *H. E. p. 153. Boerb. XXIV.*

GERANIUM, haematodes, flore variegato; Lancastrense, *H. E. p. 163; Boerb. XXXIV.*

GNAPHALIUM, maritimum, *Lobel. Adv. p. 200. Dod. 1.3.12. Boerb. I.*

GRAMEN DACTYLUM, maximum, Americanum; Sesamum perenne, *Zanon. 181; Boerb. P. II. 161.*

GRANADILLA, pentaphyllos, flore coeruleo, magno, *Munting. Aardgew. F. 165. Tourn. T. 123. et 124. Boerb. I.*

- - triphyllos, flore roseo, *Moris. 2; Munting. Aardgew. F. 162. Boerb. III.*

- - folio tricuspidi, flore parvo, flavescente, *Moris. 3. Munting. F. 161. Boerb. IV.*

- - folio tricuspidi, obtuso, oculato, *Feuiller T. 2. 718. icon. XI. Boerb. IX.*

GUAJACANA, angustiore folio; Guajacum Patavinum, angustioribus foliis, *Park. Th. 1532; Boerb. II.*

GUAJAVA, Americana, arborescens, alba, dulcis, *H. A. P. I. F. 63. Boerb. I.*

GUIDONIA, Ulmi foliis, floribus roseis; Ulmi facie, arbuscula Aethiopica, *H. A. P. I. F. 85; Boerb. P. II. 259.*

H.

HAEMANTHUS, Africanus, *H. L. B. caule maculato; Narcissus, Indicus, puniceus, H. A. P. II. F. 64; Borell. ic. 1041. Lilio-Narcissus, obs. 792; Boerb. P. II. 149.*

HEDERA, monophyllos, Convolvuli folio; siue Meni-

- | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. | Menispermum, aut Clematis Virgiana scandens, hederaceo folio; <i>Plukn. Phyt. T. 36. F. 2. Boerb. IV.</i> |
| | HEDYSARUM, triphyllum, Canadense, <i>Cornut. p. 44; Barell. ic. 1140; Riv. Tetrap. Munting. Aardgew. Fig. 220. Boerb. I.</i> |
| | HELIOTROPIMUM, Canariense, arborescens, Scorodoniae folio, <i>H. A. P. II. F. 65. Boerb. II.</i> |
| | HERMANNIA, frutescens, folio oblongo, serrato; <i>Volckam. Althaea, p. 24; Boerb. I.</i> |
| - - | frutescens, folio ferrato, latiore Alni; Ketmia, flore spirali, sulphureo, <i>H. A. P. II. p. 155; Boerb. II.</i> |
| - - | frutescens, folio Ibis, hirsuto, molli; Ketmia <i>H. A. P. II. p. 157; Boerb. IV.</i> |
| - - | frutescens, folio oblongo, molli, cordato, hirsuto, <i>Boerb. VI.</i> |
| - - | frutescens, foliis Lauendulae latioribus, flore paruo, aureo, <i>H. E. p. 179. Boerb. VII.</i> |
| | HYACINTHUS, Indicus, tuberosus, <i>Clus. H. 176. Barell. ic. 1213. Boerb. I.</i> |
| - - | Indicus, tuberosus, flore pleno, albo, <i>Boerb. II.</i> |
| | HYOSCYAMUS, albus, maior, umbilico floris viridi, <i>H. Eyst. Aest. O. 8. F. 8. Boerb. III. b.</i> |
| - - | maior, albo similis, umbilico floris atropurpureo, <i>Boerb. IV. b.</i> |
| - - | Creticus, luteus, maior, <i>Riv. Monop. Clus. H. LXXXIII; Boerb. VI. b.</i> |
| | HYPERICUM, frutescens, Canariense, <i>H. A. P. II. 135. Boerb. X.</i> |
| - - | frutescens, foetidum, minus, <i>H. E. p. 182. F. 181; Androsaemum H. Eyst. Aest. O. 8. F. 10. fig. 2. Boerb. XI.</i> |

No.

I.

- J**ACEA, arborea, argentea, Ragusina, *Zanon. 107. F. 43; Boerb. XX.*
- - montana, incana, capite Pini, *I. B. 3. 30; Stoebe, Barell. icon. 138. obs. 970; Boerb. XXVIII.*
- - luteo flore, capite spinoso, folio integro, alio diuiso; Carduus Graecus, eryfimi folio, *H. Carolsr. b laciniatum folium adiecimus, Tab. V. Fig. 2.*
- J**ACOBAEA, maritima, *7. Moris. f. 7. T. 18. Boerb. VII.*
- - maritima, latifolia, *5. Moris. Boerb. VIII.*
- J**ASMINOIDES, folio Pishaminis, flore virescente, noctu odoratissimo, *H. E. 183. T. 153.*
- J**ASMINUM, vulgatus, flore albo, *Boerb. I.*
- - humilius, magno flore, Catalonicum, *Boerb. II.*
- - humile, luteum, *Boerb. III.*
- - luteum, vulgo dictum bacciferum, *Boerb. IV.*
- - Indicum, flauum, odoratissimum, *Boerb. V.*
- - folio Illicis, flore solitario, ex alis foliorum proueniente, *Commel. Rar. Fig. 6. Boerb. VI.*
- - Azoricum, trifoliatum, scandens, flore albo, odoratissimo, *H. A. P. I. F. 82. p. 159. Boerb. VII.*
- - Arabicum, Aurantii folio, flore albo, pleno; *Clus. Cur. Post. p. 6; H. Pis. T. 31; Boerb. VIII.*
- - quod Coffee arbor; Jasminum Arabicum, Castaneae folio, flore albo, odoratissimo, *H. Pis. T. 32. Boerb. X.*

JUNI-

No. JUNIPERUS, Bormudiana, *H. L. B. p. 347*; vulgo
Cedrus Bormudiana; *Boerb. III.*

K.

KALI, frutescens, lignosum, flore muscoso,
Rorismarini folio, *Boccon. Mus. T. 110.*

KETMIA, Syrorum quibusdam, flore coeruleo,
H. Eyst. Aest. O. Frut. F. 10. Boerb. I.

- - Syrorum, flore purpuro - violacco,
Boerb. II.

- - Syrorum, flore albo, *Boerb. III.*

- - Sinensis, fructu subrotundo, flore simplici, *Boerb. V.*

- - Sinensis, fructu subrotundo, flore pleno;
Althaea, 2. Moris. f. 5. T. 18; Boerb. VI.

- - Africana, populi folio; *Althaea rosea*,
peregrina, Park. 304. Boerb. VII.

- - Aegyptiaca, semine moschato, *Abelmosch dicta, Park. Tb. 303; Bamia muschata Pr. Alp. Exot. p. 196; offic. Boerb. IX.*

- - Indica, Vitis folio, paruo flore; *Alcea Aegyptia, vulgaris, Park. Tb. 303. Boerb. X.*

- - Americana, folio *Papayae*, flore magno, flavescente, fundo purpureo, fructu pyramidali, hexagono, erecto; folio *Manihot ferrato, H. E. p. 189; Boerb. XII.*

- - Indica, *Gossypii* folio, *Acetosae* sapore, *Boerb. XIII.*

- - palustris, quae *Althaea*, *Cytini* flore, purpureo, *Parkins. 305. Lob. Adv. 294.*

No.

L.

L APATHUM, praestantissimum, Rhabarbarum offic. dictum; Rhabarbarum rotundifolium, verum, *Munting. Aardg. 692. F. 197; Boerb. I.*

L ARIX, *Matth. p. 101. Lob. p. 633. Adv. p. 449. offic. Boerb. II.*

L AVENDULA, folio multifido, *Riv. Monop. Barell. icon. 798; Commel. Rar. 27. Boerb. V. b.*

- - folio multifido, flore albo, *Boerb. VI. b.*

L AURO-CERASUS, *I. B. 1. 420. Barell. icon. 873. obs. 1377. Boerb. P. II. 246.*

L AURUS, Indica, *H. Farnes. Ald. 61. Barell. icon. 877. Boerb. I.*

- - latifolia, mas, 3. *Tabm. p. 1361. Boerb. II.*

- - vulgaris, mas, 1. *Tabm. p. 1361. Boerb. IV.*

- - vulgaris, folio elegantissimo, variegato, aureo, *Boerb. V.*

- - vulgaris, folio undulato, *Boerb. VII.*

- - Africana, minor, folio Quercus, glabro, *H. A. P. II. F. 81. Boerb. XI.*

- - Africana, minor, folio Quercus, hirsuto.

L ENTISCUS, vulgaris, offic. *Matth. p. 105. Lob. p. 538. Boerb. I.*


- - vulgaris, foliis minoribus, et pallidioribus, *Boerb. II.*


L EONURUS, Africanus, Sideritidis folio, flore phoeniceo, maiore, *Breyn. Cent. I. p. 172. Riv. Monop. Boerb. I.*

- - maior, Capitis Bonae Spei, Melissae folio, *Boerb. II.*

- - Americanus; Cardiaca Nepetae folio, *H. L. B. 117; Boerb. II.*

L EPIDOCARPODENDRON, acaulon, ramis numerosis e terra excrescens, calyce floris





Leucanthemum canariense
saporem Pyrethri.

- No. floris immaturo, extus ex rubro, et
flauo variegato, intus flauo, *Boerb.*
X. cum icon.
- LEUCANTHEMUM, Canariense, sapore Pyre-
thri, *Moris. 7. Boerb. V. ramum vid.*
Tab. nostra XXIV.
- LEUCOJUM, frutescens, folio argentato, flore
luteo, pleno; et plures Leucoji spe-
cies, *Boerb. P. II. 17.*
- LIGISTRUM, foliis e luteo variegatis, *Boerb. II.*
- LILIO-NARCISSUS, Indicus, saturato colore
purpurascens, *Barell. icon. 1039. Boerb. I.*
- - Indicus, flore albo, exterius rubente
Boerb. II.
- - Jacobaeus, flore sanguineo, nutante, *H.*
E. 196; 31. Moris. f. 4. T. 10. Barell. icon. 1035.
- LIMONII species decem, *Boerb. P. II. 240. 241.*
et aliae plures.
- LIMONIUM, maius; Behen rubrum offic; Vale-
rianæ rubrae similis, *Dodon. p. 348;*
Boerb. I.
- - minus, Bellidis folio, flagellis foenicula-
ceis, *Boccon. Mus. T. 103. Boerb. XIV.*
- - Siculum, lignosum, gallas ferens, et non
ferens, *Boccon. T. 16. p. 32; Boerb. VI.*
- - peregrinum, foliis Asplenii, *j. B. 3.*
862; elegans Rauwolff. itiner. L. 4. n.
314; Clus. Cur. Post. p. 63; Munting.
Aardgew. p. 710. F. 205. Barell. icon. 1124.
Syriacum H. Eyst. Boerb. VII.
- - Orientale, Plantaginis folio, floribus
umbellatis, *Boerb. IX. cum icon.*
- LOTUS, polyceratos, frutescens, incana, alba,
maior, latifolia; Lybica Dalechamp.
Riv. Tetrap; 13. Moris. f. 2. T. 18. Park.
Th. 1102. Boerb. I.

- No. LOTUS, polyceratos, frutescens, incana, alba, filiquis curtis; Haemorrhoidalis *Parkins. Th. 1102; 14. Moris. Barell. icon. 1033. obs. 803. Boerb. II.*
- - polyceratos, frutescens, Cretica, argentea, *Boerb. III.*
 - - angustifolia, flore luteo, et purpureo, ex Insula S. Jacobi, *H. A. P. II. 165. Boerb. XIV.*
- LYCHNIS, frutescens, myrti folio; Been albo similis, *Boccon. Rar. T. 30; Boerb. XXXIII.*
- - Bupleuri folio, *Tourn. Voy. 2. p. 154. Boerb. LXVII.*
 - - Graeca, Sedi arborescentis folio, et facie, flore albo, *Tourn. Cor. p. 23. vid. ramum nostra Tab. XI.*
- LYSIMACHIA, semper virens, spicata, flore albo; Ephemerum, *Matth. p. 780. I. B. 2. 905; Boerb. III. b.*
- - Canadensis, flore luteo, folio Jalapae, *Boerb. VI; ramum vid. Tab. nostra XII.*

M.

- MAGNOLIA, lauri folio, subtus albicante, *H. E. F. 205; Tulipifera Plukn. T. 60. Fig. 4; Catesby Hist. N. Carol. Tom. I. T. 39.*
- MAJORANA, folio rotundo, *Riv. Monop; Boerb. II.*
- MALACOIDES; Malva Betonicae folio, flore purpurascence, *Zanon. F. 52. p. 130; Alcea, Barell. ic. 1189; Boerb. P. I. 271.*
- MALVA, humifusa, minima Sherardi, *H. Pis. T. 35. Boerb. XII.*

MALVA-




Lychnis sedi
arborescentis
folio







Lysimachia Canadensis lutea
folio Jalapae



Lythrum

salicaria

- No. MALVAVISCUS, arborescens, flore miniato, clauso, *H. E. Fig. 208.*
- MARUM, Syriacum officinarum; Pseudo-Marum *Riv. Monop; Boerb. I.*
- - Hispanicum, nigrum, fruticans, odore minus acuto, flore purpurascens, *Bocc. Mus. T. 117. Barell. ic. 694. obs. 354. Boerb. II.*
- MASTICHINA; *Riv. Monop.* Marum officinarum vulgare; Clinopodium *Dodon;* Thymbra Hispanica, Maioranae folio *T; Boerb. P. I. 156.*
- MEDICA, marina, *Lobel. Adv. 383. Boerb. I.*
- MEDICAGO, trifolia, frutescens, incana; Medica, *Moris. 4. T. 16. f. 2; Falcata incana, Riv. Tetrap; Boerb. I.*
- MELIANTHUS, maior, *Riv. Hexap. H. L. B. p. 415. Boerb. I.*
- - minor, foetens, *Commel. Rar. F. 4; Riv. Hexap. Boerb. II.*
- MELOCACTUS, Americana, minor, lactescens, *H. A. P. I. 105; Hermann. P. B. p. 136. Echinomelocactus; Boerb. I.*
- - monstrosa, *Hort. Carolsr; ex una sede, et radice, plures ad latera succrescunt.*
- MESPILUS, Apii folio, laciniato; Aronia *Matth. p. 209; Boerb. IV.*
- METHONICA Malabarorum, *Plukn. T. 116. F. 3; Lilium superbum Zeylanicum, H. A. P. I. F. 35; H. L. B. App. p. 689. Boerb. P. II. 134.*
- MIMOSA, folio Sennae, lato, spinosa, Aeschynomene spinosa, latifolia, *H. A. P. I. 55; Boerb. I.*
- - maior, frutescens, spinosa; Sensitiva maior, siue Aeschynomene, *H. A. P. I. 57;*

No.

I. 57; Zanon. Cap. 76. Fig. 56. 57. Boerb. II.

MIMOSA, spuria de Phernambucq; Mimosa Italica, *Zanon. 151; Boerb. VII.*

MITELLA, Americana, florum albidis petalis, fimbriatis, Cortusae similis 4tae, sed 3. *Par. Bat. 130. Boerb. II.*

MOLDAVICA, Americana, trifolia, odore gravi; Cedronella Canariensis *H. A. P. II. F. 41; Boerb. III.*

MOLLE *Clusii; Lobel. obs. 542. Boerb. P. II. 258.*

MUSA, fructu cucumerino, longiori; *Bala H. M. Tom. I. p. 17; flos apud Plumier. nov. Gen. Pl. T. 34; Boerb. I.*

MYRRHIS, Sicula, elatior, tenuioribus foliis; Chaerophyllum Siculum, Sophiae folio, villoso semine, *Tourn; Daucus Zanon. 80; Boerb. X. b.*

MYRTUS, communis, Italica, *offic; Baetica sylvestris, Clus. H. 66. H. Eyst. Aest. O. Arb. F. 12. Boerb. I.*

- - folii odore Citri, cauliculis rubentibus, *Munting. Aardg. F. 33. Boerb. III.*

- - foliis latioribus, Romana, *Matth. p. 195. Boerb. IV.*

- - angustifolia, Baetica, *Clus. H. 66. Boerb. VI.*

- - foliis latioribus, flore pleno, *Munting. F. 27. Cornut. Hist. Pl. Canad. p. 203. Boerb. VII.*

- - minor, vulgaris, siue Tarentina, *H. Eyst. Aest. O. Fr. F. 12; 2. Matth. p. 195. Boerb. IX.*

- - foliis minimis, et mucronatis, *Munting. Aardg. F. 30. Boerb. XI.*

- - foliis mucronatis, ex albo et viridi variegatis, *Boerb. XII.*

No.

N.

NARCISsus, maritimus, *Tourn.* 357. *Moris.* T. 10. f. 4. F. 28.

NERIUM, floribus rubescentibus; Rhododendrum, *Matth.* p. 775; *Boerb.* I.

- - flore simplici, albo, *Boerb.* II.

- - Indicum, latifolium, flore variegato, odorato, pleno, *H. A. P. I. F.* 23. *Boerb.* V.

O.

OLEA, fatiua, domestica, *Matth.* p. 177. *Boerb.* I.

- - syluestris, folio duro, subtus cano, *Matth.* p. 177. *Boerb.* II.

- - Afra, folio longo, lato, supra atro viridi, infra pallide viridi, *Boerb.* IV.

OPUNTIA, maxima, folio spinoso, latissimo, longissimo, *H. Eyst. Aut. O.* 4. F. 4. *Boerb.* I.

- - maior, spinis validissimis, flauescentibus munita; Tuna *H. E.* p. 398; *Boerb.* II.

- - quae Tuna elatior, spinis validis nigricantibus, *H. E.* p. 395.

- - vulgo Herbariorum *Tourn.* T. 122; Ficus *Matth.* p. 234; *Munting. Aardgew.* F. 157. *Boerb.* IV.

- - Curassauica, minima, *H. A. P. I. F.* 56. *Boerb.* VIII.

ORIGANUM, Monspeliacum, folio subrotundo, 16. *Moris.* f. 11. T. 3.

P.

PALIURUS, *Lobel. obs.* p. 598. *J. B.* 1. 35. *Boerb.* P. II. 236.

C 2

PALMA

- | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. | <p>PALMA, dactylifera, maior, <i>Lobel. obs. p. 637. Matth. p. 189. Boerb. I.</i></p> <p>- - dactylifera, fructu breuiore.</p> <p>- - dactylifera, fructu oblongo.</p> <p>- - dactylifera, folio flabelliformi, humilis, non spinosa, <i>J. B. 3. 370.</i></p> <p>- - maior, dactylifera, folio flabelliformi, pedunculo ad latera, durissimis magnisque spinis armato, <i>Pison. 126. Boerb. II.</i></p> <p>- - maior, dactylifera, folio flabelliformi, spinosa, foemina; an <i>H. Mal. Coddapana P. 3. T. 1. p. 1?</i></p> <p>- - humilis, dactylifera, radice repente, sobolifera, folio flabelliformi, pedunculo spinoso; Chamaeriphes, <i>Dod. p. 808. Matth. p. 109. Lobel. obs. 640. Boerb. III.</i></p> <p>- - humilis, dactylifera, radice repentissima, sobolifera, folio flabelliformi, pedunculo vix spinoso, <i>Boerb. IV.</i></p> <p>- - foliis longissimis, pendulis, absque ullo pedunculo, ex caudice glabro enatis; Draco Arbor, <i>Clus. H. 1. Lob. 639. H. Lugd. 1847. Boerb. VI.</i></p> <p>- - Japonica, spinosis pediculis, Polypodii folio, farinifera; vinifera vulgo; <i>H. Mal. P. 3. p. 9. T. 13. seqq. Boerb. VIII.</i></p> <p>PARKINSONIAE nomine missa, aculeata, foliis Mimosae, uni costae adfixis, <i>Plum. nov. Gen. Pl. Amer. p. 25. T. 3. vid. Tab. nostra XIII.</i></p> <p>PARONYCHIA Hispanica, <i>Clus. H. CLXXXII. Boerb. I.</i></p> <p>- - quae Polygonum montanum, niueum, polyanthos, <i>Barell. ic. 725; Boerb. II.</i></p> |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





Periploca africana
folio oblongo
angustissimo.

C.F.S. del.

J. G. K. sc.

- No. PERICLYMENUM, Virginianum, semper vi-
rens, et florens, *Riv. Monop. Boerb. P.*
II. 226.
- - Virginianum, foliis variegatis.
- PERIPLOCA, foliis oblongis, *Tourn. T. 22;*
Matth. Apocynum 2. p. 774. J. B. 2. 133;
Boerb. I.
- - Monspeliaca, foliis acutioribus; Apo-
cynum scandens, Scammonii facie,
amplexicaule, *J. B. 2. 135; Boerb. III.*
 - - Africana, foliis oblongis, angustis, flore
luteolo; *ramum vid. nostra Tab. XIV.*
an Apocynum scandens, angusto
Rosmarini folio, *Plukn. Phytogr. T.*
261. Fig. 2?
- PERSICA Africana, nana, flore pleno, incar-
nato, *H. L. B. p. 489. Boerb. V.*
- PHALANGIUM, Africanum, foliis cepaceis,
floribus spicatis, aureis; Aloe falso
dicta; *Boerb. V.*
- - Africanum, foliis Ficoidis, floribus spi-
catis, aureis, *Boerb. VI.*
- PHASEOLUS Americanus, perennis, cochlea-
to flore, Caracalla dictus; *Riv. Tetrap.*
Boerb. XV.
- - Africanus, Tamarindi foliis, qui Abrus
dicitur, fructu coccineo, hilo nigro,
Prosp. Alp. Pl. Aeg. p. 32. Plukn. Phyt.
T. 214. Fig. 5; Konni H. M. Part. 8.
Tab. 39.
 - - Indicus, perennis, floribus purpurascen-
tibus, *H. Carolsr.*
- PHILLYREA, folio Ligustri, *3. Clus. H. 52. Nar-*
bonensis Lobel. p. 564. Boerb. VII.
- - angustifolia prima, *C. B. P. 4. Clus. Boerb.*
VIII.

- No. PHLOMIS, Narbonensis, folio Hormini, flore purpurascente, *Lob. obs. 286. Boerb. I.*
- - fruticosa, Salviae folio, latiore, flore luteo; Salvia fatua *Riv. Monop*; Verbascum, *Lobel. obs. 302*; Stachys *Barell. icon. 406*; *Boerb. II.*
- - fruticosa, folio subrotundo, breuiore, flore luteo, *Boerb. IV.*
- - Hispanica, fruticosa, candidissima, flore ferrugineo, *Tourn. Inst*; Stachys *Barell. icon. 1322. obs. 223.*
- PHYTOLACCA, Americana, fructu minori; Amaranthus baccifer, Circaeae folio, *H. A. P. I. 127.*
- PIMPINELLA, spinosa, semper virens, *Barell. icon. 631. Moris. f. 8. T. 18. F. 5*; Poterium, *Lobel. 491*; *Boerb. VII.*
- PINUS, sativa, *Dodon. 6. 5. 11*; officulis duris, foliis longis, *J. B. I. 248. Boerb. I.*
- - cui officula fragili putamine; Cembro *J. B. I. 251.*
- PLUMBAGO, Ceylanensium, folio splendente, Ocymastri, flore lacteo, *Tourn. T. 58*; Lychnis, *H. A. P. II. 169*; *Boerb. II.*
- POINCIANA, flore pulcherrimo; Chamaecrista, seu frutex pauoninus, Americanus, filiqua multiplici, *Breyn. Cent. I. cap. XXIV*; *Boerb. P. II. 57.*
- POLIUM, montanum, luteum, magis odorum, *III. Clus. offic. Barell. icon. 1082. obs. 320*; *Boerb. II.*
- - montanum, repens, incanum, flore purpurascente, *V. Clus. Barell. icon. 1083. obs. 338. Boerb. IV.*
- POPULO SIMILIS ARBOR, resinosa, altera *C. B. P. 430. Tacamahaca, Seba The-saur.*

No.

saur. T. 2. Tab. 48. f. 3. Boerb. P. II. 211.

PSEUDO-DICTAMNUS, verticillatus, inodorus, maior, *Riv. Monop. Boerb. II.*

- - Hispanicus, amplissimo folio, candicante, et villoso; *Par. Bat. Marrubium p. 201. Borell. icon. 767. obs. 249; Boerb. V.*

- - Hispanicus, foliis crispis, rotundis, rugosis, *Par. Bat. p. 200. Boccon. Mus. T. 129. Boerb. VII.*

PUNICA, quae Malum Granatum fert, *Matth. p. 193. offic. Boerb. I.*

- - seu Granatus, flore pleno, maiore; *Balaustia offic. H. Eyst; Boerb. II.*

PYRETHRUM, *offic. 2. Matth. p. 574. Lobel. obs. p. 447. Pyrethrum Bellidis flore; Moris. f. 6. T. 10.*

R.

RAPUNTUM, maximum, coccineo, spicato flore; Flos Cardinalis, flore kermesino, *Munting. Aardgew. F. 159, Riv. Monop; Boerb. I.*

- - Americanum, flore dilute coeruleo; *Rapunculus, 55. Moris. f. 5. T. 5; Boerb. II.*

RHAMNOIDES, siue Rhamnus, 2. *Dodon. 6. l. 16. Matth. p. 143. Salicis folio, fructu leviter flauescente. Boerb. III.*

RHAMNUS, spinis oblongis, cortice albo, *Monspeliensium, I. Clus. H. 109. Boerb. II.*

RHAMNI primi altera species *Clusi l. c. Boerb. III.*

RHUS, Africanum, trifoliatum, maius, foliis obtusis, et incis, pallide virentibus, *Plukn. T. 219. F. 7. Boerb. VII.*

- - Africanum, trifoliatum, minus, splendente

No.

dente folio, subrotundo, integro,
Plukn. T. 219. F. 9. Boerb. XI.

RHUS, Africanum, trifoliatum, maius, glabrum,
splendente folio, atro viridi, medio
quandoque crenato; an *Vitex H.A.*
P. I. F. 93. Boerb. XII?

RHIZOPHORA, Zeylanica, siue Binanus Afri-
canus, scandens, *Herm. P. B. p. 217.*

RICINUS, minor, perennis, Americanus,
Boerb. IV.

RICINOIDES, Americana, gossypii folio, *T.*
Catal. H. Carolsruh. n. 441. Boerb. I.

ROSMARINUS hortensis, officinarum, *Riv. Mo-*
nop. Boerb. I.

- - striatus, siue aureus, *Boerb. II.*

- - hortensis, angustiore folio, argenteus,
Boerb. III.

RUSCUS, angustifolius, fructu folio innascent-
te, *Barell. ic. 249; Hippoglossum, Col.*
Phytobas. 64. Matth. p. 829; Boerb. I.

- - latifolius, fructu folio insidente; Lau-
rus Alexandrina 2. *Matth. p. 841. offic.*
Barell. ic. 250; Boerb. II.

- - angustifolius, fructu summis ramulis in-
nascente; Laurus Alexandrina, 1.
Matth. p. 841; Boerb. III.

- - myrtifolius, aculeatus, 1. *Matth. p. 840. J.*
B. I. 579. offic. Boerb. I. gen. 2.

RUTA, Chalepensis, latifolia, villosis petalis,
Moris. 5. App. f. 5. T. 35. Boerb. V.

- - hortensis, minor, tenuifolia, foliis varie-
gatis, argenteis, *Boerb. VII.*

- - sylvestris, minor, *Dod. p. 120. Boerb. VIII.*

RUYSCHIANA, flore coeruleo, magno; Pru-
nella 9. *Moris. Sect. 11. T. 5; Rivin. Mo-*
nop. Pseudochamaeipyttis; Chamae-
pyttis

No.

pytis *Munting. Aardgew. f. 132. Boerb. P. I. 172.*

S.

SALVIA, marmorea, *Munt. Aardgew. F. 235. Boerb. III.***S**ANTOLINA, foliis teretibus; Abrotanum, foemina, flore sulphureo, *Matth. p. 513. Borell. ic. 463. obs. 1018; Boerb. I.*- - flore maiore, foliis villosis, et incanis, *Boerb. II.*- - foliis, obscure virentibus, asperioribus, flore aureo, *Boerb. III.*- - foliis, minus incanis, flore aureo, *Boerb. IV.*- - incana, Chamaemeli odore suauiore; an Abrotanum folio tereti tridentato, *Hort. Carolsruh? Tab. nostra I. Boerb. V.*- - spinosa, foliis Agerati; Bellis spinosa *Pr. Alp. Exot. p. 326; Boerb. VIII.***S**ATUREJA, spicata, siue S. Juliani quorundam; Tragoriganum, *II. Clus. H. 355; Boerb. V. b.*- - tenuifolia, humillima, quae Thymbra legitima, *Prosp. Alpin. Exot. p. 80.*- - maior, frutescens; Tragorigani secundi altera species, flore purpureo, *Clus. H. 355; Boerb. VIII.***S**AURURUS, repens, lanceolatus; Serpentaria repens, Bryoniae nigrae folio ampliore, pingui, Virginiana, *Plukn. Phyt. T. 117. F. 3. 4; Boerb. P. II. 267.***S**CABIOSA, Africana frutescens, foliis crenatis, flore pallido, coeruleo, *Herm. P. B. p. 219. Boerb. I.*

- No. SCILLA, vulgaris, radice rubra, offic. Matth. 454. Boerb. I.
- - radice alba, Hispanica, Matth. 453. Boerb. II.
- SCLAREA, folio triangulari, caule tomentoso; Plukn. Horminum, Phyt. T. 301. F. 2; Boerb. XII.
- - rugoso, verrucoso, laciniato folio; Horminum tomentosum, folio Cornu cerui, Herm. P. B. p. 186; Boerb. XIII. b.
 - - Indica, arborescens, calyce campanulato, flore pulchro, aurantio, Leonuri maioris simili; ramum et alia vid. Tab. nostra XV.
- SCROPHULARIA, Hispanica, Sambuci folio, glabro, flore viridi, et phoeniceo, magno, Munting. Aardgew. F. 238. Boerb. VII.
- - Ruta canina dicta, Clus. H. CCIX. Zan- nich. H. Pl. Ven. F. 221. Boerb. IX.
- SEDUM, maius, arborescens, H. Eyst. Aut. O. 3. F. 8. Boerb. I.
- - foliis variegatis, Boerb. II.
 - - Canarinum, foliis omnium maximis, H. A. P. II. F. 95. Boerb. III.
 - - Africanum, frutescens, folio longo, serrato, confertim nato, Boerb. IV.
 - - montanum, tomentosum, gnaphaloides, Col. P. I. 291. Borell. obs. 551. icon. 393; Boerb. X.
 - - minus, a rupe S. Vincentii; rupestre repens, H. E. p. 343. T. 256. Boerb. XVI.
 - - Afrum, saxatile, foliolis Sedi vulgaris, in rosam vere compositis; Crassula orbicularis, repens, folio Semperuiui, H. E. p. 112. F. 118; Boerb. XXIV.

SEDUM



Sclarea Indica arborescens
calyce campanulato

- | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. | <p>SEDUM, Africanum, humile, Ficoidis folio;
Crassula caesposa, longifolia, <i>H. E.</i>
<i>116. F. 115.</i></p> <p>SENECIO, Africanus, frutescens, folio retuso;
Conyza Africana, <i>H. L. B. App. 662;</i>
<i>Boerb. V.</i></p> <p>- - Africanus, arborescens, folio ferrato,
<i>Boerb. VI.</i></p> <p>- - Africanus, arborescens, folio Ficoidis,
<i>Commel. Rar. 40. Boerb. VIII.</i></p> <p>SENNA, Italica, foliis obtusis, 2. <i>Moris. App. f. 2.</i>
<i>T. 24.</i></p> <p>- - Alexandrina, 2. <i>Matth. 1. Moris. Boerb. II.</i></p> <p>SIDERITIS, Alpina, hyssopifolia, <i>VII. Clus. II.</i>
<i>XLI. Boerb. I.</i></p> <p>- - Orientalis, Phlomidis folio, <i>Tourn. Cor.</i>
<i>12. Boerb. XIII.</i></p> <p>SILIQUA, edulis, offic; Ceratonia <i>Dod;</i> Siliquae
Arbor, <i>Matth. p. 199; Boerb. P. II. 58.</i></p> <p>SILIQUASTRUM; Arbor Judae <i>Matth. p. 171;</i>
<i>Riv. Pentap. Boerb. I.</i></p> <p>SMILAX, aspera, fructu rubente, <i>Matth. p. 138;</i>
<i>Boerb. I.</i></p> <p>- - quodammodo spinosa, fructu nigro,
<i>Boerb. II.</i></p> <p>- - non spinosa, <i>H. Carolsr.</i></p> <p>SOLANUM, scandens, foliis ex albo variegatis,
flore coeruleo, <i>Munting. Aardgew. F.</i>
<i>156. Boerb. III.</i></p> <p>- - pomiferum, frutescens, spinosum, Afri-
canum, flore Borruginis, folio Quer-
cus, profunde laciniato, <i>Moris. 15. f.</i>
<i>13. T. 1. Munting. Aardgew. F. 212. H. L.</i>
<i>B. p. 575. Boerb. X.</i></p> <p>- - pomiferum, frutescens, spinosum, Indi-
cum, folio incano, caule spinoso, fru-</p> |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

No.

fructu rotundo; an *Bocc. Rar. T. 5. p. 8?*
 folia magis accedunt ad speciem *H.*
E. p. 363; fructu tamen haec *Elth.*
 gaudet pyriformi.

SOLANUM pomiferum, frutescens, spinosum,
 Indicum, folio, et caule spinoso; ma-
 gis viridi habitu suo differt ab prae-
 cedente.

- - fruticosum, bacciferum; *Amomum Plin*;
Strycnodendron, Lobel. obs. 136. Boerb.
XIV.

SOLDANELLA, Alpina, rotundifolia, flore coe-
 ruleo, *Matth. p. 369. Boerb. P. I. 202.*

SPARTIUM, flore albo, *Clus. H. 103. Boerb. II.*

SPERGULA, multiflora, foliis inferioribus Sa-
 ponariae, *H. E. p. 368. F. 357*; *Lanaria*
J. B. 3. 347.

STACHYS, Lusitanica, frutescens maior; *Teu-*
crium regium H. R. Par. Lamium ar-
boreum perenne, Candiae, Zanon.
112. F. 46; *Teucrium fruticans Barell.*
icon. 895. obs. 242; *Galeopsis Hispani-*
ca frutescens, Boerb. VII.

- - Lusitanica, minor, quae *Lamio Zanonis*
humilior, et ramosior frutex; *Alti-*
tudo praecedentis cum verbis Zano-
nis, sed species huius plantae magis
cum icone ipsius convenit aucto-
ris; an Galeopsis, Boerb. IX?

- - *Canariensis, frutescens, Verbasci folio,*
flore albo, H. A. P. II. F. 99; Boerb. VIII.

STAPHYLODENDRON, Africanum, folio sin-
 gulari, lucido *Par. Bat. 232; H. A. P.*
I. 187; Boerb. III.

- - Africanum, folio lanuginoso, *Rosmari-*
ni latiore; an Boerb. IV?

STOE-

No. STOECHAS, purpurea, Arabica, offic. Riv. Monop.
Boerb. I.

- folio ferrato, Riv. Monop. Boerb. II.

SUBER latifolium, perpetuo virens; Phellos
Dod. 818; Boerb. II. p. 178.

T.

TAMARINDI, J. B. 1. 422; Pis. Hist. Ind. cap.
22. Lib. 4. Prosp. Alp. Aegypt. 16. Matth.
p. 191. aliam et nonnihil diuersam ico-
nem dedit H. Mal. P. I. 39. F. 23. Boerb.
P. II. 59.

TAMARISCUS Germanica, offic. i. Tabm. p.
1354. Boerb. I.

- Narbonensis, Tabm. p. 1354. Boerb. II.

TANACETUM, Africanum, arborescens, La-
vendulae multifido folio, H. A. P. II.
T. 101. Boerb. IV.

TEREBINTHUS; Pistacia vera, H. Eyst. Vern. O.
Arb. et Frut. F. 6. Fig. 1. Rauwolff. Itiner.
L. 4. n. 67.

- vulgaris, Mas, J. B. 1. 279. Boerb. I; dubium,
an inter acutifolias i. an 2. Rauwolff?

TETRAGONOCARPUS, Africanus, fruticans,
folio angusto, H. A. P. II. 205. F. 103.
Boerb. I.

TEUCRIUM, calice tubulato, flore luteolo,
Riv. Monop. H. Eyst. Aest. O. 7. F. 11.
Boerb. I.

- flore albo, rubra linea in media barba no-
tato; de reliquo simile praecedentis.

- Baeticum, calyce campanulato, H. E. p.
379. Tab. 284. Barell. icon. 512. Boerb.
III.

THLA-

- No. THLASPIDIUM, fruticosum, folio Leucoji, semper florens, *Zanon. F. 74*; Thlaspidium Persicum, *Riv. Tetrap. Boerb. I.*
- - Persicum, folio ex viridi et aureo variegato.
- THYMELAEA, Lauri folio, semper virens; Laureola mas offic. *Lobel. obs. p. 200*; *Boerb. I.*
- - Alpina, Lini folio, humilior, flore purpureo, odoratissimo, *Boerb. IV.*
- THYMUS, moschatus, vulgari duriori similis; Serpillum moschatum *Parkins. Th. 8*; *2. Moris. p. 401. Part. 3.*
- TINUS, prior *Clusii*, *Dalechamp. H. Lugd. 204.* *Boerb. I.*
- - foliis venosis, *Clus. et Boerb. II.*
 - - folio minore, *Clusii et Boerb. III.*
- TITHYMALUS, Characias, amygdaloides; Characias *II. Clus. H. CLXXXVIII.* *Boerb. II.* caule viridi, et rubente.
- - Characias, amygdaloides, folio eleganter variegato, *Boerb. III.*
 - - Indicus, frutescens, ramosissimus, pene aphyllus, *H. A. P. I. F. 14*; *Boerb. XXVIII.*
 - - Indicus, frutescens, *H. A. P. I. F. 14*; Lactaria planta *Rauwolff. Itin.*
 - - aphyllus Mauritaniae Imper. *H. E. 384. F. 373. J. B. 3. 676.*
 - - maritimus, angustiore Anacampferotis folio, in spinam brevisssimam desinente, *Raj. Synops. edit. Lond. a. 1724. p. 313. et p. 479. Tab. 24. Fig. 6.*

- No. TITHYMALUS, Orientalis, Anacamperotis folio, flore magno, cristato, *T. Cor. 2.*
 TOXICODENDRON, trifoliatum, rectum, foliis minoribus, *H. E. p. 389. T. 291.*
 TRAGACANTHA, *Prosp. Alp. Exot. p. 53. Matth. p. 503. Boerb. I.*
 TRIFOLIUM, bitumen redolens, *1. Moris. f. 2. T. 12. Riv. Tetrap. Corn. H. Plant. Can. p. 131. Boerb. XXIV.*
 TULIPIFERA, Arbor Virginiana, *H. L. B. p. 613. Catesby H. N. Car. Tom. 1. T. 48. Boerb. P. II. 262.*

V.

- VERBENA, nodiflora, *C. B. Prodr. 125. Boerb. VIII.*
 VIBURNUM, Americanum, odoratum, folio Urticae, floribus miniatis, *H. A. P. I. F. 78; Pseudo-Viburnum Riv. Monop; Camara H. E. p. 64; Boerb. III.*
 VITEX, foliis angustis, Cannabis modo dispositis, flore coeruleo, *T. 604. Matth. p. 173. Lobel. adv. 469. Boerb. II. offic.*
 - - siue Agnus castus *offic. flore albido, Riv. Monop. Boerb. III.*
 - - trifolia, minor, Indica, ferrata, *H. A. P. I. F. 92; H. Mal. P. II. F. II. p. 15; Boerb. VI.*

X.

- XYLON, arboreum; Gossypium frutescens, *Matth. p. 334; offic. Boerb. I.*

Y. Yuc-

No.

Y.

YUCCA, folio Aloes, 1. *Moris. T. 23. f. 4. App.*
Barell. icon. 1194. Boerb. II. 132.

- - Draconis folio, ferrato, *H. Elth. p. 437;*
 Aloe Americana, Draconis folio fer-
 rato, *Commel. Prael. 67. Boerb.*
Aloe XI.

Z.

ZINGIBER, latifolium, syluestre, *H. L. B. p. 637.*

Zerumbeth Americanum, syluestre,
 latifolium, *Garziae ab Horto; Boerb. I.*

- - quod Zedoaria Zeylanica, camphoram
 redolens, *Boerb. II.*

- - tenuifolium, *Matth. p. 438.*

ZIZIPHUS, *Matth. p. 219. Boerb. P. II. 245.*



CLASSIS SECUNDA

P L A N T A R U M

PERENNIIUM.

No.

A.

ABIES, taxi folio, fructu sursum spectante;
Abies altera, *Dodon. 6. 5. 16. Boerb. I.*

- - tenuiore folio, fructu deorsum spectante;
Picea, *Dodon. 6. 5. 13; Boerb. II.*

ABROTANUM, officinarum, *Matth. p. 512. Boerb. I.*
- - campestre, cauliculis rubentibus, *Garid. Hist. Plant. Boerb. III.*

ABSINTHIUM, vulgare, latifolium, *officin. 1. Moris. f. 6. T. 1; 1. Matth. p. 508. Boerb. III.*

- - insipidum, *Boerb. IV.*

- - Ponticum, tenuifolium, incanum, *offic. 3. Matth. Boerb. VII.*

- - marinum, album; seriphium Belgicum, 22. *Moris; ab praecedente differt angustioribus foliis, et minoribus floribus, Boerb. XI.*

ACANTHUS, rarioribus, et brevioribus aculeis, *Boerb. II.*

- - aculeatus, *H. Eysl. Aest. O. 11. Fol. 1. Fig. 1. Boerb. III.*

ACER, maius, montanum, *J. B. 1. 168. Boerb. I.*

- - alterum, Platani folio, *J. B. l. c; Acer Platanoides, Munting. Aardgew. Fig. 11. Fol. 57.*

- - minus, campestre, *J. B. 1. 166. Boerb. II.*

D

A CER

- No. ACER, folio magis tricuspidato, Monspessulanum, *H. L. Dalech. 95. Boerb. III.*
- ACETOSA, maior, pratensis, *offic; Matth. Oxalis, p. 353; Munting. Aardg. F. 73. Boerb. I.*
- - Hispanica, maxima, *Munting. Aardg. F. 75. Boerb. II.*
 - - rotundifolia, hortensis, *offic. Munting. Aardg. F. 74. Boerb. V.*
 - - foliorum luteolis venis, fere, sicut *Bocc. Mus. Tab. 125.*
 - - maior, lanceolata, *Munting. Aardg. Fig. 77. Boerb. IX.*
 - - minor, lanceolata, *offic. Munting. Fig. 76. Boerb. X.*
- ACONITUM, luteum, lycoctenum, maius; Napellus, *Riv. Pentap; Boerb. I.*
- - idem, flore pallidior, luteo, *Boerb. II.*
 - - salutiferum; Anthora, *Riv. l. c; Napellus tenuifolius, Matth. p. 796. offic. Boerb. IV.*
 - - flore coeruleo; Napellus, flore maiore, *Riv. Pentapet; Boerb. V.*
- ACORUS, siue Calamus aromaticus, *offic. Matth. p. 21. Boerb. I.*
- ADIANTHUM corniculatum; Filix, *J. B. 3. 747; Filix saxatilis, corniculata, Boerb. VII.*
- - aureum; Polytrichum aureum, aut muscus capillaris aureus, *Tabm. J. B. 3. 752; Muscus Boerb. XXIX.*
 - - nigrum, *Tabm. Dod. p. 466. it. Filicula; Capillaire ordinaire, Tourn. offic. Boerb. I.*
 - - album, *offic. 3. Tabm; Paronychia Matth; Ruta muraria, Boerb. P. I. 26.*

- No. ADONIS, Hellebori radice; Helleborus Hippocratis, flore luteo; Pseudo-Elleborum *Matth. p. 846; Boerb. III.*
- AGERATUM, quod Eupatorium *Mesue, offic;* Ageratum, *i. Matth. p. 740. Boerb. II.*
- AGRIMONIA, odorata; Eupatorium odoratum, *Morif. 2. 651. Camer. H. Borell. ic. 611. Boerb. I.*
- - vulgaris, *offic;* Eupatorium veterum, *Matth. p. 717. Boerb. II.*
 - - minor, flore albo, *H. Cathol. Boerb. IV.*
- AJUGA, *Riv. Monop;* Polium montanum, angustifolium, flore luteolo, *VII. Clus; Boerb. I.*
- ALCEA, rosea, hortensis, maxima, folio Ficus, flore albo, *Boerb. I.*
- - vulgaris, flore roseo, *Matth. p. 663.*
 - - vulgaris, candidiore flore.
 - - cannabina, fruticosa; cuius vera forma est illa Alceae vulgaris, *H. Eyst. O. 6. Aest. Fol. 3. Fig. 1.*
 - - Thuringiaca, folio molli, flore maiori roseo, *H. E. T. 8. p. 9.*
 - - flore minori, pallido roseo; foliis magis laciniatis tantum ab vulgari Althaea differt.
 - - Virginiana; Abutilon, vel Althaea Ricini folio, *H. L. B. p. 23; Boerb. IX.*
- ALCHIMILLA, maior, *offic;* Stellaria, *Matth. p. 819; Garidell. T. 4. Boerb. I.*
- - minor, perennis, Alpina, *Boerb. II.*
- ALISMA, *Rivini, et Cordi,* latifolium; Plantago, aquatica, *Tabm. 1111; Boerb. I.*
- - angustifolium; Plantago aquatica, *Tabm. 1112; Boerb. II.*

- No. ALKEKENG1, officin; Halicacabum vulgare;
Solanum Halicacabum, *Matth. p. 754;*
Boerb. I.
- ALLIUM, sativum, 9. *Moris. offic. Boerb. I.*
- - alterum, caulis summo in circulum con-
voluto; aliis Serpentinum dictum; 10.
Moris. Boerb. II.
 - - urfinum, latifolium, sylvestre, *Matth. p.*
422. Boerb. III.
 - - latifolium, montanum, maculatum, *Mo-*
ris. f. 4. T. 15. F. 16. p. 388; Victoralis
longa, offic. *Clus;* Moly Alpinum, *Rupp;*
Boerb. IV.
 - - angustifolium, montanum, bicornu, 5. *Mo-*
ris. f. 4. T. 14.
 - - angustifolium, caule folia perforante, vi-
tigineum; *Moris. Porrum f. 4. T. 15.*
- ALNUS, *Matth. p. 132. Boerb. I.*
- ALSINE, nemorum altissima, 1. *Moris. Boerb. I.*
- - media; morsus gallinae; *Boerb. II.*
 - - spergulae facie, flore subcoeruleo; ma-
rina 15. *Morison. f. 5. T. 23. Boerb. VII.*
 - - pratensis, gramineo folio, ampliore,
Tourn. p. 243. J. B. 3. 361. Tabm. p. 542;
vulgo Holosteum; *Lychnis Boerb.*
LXXIII.
 - - pratensis, gramineo folio, angustiore,
T. 243; Gramen floridum, minus,
Tabern. pag. 542. Lychnis, Boerb.
LXXIV.
- ALTHAEA, vulgaris, folio molli, flore carneo,
offic. *Matth. p. 662. Boerb. I.*
- ALYSSE, incanum; *Morison. Leucojum*
6. P. II. f. 3. T. 9; Thlaspi, folio villo-
so, incanum, aliter dictum; *Boerb.*
II.

- No. ALYSSON, halimi folio, semper virens; Thlaspi,
H. L. B. p. 595; Boerb. VIII. b.
- - Veronicae folio; Draba muralis Dio-
scoridis, minima, *Column. Rar. 272.*
- AMMI, perenne; Falcaria Riv. *Pentapet; Boerb.*
III.
- AMYGDALUS, *Matth. p. 221. Boerb. I.*
- - amara, *Boerb. IV.*
- - Indica, nana, *Munting. Aardg. Fig. 7. p. 34.*
Boerb. V.
- ANACAMPSEOS, *Matth. p. 472; Telephium*
Dioscoridis, flore purpurascence;
Boerb. VIII.
- - seu Fabaria, flore albo, *offic. Matth. l. c.*
Boerb. IX.
- - seu Telephium, radice rosam spirante,
8. Moris. f. 12. T. 10; Rhodia radix
Matth. p. 724; Boerb. X.
- - minor; Sedum *46. Moris. f. 12. T. 8; rotun-*
diores folio, Boerb. XII.
- ANAGALLIS, lutea nemorum, *5. Moris. f. 5. T.*
26. Boerb. I.
- ANDROSAEMUM, foetidum, maximum, frute-
scens; Siciliana *H. Eyst. Aest. O. 8. Fol.*
10. Fig. 1; Boerb. P. I. 242.
- ANEMONE, montana, flore albo, maior sylue-
stris *Clus. H. 244. Boerb. I.*
- - hortensis; et variae eius species, *Matth. p.*
462. vid. Boerb. P. I. 37. 38.
- ANEMONOIDES, flore albo; Ranunculus *8.*
Tabm. Boerb. I.
- - seu Nemorosa, flore incarnato; Ranun-
culus, *9. Tabm; Boerb. II.*
- - flore pleno, purpurascence, *Boerb. III.*
- - flore luteo, unico, *Boerb. VIII.*

- No. ANEMONOIDES, flore luteo, bino, et terno;
Ranunculus 7. *Tabm; Boerb. IX.*
- - flore albo, pleno, *Boerb. X.*
- ANGELICA, fatiua, *offic. Riv. Pentap. Boerb. II.*
- - sylvestris, maior, minoribus foliis, 2. *Morif; palustris Riv. Pentap. Boerb. III.*
 - - sylvestris, repens; *Podagraria Riv; Boerb. IV. offic.*
 - - Canadensis, folio lucido, *Corn. Hist. Pl. Canad. p. 197. Riv. Pentap. Boerb. VIII. b.*
- ANONIS, spinosa, flore purpureo, vulgaris, *offic. Riv. Tetrap. Boerb. I.*
- - spinosa, flore albo, *Boerb. II.*
 - - spinis carens, floribus candidis, *Boerb. III.*
 - - spinis carens, flore purpureo, *Matth. p. 501. Boerb. IV.*
- ANTIRRHINUM, maius, flore rubro, rictu luteo, *Riv. Monop. Garid. T. 7. Boerb. I. b.*
- - flore albo, rictu luteo, *Boerb. IV. b.*
 - - flore carneo, rictu aureo, *Boerb. VI. b.*
- APIOS, Americana; Glans terrestris, *Munting. Aardg. F. 107. p. 349; Corn. Hist. Pl. Canad. p. 201. Boerb. P. II. 53.*
- APIUM, tenuifolium, *offic. Riv. Pentap. b.*
- - folio crispo, *Riv. Pentap. b.*
 - - satium, *offic. Riv. Pentap. b.*
 - - palustre, *officin. 8. Morison. Boerb. VI.*
 - - dulce; Celeri Italorum; *Apium Riv. Pentap. Boerb. VII. offic. b.*
 - - Macedonicum *officin; Petroselinum Macedonicum Matth. p. 563; Daucus Riv. Pent; Boerb. XIV. b.*
 - - folio subrotundo, 13. *Morison. Boerb. XV. b.*
- APOCYNUM, Americanum, aut Syriacum maximum,

- No. ximum, latifolium, glomeroso flore
roseo, odorato, in umbella, 6. *Raji*;
Munting. Aardg. F. 104. p. 345. Corn. p.
90. Boerb. I.
- APOCYNUM, erectum, Canadense, angustifo-
lium, flore rubro, *Corn. Hist. Pl. Canad.*
p. 93. Boerb. V.
- AQUIFOLIUM, seu Agrifolium, *Lobel. obs. p.*
582; Boerb. I.
- AQUILEGIA, pumila, praecox, Canadensis,
Cornut. p. 60. Boerb. XV. b.
- - sylvestris, officin; et plures Aquilegiae
hortensis species; vid. *Boerb. P. I. 303.*
- ARISARUM, latifolium, *Matth. p. 450. Dodon.*
3. 1. 8. Boerb. I.
- ARISTOLOCHIA, longa, offic. *Riv. Monop.*
Boerb. II.
- ARMENIACA MALUS, maiore fructu, *Matth.*
p. 204. Boerb. I.
- - minori fructu, *Boerb. II.*
- ARTEMISIA, caule rubro, offic. *Matth. p. 617.*
Boerb. I.
- - caule, ex viridi albicante, officin. *Boerb. II.*
- ARUM, vulgare, offic. *Riv. Monop. Boerb. III.*
- - palustre, radice arundinacea; Draconti-
um palustre, *Tabm. 1122; Matth. Dra-*
cunculus, 446; Boerb. V.
- ASARINA, *Lobellii obs. p. 329. Boerb. P. I. 234.*
- ASARUM, officin. 1. *Matth. p. 36. Boerb. I.*
- ASCLEPIAS, flore albo; Vincetoxicum, officin.
Matth. p. 592. Boerb. I.
- - seu Vincetoxicum, flore nigro, *Matth.*
p. 592. Boerb. II.
- ASCYRUM, magno flore; Androsaemum ma-
ximum, bacciferum, 12. *Moris. f. 5. T.*
6. Boerb. I.

- No. ASPARAGUS, hortensis, officin. *Matth. p. 373. Boerb. II.*
- ASPHODELUS, flore albo, folio fistuloso, 1. *Matth. p. 451. non ramosus Boerb. III.*
- - flore luteo, folio fistuloso, 2. *Matth. p. 451; non ramosus Boerb. V.*
- - Allobrogorum, magno flore; Liliastrum, *Tourn. Tab. 194; J. B. 2. 636. Moris. P. II. 33. Phalangium, lilii flore; Boerb. VI.*
- ASPLENIUM, seu Ceterach, officin; Scolopendria vera, *Dod. p. 465; Boerb. P. I. 25.*
- ASTER, qui Helenium vocatur, officin; Enula *Matth. 72; Boerb. I.*
- - nouae Angliae, flore purpuro-violaceo; *Volck. p. 50. Herm. P. B. p. 98. Boerb. III.*
- - noui Belgii, umbellatus, *H. L. B. p. 69. Boerb. V.*
- - qui Tripolium marinum, *Dod. p. 375. offic. Cat. H. A; maritimus, flore coeruleo, Boerb. XII.*
- - folio salicis, hirsuto, flore luteo, Austriacus, *V. Clus. XIV; 2. Moris. 3. 118. f. 7. T. 21. Boerb. XXIV.*
- - folio glabro, salicis, flore luteo; hic esset *Austriacus II, Clus. Hist. XIV. qui citatur cum Boerb. XXV, si modo capitula foliolis sustinerentur.*
- - Atticus, flore coeruleo, *Matth. p. 817. Boerb. XVI.*
- - folio salicis, angustiore; Austriacus 6. *Clus. H. XV.*
- - qui Jacobaea 2, *Clus. Hist. XXII.*
- - flore albo, specioso, folio angusto; an, ferotinus, procerior, ramosus, bellidis syluestris flore, *Tourn. 482?*
- ASTERISCUS, folio angusto, aspero, obscure viridi,

No.

viridi, non ferrato; de reliquo simili Aſteri IV. Auſtriaco II. *Cluſ. Hiſt. XIV.*

ASTRAGALUS, folio ſubdulci, *Riv. Tetrap. ſiliqua longa, Boerb. I.*

- - Orientalis altiffimus, folio Galegae, flore paruo, flaueſcente, ſiliqua curta; ſufficere poterit Icon diuerſae non nihil ſpeciei *H. E. p. 46. Boerb. II.*

- - purpureus, Monſpeliacus, 3. *Moriſ. Boerb. III.*

- - repens, ſiliqua curta, tenuiore folio, flore ex coeruleo purpuraſcente; convenire videtur cum 5. *Moriſ. ſeu Onobrychide 2. Cluſ. H. CCXXXIX.*

- - repens, ſiliqua curta; Glaux, flore ochroleuco, *Riv. Tetrap.*

- - luteus, perennis, ſiliqua gemella, rotunda, veſicam referente, 9. *Moriſ. ſ. 2. T. 9. Boerb. III. in 2do gen.*

ASTRANTIA, *Riv. Pentap. Boerb. I.*

AURICULAE URSI, hortenſis, variae ſpecies, *Boerb. P. I. 200.*

AURICULA urſi, minima, 3. *Moriſ. ſ. 5. T. 24; Sanicula Alpina, flore carneo, 2. Tabm. p. 707.*

- - urſi, minima, flore niueo, 9. *Tabm. p. 705; 8. Cluſ. H. 305. Lobel. obſ. 308.*

- - urſi, Alpina, anguſtifolia, 7. *B. 3. 602. App; Sanicula 5. C. B. P. 243; Boerb. XV.*

B.

BALLOTTE, *Matth. p. 601; aliorum Marrubium nigrum; Boerb. I.*

BALSAMITA, quae Mentha Saracenica, et
D 5 Graeca,

No.	Graeca, <i>Matth.</i> p. 527; <i>Boerb.</i> P. I. 125.
	BELLADONNA; Solanum maius, <i>Matth.</i> p. 756; <i>Boerb.</i> I.
	BELLIS, sylvestris, minor, <i>offic.</i> <i>Boerb.</i> I; et plures simplicis floris, plerique varietates, <i>Matth.</i> p. 653. 654. <i>Boerb.</i> P. I. 108.
	BERBERIS dumetorum, <i>offic.</i> ; Crespinus <i>Matth.</i> p. 150; <i>Boerb.</i> I.
	BETONICA, Danica, siue maior ramosa, flore albo, <i>Park. Theatr.</i> 615. <i>Boerb.</i> I.
	- - purpurea, vulgaris, <i>offic.</i> <i>Riv. Monop.</i> <i>Boerb.</i> II.
	- - flore carneo, <i>Boerb.</i> IV.
	BETULA, <i>Matth.</i> p. 132; <i>Boerb.</i> P. II. 182.
	BIGNONIA, Americana, fraxini folio, flore amplo, phoeniceo; Gelseminum Clematites, <i>Barell. Ic.</i> 59. <i>obs.</i> 186; <i>Riv. Monop.</i> Pseudo-Gelseminum; <i>Boerb.</i> I.
	BISTORTA, maior, <i>offic.</i> <i>Matth.</i> p. 674. <i>Boerb.</i> II.
	BLATTARIA, flore albo, extus violaceo, <i>J. B.</i> 3. 859. <i>Boerb.</i> III. a. b.
	- - flore luteo, rugoso, verbasci folio, <i>Matth.</i> p. 802. <i>Boerb.</i> VI. b.
	- - nigrae Violae flore, <i>Boerb.</i> IX.
	BRUNELLA, flore magno, coeruleo, <i>Riv. Monop.</i> ; Prunella folio non laciniato, <i>Clus. H.</i> XLIII; <i>Boerb.</i> I. b.
	- - vulgaris, flore coeruleo, <i>officin.</i> <i>Riv. Monop.</i> <i>Boerb.</i> II. b.
	- - folio non dissecto, flore albo, <i>Boerb.</i> III. b.
	- - folio laciniato, flore purpureo, <i>Clus. H.</i> XLIII; <i>Boerb.</i> IV. b.
	- - folio laciniato, flore albo, <i>Boerb.</i> V. b.
	BRYONIA, alba, <i>officin.</i> ; Vitis, i. <i>Matth.</i> p. 882; baccis rubris, <i>Boerb.</i> I.

BRYO-

- No. BRYONIA, baccis nigris; utraque officinarum.
 BUGLOSSUM, sylvestre, angustifolium, officin.
 flore violaceo, 2. *Matth.* p. 825. *H. Eyst.*
Aestiv. O. 8. F. 6. Fig. 1. b.
 - - sylvestre angustifolium, flore albo, b.
 - - maiore flore, coeruleo, diluto, *Lobel. obs.*
 310; *Boerb.* I. b. offic.
 - - latifolium, flore minori borraginis; Bor-
 rago, semper virens, maior, *Munting.*
Aardgew. fol. 127. *Lobel. adv.* p. 247;
Boerb. III.
 - - montanum, flore atropurpureo, *Matth.*
 p. 326. *Moris.* 3. sect. 11. T. 26; *Echioides*
 flore pullo, *Riv. Monop.* b.
 BUGULA, montana, villosa, flore coeruleo pal-
 lidiore, *Riv. Monop.* *Boerb.* II.
 - - flore coeruleo, officinarum, *Riv. Monop.*
Boerb. II.
 - - flore albo, *Boerb.* III.
 - - sylvestris, flore suaverubente, *Boerb.* V.
 BUPHTHALMUM, tanacetiminoris folio, flore
 aureo; *Buphthalmum Chrysanthemo* con-
 gener, *Clus. H.* 332; *Chrysanthemum* 41. *Moris.* f. 6. T. 6. *Boerb.* I. a. b.
 BUPLEURUM, folio angustiore, 3. *Moris.* sect. 9.
 T. 12. *Riv. Pentap.* *Boerb.* III. b.
 BUTOMUS, flore roseo; *Juncus floridus*, *Matth.*
 p. 731; *Boerb.* I.
 BUXUS, humilis, *Matth.* 169; *Boerb.* II.

C.

CACALIA, tomentosa, *Clus. H.* CXV. *Boerb.*
 P. I. 118.

CACHRYS, folio *Peucedani*, femine minore,
 fulcato, 6. *Moris.* f. 9. T. 1. *Umbellif.* T.
 3. n. 2.

CA-

No.	CACHRYS, Sicula, semine fungoso, striato, lanuginoso, latissimo folio, 4. <i>Morif. f. 9. T. 1</i> ; Panax, <i>Bocc. T. I. Rar.</i>
	CACUBALUS Plinii; Alfine scandens, baccifera, <i>Morif. P. II. f. 1. T. 1</i> ; <i>Boerb. P. II. 71.</i>
	CALAMINTHA, vulgaris, officin. <i>Riv. Monop. Boerb. II.</i>
	CALCEOLUS Mariae, <i>Riv. Hexap.</i> ; Helleborine, 14. <i>Morif. f. 12. T. 11.</i>
	CAMERARIA, <i>Rupp</i> ; Alfine fluuiatilis, <i>Tabm. 1090.</i>
	CAMPANULA, persicae folio, angusto, flore coeruleo, <i>Morif. 2. f. 5. T. 1. Lobel. obs. p. 177. Boerb. II.</i>
-	- persicae folio, angusto, maior, flore albo, <i>Boerb. IV.</i>
-	- persicae folio, angusto, flore albo, pleno, <i>Boerb. V.</i>
-	- radice esculenta, 13. <i>Morif</i> ; Rapunculus vulgo; <i>Boerb. VIII. b.</i>
-	- quae Rapunculus VII. Nemorosus III. <i>Tabern. icon. 795.</i>
-	- sylvestris, inferius fere rotundifolia, <i>Lobel. obs. p. 178. Boerb. X.</i>
-	- maxima, foliis latissimis, flore coeruleo, <i>Boerb. XVII.</i>
-	- maxima, foliis latissimis, flore albo, <i>Boerb. XVIII.</i>
-	- folio urticae, maiore, flore coeruleo, <i>Boerb. XIX.</i>
-	- folio urticae, maiore, flore albo, <i>Boerb. XX.</i>
-	- folio urticae, maiore, flore coeruleo pleno, <i>Boerb. XXI.</i>
-	- folio urticae, maiore, flore albo, pleno, <i>Boerb. XXIII.</i>

- No. CAMPANULA, conglomerata, pratensis; Trachelium, flore pallido, coeruleo, *Moris. 43. f. 5. T. 4. Lobel. obs. p. 176; Boerb. XXIX.*
- CAPNOIDES, flore purpureo, et luteo; Pseudofumaria Indica, *Rivini Tetrap. Borell. ic. 108. Corn. 58. Boerb. P. I. 309.*
- CAPRIFOLIUM; Periclymenum non perfoliatum, Germanicum, 2. *Matth. p. 691; Boerb. I.*
- - Italicum, perfoliatum, *Garidell. Boerb. II.*
- - Germanicum, flore rubello, *Boerb. III.*
- CARDAMINE, flore maiore, elatior; Nasturtium aquaticum, maius, et amarum, *J. B. 2. 885. Boerb. XI.*
- CARDIACA, flore albo, offic. *Riv. Monop; Melissa sylvestris Tragi; Boerb. I.*
- - flore roseo, pallido.
- - crispa *Raii, Boerb. II.*
- CARDUUS, tomentosus, Acanthi folio, altissimus, Lusitanicus, *Boerb. XIX. b.*
- - nemorum altissimus; Cirsium, *Borell. ic. 417; Carduus pycnopolycephalos, sylvestris, Triumph. obs. p. 100.*
- - scolymus sylvestris, *J. B. 3. 51. Lobel. Adv. 366; Cinnara Zannich. H. Pl. Ven. F. 113.*
- CARLINA, acaulos, officin; Chamaeleon albus, *Tab. 1068; Carduus Xeranthemus, acaulos, albus, 3. Moris. f. 7. T. 33; Chamaeleon albus, Matth. p. 490; Boerb. I. P. I. p. 101.*
- - caulescens, flore magno, albicante; Carduus Xeranthemos, 4. *Moris. f. 7. T. 33; Chamaeleon niger, vulgaris, H. Eyst. O. 11. F. 8; offic. Boerb. II.*
- CARPINUS, *Matth. p. 135. Boerb. P. II. 176.*

CARY-

- No. CARYOPHYLLATA, vulgaris, officin. 1. *Matth. p. 697. Boerb. I.*
- - vulgaris, folio variegato.
 - - Alpina, aureo flore, magno, 2. *Clus. H. CIII. Boerb. II.*
 - - capite nutante, aquatica, *Boerb. IV.*
 - - montana, flore luteo, nutante, *Matth. 697. Boerb. VI.*
- CARYOPHYLLUS, plumosus, hortensis, 10. *Tabm. 667. Boerb. XXIX.*
- - hortensis, eiusque colore, et floris habitu, diuersae species; e quibus multiplex ruber, *Dodon. p. 174. est offic.*
 - - Chinensis, et eius diuersae species; *Carthus, 2. Tabm. p. 667.*
 - - plumosus, sylvestris, flore albo, *Boerb. XXXI.*
 - - plumosus, sylvestris, flore roseo, *Boerb. XXXII.*
 - - barbatus, sylvestris, flore rubro, pleno, *17. Moris. T. 25. f. 5. Boerb. XLI.*
 - - barbatus idem, vel Carthusianorum flos simplex, aut armerius, *Moris. 18. T. 25. f. 5; 1. Tabm. p. 667; et eius diuersae species.*
 - - sylvestris, flore purpureo, *Matth. p. 436. Boerb. LIV.*
 - - sylvestris, siue Tunica sylvestris minima, *H. Lugd. 1191. muralis, Zannich. H. Pl. Ven. F. 70. Boerb. LV.*
- CASSIDA, Lamii folio, flore ex parte purpurascens, vel ex albido, *Colum. Rar. 1. 187. Corn. 129. Boerb. I. et II. b.*
- - vulgaris; *Scutellaria, 1. Riv. Monop; Boerb. IV.*
 - - vulgaris, flore albo, *Boerb. V.*

- No. CASTANEA, maiore fructu, fatiua, *Matth. p. 183. Boerb. I.*
- - sylvestris, minore fructu.
- CATANANCE, seu Chondrilla quorundam coerulea, Cyani capitulo, *Barell. ic. 1134; Moris. Cichorium quartum; Boerb. I.*
- CATARIA, maior, vulgaris; *Nepeta offic. Riv. Monop; Boerb. I.*
- CEPA, *offic. Matth. p. 419. Boerb. I.*
- - scitilis, iuncifolia, *offic. Schoenoprasum Moris. f. 4. T. 14; éscalotte; Boerb. IV.*
- CENTAURIUM, maius, orientale, erectum, glaberrimum, folio, flore luteo, *Commel. Rar. F. 39. Boerb. I.*
- CERASUS, vel Cerasia, *Matth. p. 197.*
- - flore pleno, *Boerb. I.*
- - pumila, *Boerb. III.*
- - racemosa; *Padus Theophrasti* quorundam; *Cerasia racemosa nigra, Matth. p. 197. Tabm. 1401; Boerb. V.*
- CERASI, hortensis diuersae species.
- CHAEROPHYLLUM, palustre, latifolium, flore albo; *Myrrhis palustris Rivini in Pentap; Boerb. III.*
- CHAMAECERASUS, Alpina, fructu gemino, rubro, duobus punctis notato; *Xylosteum, folio cerasi maiore, Riv. Monop. Boerb. I.*
- - Alpina, fructu gemino, nigro, *C. B. P; Periclymenum rectum, 3. Clus. H. 58; Boerb. II.*
- - dumetorum, fructu gemino, rubro; *Xylosteum, Riv. Monop. Boerb. III.*
- CHAMAECLEMA; *Hedera terrestris officin. vel Chamaecissus; Boerb. I.*

CHA-

- No. CHAMAEDRYS, maior, repens, *offic. Riv. Monop.*
II. Moris. f. II. T. 22. Boerb. I.
- - minor, repens, *10. Moris. l. c. Boerb. II.*
 - - multiflora, repens, Hispan. folio pulchre laciniato, flore albido, facie Teucris Orientalis, *Commel. Rar. 25;* flore minore, nec odorato, differre videtur ab *Boerb. IV. a. b.*
- CHAMAEMELUM, Romanum, siue nobile *officinarum*, *Matth. p. 649; Boerb. III.*
- CHAMAENERION, quod *Lyfimachia speciosa*, *J. B. 2. 906. 907; Chamae-Daphne Matth. p. 842; H. Eyst. Aest. O. I. Fol. 8. Fig. 1. Boerb. I.*
- - aquaticum, filiquosum, hirsutum, flore magno; *Lyfimachia, Morison. 3. f. 3. T. 2. co. Boerb. III.*
 - - glabrum; *Lyfimachia purpurea*, filiquosa, aut filius ante patrem, *Lobel. p. 185. a. b. Morison. et Boerb. V.*
- CHELIDONIUM, *offic. maius*, *Matth. p. 468. Boerb. I.*
- - foliis, et floribus valde laciniatis, *H. R. P; Boerb. III.*
- CHONDRILLA, fonchi folio, flore purpurascence, *J. B. 2. 1005. Boerb. II.*
- - iuncea, viscosa, *Tabm. 7. p. 487; lactuca sylvestris, perennis, lutea, iuncea, Moris. P. III. 58. Vaill. 1. Bot. Par. Boerb. IV.*
- CHRISTOPHORIANA, *Tabm. p. 1163; Aconitum bacciferum; Boerb. I.*
- CHRYSOSPLENIUM; *Saxifraga aurea*, *Dod. p. 313; Boerb. I.*
- CICHORIUM, *offic. domesticum*, *Matth. p. 387. Boerb. IX.*

CICHO-

- No. CICHORIUM, flore albo, *Boerb. XI.*
 - - flore roseo, *Boerb. XII.*
 CINARA, *officin*; Scolymus esculentus; Carduus non aculeatus, *Matth. p. 497*; 1. *Moris. f. 7. T. 33*; *Boerb. I.*
 - - hortensis, aculeata, *offic*; Carduus aculeatus, *Matth. p. 496*; *Boerb. IV.*
 CIRCAEA, Lutetiana, *Lob. obs. 137. Boerb. I.*
 CIRSIUM, flore purpureo, 23. *Moris. f. 7. T. 29. Boerb. IV.*
 - - flore albo; praeterea vix differt ab praecedente.
 - - acaule, flore purpureo; Carduus acaulis, *Lob. obs. 480.*
 - - pratense, foliis latioribus, diuisis, viridibus, floribus flauescentibus, in capite folioso, 20. *Moris. f. 7. T. 29. Boerb. VIII.*
 - - floribus compactis, albis, 8. *Moris. l. c.*
 CISTUS, folio rosmarini latiore; Ledum Silesiacum, *Clus. H. 83*; Rosmarinus sylvestris, 3. *Matth. p. 576*; *Lobel. 558.*
 CLEMATITIS; Flammula surrecta, alba; Flammula altera, *Dodon. p. 400*; *Boerb. I.*
 - - Pannonica, erecta, flore violaceo, 2. *Tabm. 1271. Boerb. V.*
 - - scandens, folio laciniato, flore coerulescente, 2. *Matth. p. 680. Boerb. VI.*
 - - flore coeruleo, pleno, *Clus. Cur. post. in 4to p. 14. Boerb. IX.*
 CLINOPODIUM, vulgare, *Riv. Monop. Boerb. I.*
 COCHLEARIA, folio cubitali; Armoracia vulgaris, *Matth. p. 350*; *Boerb. I.*
 COLCHICI, octo species, *Boerb. P. II. 117.*
 COLUTEA, vulgaris, *offic.* flore luteo, *Riv. Tetrap. Boerb. I.*

- No. COLUTEA, vulgaris, flore puniceo.
- COMA AUREA, Germanica; Linaria aurea, *H. Eyst. Aest. O. 1. F. 14*; Virga aurea, folio Linariae, 29. *Moris*; *Boerb. I.*
- CONVOLVULI, ab *Boerb. I. ad IX.*
- CONYZA, Pyrenaica, flore aureo, foliis rugosis Primulae veris, *Herm. P. B. 127. Boerb. I.*
- - maior Dioscoridis, floribus luteis, *Don. 1. 2. 32. Boerb. IV.*
- CORNUS, mas, *Matth. p. 213. Boerb. I.*
- - foemina, Ossea dicta; Virga Sanguinea, *Matth. p. 214; Boerb. II.*
- CORONA IMPERIALIS, vulgaris, 2. *Moris. f. 4. T. 19. Boerb. I.*
- - folio argentato, *Boerb. IV.*
- CORONA SOLIS, altissima, Virginiana; Chrysanthemum angustifolium, viride, 66. *Moris. f. 6. T. 7*; quod referri in Auctore debet ad *num. 70.*
- - paruo flore, radice tuberosa, esculenta; Chrysanthemum, 57. *Moris. f. 6. T. 6. Boerb. IX.*
- - foliis amplioribus, laciniatis; Doronicum Americanum maius; *Boerb. XV.*
- - foliis angustioribus, laciniatis, *Boerb. XVI.*
- - quae Chrysanthemum Americanum, perenne, latifolium, 59. *Moris. sect. 6. T. 7.*
- CORONILLA, flore vario, herbacea, *Riv. Tetrap. Gard. Boerb. VI.*
- CORYLUS, sativa, *Boerb. III.*
- - sylvestris; Nux auellana, *Matth. p. 229. Boerb. V.*
- - Byzantina, altissima, et maxima, *Boerb. VI.*

- No. CRACCA, syluatica, maior, perennis, Riv. *Tetrap*; Vicia multiflora, Boerb. II. 2. gen.
- CRAMBE, Orientalis, dentis leonis folio, Eru-
caginis facie, T. Cor. Boerb. II.
- CRATAEGUS, folio subrotundo; Mespilus,
Alni effigie, lanato folio, maior, H. L;
Sorbus Alpina, J. B. 1. 65; Boerb. I.
- - folio laciniato; Sorbus torminalis, 3.
Matth. p. 215; Boerb. IV.
- CROCUS, autumnalis, flore coerulescente, sa-
tius, officin. 1. Moris. f. 4. T. 2. Boerb.
XXV.
- - flore pallido, purpureo, Boerb. XXVII.
- CROCI verni diuersae species, flore albo, lu-
teo, coeruleo, et violaceo, Moris. f. 4.
T. 2; vid. Boerb. P. II. 118. 119.
- CRUCIATA, hirsuta, flore luteo, 1. Moris. f. 9. T.
21; Dod. p. 353; Cruciata herniaria
Thal. offic.
- CUCULI flos, roseus; Lychnis pratensis, flore
laciniato, 8. Moris. f. 5. T. 20. Tabm.
15. pag. 677; Lychnis, Boerb. XLVI.
- - flos, plenus, purpureus; Lychnis, Boerb.
XLVII.
- - flos, albus; Lychnis, Boerb. XLVIII.
- - flos, plenus, albus; Lychnis Boerb.
XLIX.
- CYANUS montanus, latifolius, maior, H. Eyst.
Vern. O. 7. F. 6. Fig. 2; Chironia
Riv; Boerb. I.
- CYCLAMINUM diuersae species, Boerb. P. II.
150. 151.
- CYDONIA, fructu maiore; Cotonea pyrus,
Matth. p. 202; Boerb. I.
- - fructu minore; Cotonea malus, Matth.
p. 202; Boerb. II.

- No. CYDONIA, angustifolia, vulgaris, *Boerb. III.*
 CYMBALARIA, *Riv. Monop. Matth. p. 788; Linaria, Boerb. XIX. a. b.*
 CYNOGLOSSUM, maius, vulgare, flore rubro, *offic. Matth. p. 827. Boerb. I. b.*
 - - maius, vulgare, flore albo, montanum, *Boerb. II. b.*
 - - montanum, maximum; latifolium sylvaticum, caule rubente, 2. *Moris. f. 11. T. 30. p. 448. offic. Boerb. IV. b.*
 - - medium, Apulum, argenteum, campestre; Creticum, 6. *Moris. f. 1. T. 30; Garidell. Boerb. V. b.*
 - - Blefense, folio molli, grate viridi, flore coeruleo, vel rubente, striis rubris, quasi reticulato, 3. *Moris. p. 449. b.*
 - - Narbonense, *H. Eyst. Aest. O. 8. Fol. 6. f. 3; angustifolium, purpureum, Boerb. IX. b.*
 - - Orientale, Buglossi folio, femine umbilicato, cristato, *T. Cor. Comm. Rar. 31. b.*
 CYPERUS, rotundus, angustifolius, esculentus, *Boerb. II.*
 - - rotundus, inodorus, Germanicus, *C. B. Theatr. p. 215. Lob. ic. p. 40. Boerb. III.*
 CYTISO-GENISTA, Scoparia dicta, *offic. flore luteo, J. B. 1. 388. Boerb. P. II. 27.*
 CYTISUS, Alpinus, latifolius, flore racemoso; Anagyris non foetida; Laburnum trifoliatum, *J. B. 1. 361. Riv. Tetrap; Boerb. I.*
 - - Alpinus, angustifolius, flore racemoso, pendulo, longiori; Egelo *Dod. p. 773; Boerb. III.*

No. CYTISUS, montanus, glaber, nigricans, flore luteo, Riv. Tetrap. 1. Tabm. 1505. Boerb. VI.

D.

DAUCUS, maritimus, lucidus, T. Bocc. Rar. 74. Boerb. VII.

DENS CANIS, folio latiore, flore candido; Pseudo-hermodactylus, 4. Matth. p. 779; Boerb. I.

- - folio angustiore, 5. Matth. p. 779. Boerb. II.

DENS LEONIS; Taraxacum, Matth. p. 388. offic; Boerb. I.

- - angustiore folio, Boerb. II.

- - qui Hieracium, folio Hedypnoidis, 8. Clus. H. CXLII.

- - qui Pilosella maior, repens, hirsuta, 1. Moris. f. 7. Tab. 8. Boerb. VIII.

- - qui Pilosella maior, repens, minus hirsuta, 3. Moris. l. c.

DENTARIA, heptaphyllos, baccifera, bulbifera radice, Clus. H. CXXI. Boerb. P. II. 21.

DIGITALIS, flore rubro, offic. Riv. Monop. Boerb. I. b.

- - flore albo, Boerb. III. b.

- - flore albo, punctis internis, purpureis, maioribus. b.

- - flore ferrugineo, latifolia, 2. Moris. sect. 5. T. 8. Boerb. V. b.

- - flore luteo, magno, Boerb. VI. b.

- - flore luteo, minore, Riv. Monop. Boerb. VII. b.

- - minima; Gratiola, flore albo, Riv. Monop. Matth. p. 516; Boerb. XI.

- No. **DIPSACUS**, sylvestris, aut Virga pastoris maior, *Boerb. I. a. b.*
- - fatuus; Carduus fullonum; Labrum Veneris, 2. *Matth. p. 493; Boerb. II. b.*
 - - sylvestris, capitulo minore, 7. *B. 3. l. 25. Cap. 75; Virga pastoris, Matth. p. 493; Boerb. IV. b.*
- DORIA**; Solidago Saracenica; Virga aurea, quae maxima, 3. *Moris. f. 7. T. 23; Boerb. III. offic.*
- - quae Jacobaea palustris, 24. *Moris. f. 7. T. 19. p. 110. Boerb. XIV.*
- DORONICUM**, maximum, foliis caulem amplexantibus, 7. *Clus. H. XIX. Boerb. I.*
- - quod Arnica, *offic*; Caltha Alpina, *Tabm. p. 715; Doronicum, 6. Moris. f. 7. T. 24; 5. Clus. H. XVIII.*
 - - radice Scorpii, *C. B. P*; Aconitum Pardalianches, 4. *Matth. p. 763; Doronici varietas tertia, Lob. obs. 370.*
- DRACO** herba; Dracunculus esculentus, hortensis, *offic. Moris. f. 6. T. 1. Matth. p. 447; Boerb. P. I. 127.*
- DRACUNCULUS**, polyphyllus; Arum polyphyllon, caule maculato, *offic. 46. Moris. Boerb. I.*
- - polyphyllus, foliorum candidis notis, *Matth. p. 445.*

E.

- ECHINOPUS**; Carduus Sphaerocephalus, flore albo, 1. *Moris. T. 35. f. 7; Spina alba altera, Matth. p. 494; Boerb. I.*
- - folio Acanthi aculeati, tenuiter laciniato, flore albo; Carduus Sphaerocephalus

- No. phalus, acutus, *Dod. 5. 5. 4; Boerb. IV.*
 ECHIUM, Scorpioides, flore coeruleo maiore,
Riv. Monop. Boerb. I. a. b.
 ELAEAGNUS, angustifolius, fructu paruo, *T.*
Cor. p. 53; Oliua Bohemica, Matth.
p. 174.
 ELICHRYSUM, vel Staechas citrina, *offic; Chry-*
socome, Matth. p. 736; Boerb. IV.
 - - Americanum, latifolium; Gnaphalium,
H. Eyst. Aest. O. 5. Fol. 9. Fig. 1; Boerb. V.
 EMERUS; Colutea Scorpioides, elatior, *1. Clus.*
H. 97.
 - - Colutea scorpioides, humilior, *1. Clus.*
H. 97.
 EMPETRUM, fructu nigro; Erica Coris folio,
11. Clus. H. 45. Boerb. I.
 EPHEMERUM, Virginianum, flore coeruleo;
 Ephemerum phalangoides, *4. Moris.*
f. 15. T. 2. p. 606; Phalangium Virgi-
nianum, Munting. Aardg. F. 228. p.
814; Boerb. I.
 EPIMEDIUM, *Matth. 700. Boerb. P. I. 307.*
 EQUISETUM, palustre, brevioribus setis, *Zan-*
nich. H. Pl. Ven. F. 181. Boerb. II.
 - - pratense, *offic. 2. Matth. p. 725. Boerb. VI.*
 ERICA, flore rubro, *Matth. p. 141. Erica prima,*
Tabm. p. 1516.
 - - flore albo, *2. Tabm. 1517.*
 - - flore campanulato, purpurascence, qua-
 ternis ad cauliculos foliis; Erica, quae
 Tetralix, *Clusii 13. H. 46. Rupp. Fl.*
Jen. 31.
 - - Coris folio, flore arbuti, siue campanula-
 to, *Clus. 6. H. 43. Boerb. VI.*
 ERYNGIUM, campestre, vulgare, *offic. 1. Moris.*
T. 36. f. 7. Boerb. II.

- No. ERYNGIUM, montanum, latifolium, flore albo, *Boerb. IV.*
 - - montanum, amethystinum, 2. *Moris. f. 7. T. 35. Boerb. V.*
 EVONYMUS, *Matth. p. 170. Lobel. 199. Boerb. I.*
 EUPATORIUM, cannabinum, officin; Herba Cunigundae, flore roseo, *Matth. 2. p. 717. Boerb. I.*
 - - urticae folio, flore albo, *Boerb. II.*

F.

- F**AGUS, *Matth. p. 180. Boerb. P. II. 178.*
 FERRUM EQUINUM, comosum, flore luteo, *Garid. Boerb. III.*
 FERULA, durior, breuissimis foliis, *Bocc. Mus. 84. T. 76. Borell. ic. 78. Boerb. I.*
 - - tenuiore folio; Ferula, *Dodon. 2. 5. 27. Boerb. II*
 - - galbanifera, latiore folio; *Dodon. Ferulago, 2. 5. 27; Riv. Pentap. Boerb. IV.*
 - - Tingitana, folio lucido, *Par. Bat. Boerb. VI.*
 - - Tingitana, lucida, folio angusto, *Boerb. VII.*
 - - Orientalis, capillaceis, densissimis, rigidiusculis, Cachryos foliis; conuenire cum tabula videtur *Tourn. Voyage P. II. 154. Boerb. VIII.*
 - - Africana, galbanifera, Myrrhidis, veluti Oreoselini tenuiore folio, *H. A. 2. 115. Boerb. IX.*
 FICARIA, quae Chelidonium minus, offic. *Matth. p. 468. Boerb. I.*
 - - flore pleno, *Boerb. III.*
 FILIPENDULA, *Matth. p. 627. offic. Boerb. I.*
 FILIX,

- No. FILIX, ramosa, quae foemina *Tabm. p. 1181. offic.*
 - - non ramosa, mas, 1. *Matth. 886. offic.*
 - - trilobata, foemina, 2. *Matth. p. 886.*
 - - petraea; Dryopteris, *Matth. p. 888.*
 FOENICULUM, dulce, *officin. Riv. Pentap;* vul-
 gare Germanicum, *Boerb. I.*
 FRAGARIA, flore albo, *Matth. p. 721. offic.*
Boerb. I.
 - - sterilis, sylvestris; *f. B. non vesca, 2. 395;*
Boerb. II.
 FRANGULA, *Matth. p. 875. offic. Boerb. P. II.*
231.
 FRAXINELLA; Dictamnus albus *officin. flore*
rubente, Matth. p. 523; Riv. Pentap.
Boerb. I.
 - - flore pallente, folio angusto, minore; mi-
 nor, flore albo *Riv. Pentap;* Dicta-
 mnus albus, minor, Hispanicus, *Bar-
 rell. ic. 1318.*
 FRAXINUS, *Matth. p. 128. Boerb. I.*
 - - frugifera, foemina, floribus in linguam
 auis excrefcentibus, *offic. Boerb. II.*
 FRITILLARIAE species variae, *Boerb. P. II.*
140.
 FUMARIA, lutea; Pseudo-fumaria, *Riv. Tetrap;*
Boerb. VI.
 - - bulbosa radice, caua, maior, flore pur-
 pureo; Pseudo-fumaria, *Riv. Tetrap;*
 Aristolochia rotunda *officin. falso di-*
cta, Garid; Boerb. VIII.
 - - bulbosa radice, flore albo, *Boerb. IX.*
 - - radice non caua, flore purpureo, *Boerb.*
X.
 - - radice non caua, flore albo, *Boerb. XI.*

No.

G.

GALEGA, flore coeruleo, *Riv. Tetrap.*
Boerb. I.

- - flore albo, *Boerb. II.*

- - Africana, floribus coeruleis, maioribus,
siliquis crassioribus, *Boerb. III.*

GALEOPSIS, flore luteo, folio maculato; La-
mium *Riv; Boerb. V.*

GALLIUM, flore luteo, *offic. 1. Tabm. p. 432.*
Boerb. I.

- - montanum, altissimum, foliis angustis,
albicantibus, *Rupp. Fl. Jen. 3*; an Gal-
lium saxatile, glauco folio, *Bocc. Mus.*
Tab. 116? Boerb. II.

- - flore albo, *Boerb. V.*

GENISTA, tinctoria; Genistella non spinosa,
Riv. Tetrap; Boerb. I. P. II. 25.

- - Hispanica, *Riv. Tetrap. Boerb. I. P. II. p. 23.*

- - vulgaris, *officin. Riv. Tetrap.*

GENISTA SPARTIUM, maius, longioribus
aculeis; Scorpius *1. Clus; Boerb. II.*

- - Spartium, maius, tenuius, glabrum, *H.*
R. Par. T.

- - Spartium; Genistella spinosa, *Riv. Tetr;*
Boerb. V.

GENTIANA, maior, lutea, *offic. Matth. 1. p. 480.*
Boerb. I.

- - cruciata, *Matth. 3. p. 481. Boerb. III.*

- - Alpina, pumila, verna, *Tournef; Gen-*
tianella Helvetica, 14. Moris. f. 12. T.
5; Boerb. V.

- - palustris, autumnalis; Pneumonanthe
dicta, *4. Matth. p. 481; Boerb. VI.*

- - palustris, lato Plantaginis folio, flore
coeruleo, punctato; Alpina *11. Mo-*
ris. f. 12. T. 5. Matth. 2. p. 481. Boerb. VII.

GERA-

- No. GERANIUM, batrachioides, flore violaceo, 2.
Lobel. p. 376. Boerb. XXVII.
- - batrachioides, flore albo, *Boerb. XXVIII.*
 - - batrachioides, odoratum, flore roseo,
Boerb. XXX.
 - - batrachioides, folio Aconiti, *Boerb.*
XXXI.
 - - haematodes, supinum, radice reptante,
VII. Clus. Boerb. XXXII.
 - - phaeum, petalis planis, fuscum, pullo
flore, 18. *Moris. T. 16. f. 5. Matth. p. 623.*
Boerb. XXXVI.
 - - Robertianum, murale, graucolens, offic.
Tabm. p. 122. Boerb. LX.
- GEUM, folio rotundo, dentato; Umbilicus
Veneris; Sanicula montana, folio
rotundo, *Matth. p. 723*; Sedum flore
albo, guttato, 10. *Moris. f. 12. T. 8*; *Boerb.*
III.
- - folio rotundo, dentato, striis aureis in-
terstincto.
 - - folio subrotundo, minori, dentato, pi-
stillo floris rubro, *Hort. Reg. Monsp.*
p. 88. c. icon. Boerb. V.
- GLADIOLUS, flore purpureo, *Boerb. I.*
- - flore carneo, *Boerb. II.*
 - - flore rubro, maximus, Indicus, *Boerb. III.*
 - - floribus purpureis, uno versu dispositis,
Riv. Monop. Boerb. IV.
 - - flore albo, *Garid. Boerb. VI.*
- GLAUCIUM, flore luteo; Papauer cornicula-
tum, *Matth. p. 748*; *Boerb. I. b.*
- GLAUX, maritima, Myrti Tarentinae folio,
Bocc. Mus. T. 119. p. 168.
- GLOBULARIA; Scabiosa minor, *Tabm. 13. p.*
444; *J. B. 3. 12. a. b.*

No.	GLYZIRRHIZA, officin. Riv. Tetrap. Boerb. I.
- -	echinato capite; Pseudo-Glyzirrhiza, Riv. Tetrap; Boerb. II.
	GRAMEN, paniculatum, folio variegato, arundinaceum, Boerb. VI.
- -	caninum offic; triticeum repens, vulgati- tius, 8. Moris. f. 8. T. 1. p. 178; Boerb. I.
- -	spica longiore, spartum herba, mariti- ma, III. Clus. H. CCXXI; Secalinum Boerb. II.
- -	hordeaceum, vulgare, spontaneum, siue hordeum spurium, Boerb. VI.
- -	Typhoides, minus, 3. Moris. sect. 8. T. 4. Boerb. VI.
- -	molle, Typhoides, alopecuroidi acce- dens, folio lanuginoso, Boerb. V.
- -	miliaceum, panicula sparsa, sylvestre, 10. Moris. f. 8. T. 5. Boerb. IV.
- -	montanum, auenaceum, locustis rubris, C. B. Tb. p. 155. Boerb. IV.
- -	cyperoides maius, J. B. 2. 492. cap. 170.
- -	cyperoides minus, J. B. 2. 493. cap. 174.
- -	paniculatum, arundinaceum, acerosa gluma, 41. Moris. f. 8. T. 6. p. 203.
- -	aruenfe, panicula crispa, J. B. 2. 464. Boerb. VI.
- -	iunceum, capitulo squamato, nec spi- cato; Juncus, capsulis triangulari- bus, J. B. 2. 521. Boerb. I.
- -	anomalum, caule iunceo, panicula spar- sa, tomentosa, J. B. 2. 514; Linagro- stis, T; Boerb. P. II. 164.
- -	spicatum, singularis fabricae; Triglo- chim, vel Juncago Tourn; Boerb. I.
- -	spicatum, singularis fabricae, maius; Tri- glochim, capsulis rotundis, et bre- viori-

No. vioribus, *Zannich. H. Pl. Ven. F. 273.*
Boerb. II.

GRAMEN, iunceum, quod Juncus, Lithospermi
minore semine, *Magnol. Bot. Monspel.*
p. 145. c. icon.

GROSSULARIA, fatiua; Uua spina, *Matth. p.*
150; Boerb. II.

- - spinosa, fructu obscure purpurascence,
Boerb. III.

H.

HARMALA; Ruta sylvestris, flore albo, ma-
gno, *Matth. p. 542; Boerb. P. I. 261.*

HEDERA, arborea, officin. *Matth. p. 466. Boerb. I.*
- - minor, quae Helix, *Matth. p. 466. Boerb.*
II.

HEDYSARUM, triphyllum, Canadense, *Corn.*
p. 44. Boerb. I.

- - clypeatum, flore elegantissimo, rubro,
Riv. Monop. Boerb. III. b.

- - clypeatum, flore albido, *Boerb. IV. b.*

HELIANTHEMUM, *Cordi*; Cistus humilis, flo-
re luteo, *Lobel. obs. p. 551; Boerb. I.*

HELLEBORINE, latifolia, barba rubra, *Riv.*
Hexap. Tabm. et Boerb. I.

- - angustifolia, *Riv. Hexap. Tabm. et Boerb.*
III.

- - flore albo, 2. *Tabm. p. 1100; Damafonium*
Riv. Hexapet.

HELLEBOROIDES, *Boerb. P. I. 297; Aconi-*
tum hyemale, *Garidell; Lobel. obs.*
p. 385.

HELLEBORO-RANUNCULUS, flore globoso,
luteo; Trollius ranunculus 6. *Matth.*
p. 459. F. B. 3. 419; Boerb. P. I. 297.

HEL-

- No. HELLEBORUS, niger, foetidus; Helleborastrum magnum, *Tabm. p. 1098; Boerb. I.*
- - hortensis, maior, flore viridi; Elleborum nigrum, 3. *Matth. p. 844; Boerb. II.*
 - - hortensis, minor, flore viridi.
 - - flore albo, vel roseo; Elleborum nigrum, 2. *Matth. p. 844; Boerb. III. offic.*
- HEPATICA, flore coeruleo, *offic. Tabm. p. 911. Boerb. I.*
- - flore rubro, pleno, *Tabm. p. 912. Boerb. IV.*
 - - flore albo, simplici; Trinitas, *Matth. p. 610; Boerb. V.*
- HERMODACTYLUS, folio quadrangulo; Iris tuberosa, *Lob. obs. 51; Boerb. P. II. 125.*
- HERNIARIA, quae Polygonum 3. *Matth. p. 677; offic. Boerb. I.*
- HESPERIS, hortensis, flore purpureo, simplici, 1. *Moris. f. 3. T. 10; Viola matronalis, Lob. p. 175; Boerb. I. b.*
- - hortensis, flore purpureo, pleno, *Boerb. III. b.*
 - - hortensis, flore albo, pleno, *Boerb. IV. b.*
 - - quae Viola matronalis, flore albo, et purpureo, pleno, variegata, *Munting. Aardg. Fig. 286. Boerb. V. b.*
 - - montana, flore obsoleto, noctu olens, 1. *Clus. H. 296. Boerb. VI. a. b.*
 - - Allium redolens; Alliaria, *Matth. p. 613; Boerb. VII. a. b.*
 - - quae Draba, flore albo, *J. B. 2. 939; Boerb. VIII. b.*
 - - siliquis strictissimis, lutea; Draba 1. *Moris; siliquosa 2. Matth. p. 430; Boerb. IX. b.*

- No. **HIERACIUM**, *Alpinum*, latifolium, flore magno, *Morif. 53. T. 5. f. 7. Boerb. XVI.* sed maculis destituitur nostrum.
- - fruticosum, latifolium, 59. *Morif. f. 7. T. 5;* conuenit herba cum descriptione *Clus. CXL. Boerb. XXIV.*
 - - fruticosum, angustifolium, 66. *Morif. f. 7. T. 5; Boerb. XXVI.*
 - - murorum; Pilosella aliorum maior; Pulmonaria Gallorum, 2. *Tabm. p. 504; Boerb. XXX.*
 - - hortense, floribus atro-rubentibus; Pilosella flammea, maior Syriaca, 7. *Morif. T. 8. f. 7; Boerb. XXXI. b.*
 - - umbelliferum; Pilosella maior, erecta, 10. *Morif. f. 7. T. 8; Boerb. XXXIV.*
 - - magnum *Dalechamp. Boerb. XXXVI;* Hedychnois Monspefful. *J. B. 1036.*
 - - luteum, glabrum, seu minus hirsutum. *J. B. 2. 1024. b.*
- HIPPOCASTANUM**, *Matth. p. 183; Castanea equina; Boerb. I.*
- HIPPOMARATHRUM**, *Riv. Pentap. Boerb. P. II. 264.*
- HORMINUM**, spurium; Gallitrichum *Riv. Monop; Boerb. III.*
- - foliis alatis, hirsutis, caule, et caliculis rubris, *Boerb. IV.*
 - - verbenae laciniis, *Triumpf. obs. p. 66. flore coeruleo, Boerb. VIII.*
- HOTTONIA**; Myriophyllum aquaticum, *Lob. obs. 460. Boerb. P. I. 207.*
- HYACINTHI** variae species, *Boerb. P. II. III. 112.*
- HYACINTHUS**, **STELLATUS**, coeruleus, amoenus, *Boerb. VIII.*

HYA-

- No. HYACINTHUS, STELLATUS, purpureus; Ornithogalum purpureum, *T; Boerb. X.*
- - stellatus, Peruanus, *H. Eyst. Vern. O. 2. Fol. 9*; Ornithogalum, vel Hyacintho affinis; *Boerb. XI.*
- HYDROCOTYLE; Cotyledon aquaticus, acris septentrionalium, *Lebel. obs. 209; Boerb. I.*
- HYDROPHYLLON; Dentariae affinis; *Matth. p. 684. Dentaria; Boerb. P. I. 204.*
- HYPERICUM, vulgare, offic. 1. *Matth. p. 667. Boerb. I.*
- - elegantissimum, non ramosum, folio punctato in margine, *Boerb. IV.*
- - minimum, supinum, glabrum, 3. *Moris. f. 5. T. 6. Boerb. VII.*
- HYSSOPUS, flore coeruleo, offic. *Matth. p. 515. Riv. Monopet. Boerb. I.*
- - flore albo, *Matth. 515. Boerb. III.*
- - flore carneo, *Matth. p. 515. Boerb. IV.*

I.

- JACEA, capite spinoso, folio multifido, flore luteo, 6. *Tabm. p. 436. Boerb. V.*
- - laciniata, Sonchi folio, capite spinoso, flore purpureo, 1. *Moris. f. 7. T. 27. p. 142. Borell. ic. 235. Boerb. VII.*
- - spinosis capitulis, flore purpureo, tenuifolia, *J. B. 3. 33; Par. Bat. 189; Maritima laciniata, Bocc. Mus. T. 26. Boerb. XVI.*
- - flore purpureo, capitulis non spinosis; ceterum ut Jacea, *Par. Bat. p. 189.*
- - maritima, incana, folio integro, caule folioso,

- No. folioso, capite spinoso, flore purpureo, *Barell. ic. 236.*
- JACEA, nigra, pratensis, latifolia, *Tabm. p. 435. Boerb. XXII.*
- - purpurea, capite villoso, aspero; Cyanus, capite reticulato, *Bocc. Mus. T. 2; Boerb. XXIII.*
- - flore purpureo, montana, maior, folio laciniato, 3. *Tabm. p. 435.*
- JACOBAEA, Sicula, facie Chrysanthemi, *Bocc. Rar. T. 36. Boerb. XI.*
- IMPERATORIA, offic. Riv. Pentap. Garid. *Boerb. I.*
- IRIS, hortensis, latifolia, petalis pendulis, purpureo-violaceis, erectis, coeruleis, *Boerb. I.*
- - alba, Florentina, *Boerb. VI. offic.*
- - Sufiana, flore maximo, ex albo nigricante, *Boerb. VII.*
- - nostras, Germanica, odore Sambuci, *Boerb. X.*
- - aquatica, lutea; Pseudo-Acorus *Matth. p. 21; Boerb. XIII.*
- - pratensis, angustifolia, non foetida, altior, 13. *Moris; 3. Matth. p. 17. Boerbau. XVI.*
- - angustifolia, bicolor, flore obsoleto, *Boerb. XVII.*
- - graminis folio, humilior, *Boerb. XVIII.*
- - humilis; Chamaeiris, flore purpureo, *Moris. XV. T. 6. f. 4; Boerb. XXI. Confer. Iridum icones, Moris.*
- ISATIS, fatiua, domestica, *Matth. p. 471. Boerb. I. a. b.*
- JUNCUS, foliaceus, *J. B. 2. 521. Boerb. III.*
- JUNIPERUS, vulgaris, fruticosa, *Boerb. I.*
- - vulgaris, arbor, *Dod. p. 840. Boerb. II.*

No.

L.

LAMIUM, flore albo, non foetens, offic.
Boerb. V.

- - flore purpureo, non foetens, 1. *Moris. T. II. f. II*; *Galeopsis Riv. Monop*; *Boerhau. VI.*

LAPATHUM, Alpinum, folio subrotundo, 2.
Moris. Tab. 27. f. 5. Boerb. II.

- - hortense, folio oblongo, *Munting. Aardg. F. 199*; Hippo-Lapathum sylvestre, *Matth. p. 354*; *Patientia offic*; 4. *Moris. Boerb. III.*

- - aquaticum, folio cubitali; Lapathum palustre, 5. *Tabm. 824. Boerb. IV.*

- - hortense, folio magno, lato, subrotundo, *J. B. 2. p. 985*; Hippolapathum, quod Rhabarbarum Monachorum, *Dod*; Rhabarbarum fimbriatum, *Munting. Aardg. Fig. 200. Fol. 693*; *Boerb. V.*

- - folio acuto, plano, siue Oxy-Lapathum officin. *Boerb. VII.*

- - folio acuto, crispo, 3. *Tabm. p. 823. Boerb. VIII.*

- - minimum; Hydro-Lapathum, minus, offic. *Lobel. obs. p. 151. Boerb. IX.*

- - folio superiori acuto, rubente, officin; Sanguis Draconis herba, *J. B. 2. 988*; sanguineum *Munting. Aardg. T. 196. Boerb. XI.*

LAPPA, quae Bardana maior, officin; *Matth. Personata 1. p. 804*; *Boerb. I.*

- - quae Bardana maior, offic. capite tomentoso, *Boerb. II.*

LASERPITIUM, latifolium, 6. *Moris. Riv. Pentap*; Sefeli Aethiopicum, 1. *Matth. p. 550*; *Boerb. II.*

LASER-

- No. LASERPITIUM, minus, *Riv. Pentap*; Laserpitium Daucoides, Prutenicum, viscoso semine, *Breyn. Cent. I. Tab. 84.*
- - tenuifolium, *Riv. Pentap*; angustifolium, illi *Lobelii* simile, *J. B. 3. 2. 137.*
- LATHYRUS, Narbonensis, latifolius, *Riv. Tetrap. Boerb. I.*
- - maiori flore, ex roseo violaceo; syluaticus, *Riv. Tetrap*; *Boerb. III.*
- - aruensis, *Riv. Tetrap.* repens *C. B. P*; Terrae glandes *Dod*; *Boerb. VI.*
- - pratensis, flore luteo, *Riv. Tetrap. Boerb. VII.*
- LAVENDULA, latifolia, offic. *Riv. Monop. Boerb. II.*
- - angustifolia, offic. media *Riv. Monop. Boerb. III.*
- LEPIDIUM; Piperitis *Matth. p. 457*; *Boerb. I.*
- - glastifolium, *J. Moris. T. 21. f. 3*; Cochlearia glastifolia *T*; *Boerb. II. a. b.*
- LEUCANTHEMUM; Buphtalmus aliorum; Bellis maior, offic. *Matth. p. 653*; *Boerb. II.*
- - Tanaceti folio, semine umbilicato; Bellis Tanaceti folio, *Moris. 18. f. 6. T. 8*; *Boerb. X.*
- - syluaticum, Tanaceti folio, semine umbilicato, flore minore, *II. Clus. H. 338.*
- LEUCOIUM; Keiri officin. flore simplici, luteo, *Matth. p. 632*; et plures hortenses species, flore simplici, et pleno, *Boerb. P. II. 17. 18.*
- LIBANOTIS, *Riv. Pentap*; Apium petraeum, siue montanum, album, *J. B. 3. 105.*
- LIGUSTICUM, apii folio, vulgare; Leuisticum *Riv. Pentap. offic*; *Boerb. III.*
- LIGUSTRUM, *Matth. p. 153. Boerb. I.*

- No. LILAC, flore coeruleo; Syringa coerulea, vulgaris; Lilac *Matth. p. 854. Boerb. I.*
- - flore albo, *Boerb. II.*
 - - folio Ligustri, flore coeruleo; Lilac Persfarum, *Corn. H. Pl. p. 189. Boerb. IV.*
 - - laciniato folio; Syringa Persica, flore coeruleo, *Boerb. V.*
- LILIO-ASPHODELUS, luteus, *Boerb. I.*
- - puniceus, *Boerb. II.*
- LILIO-FRITILLARIA; Lilium Persicum, aut Sufianum, *Clus. H. 130; Boerb. P. II. 141.*
- LILIO-NARCISsus, luteus, autumnalis, minor; Narcissus serotinus, *Clus. H. 163; Boerb. IX.*
- LILIUM, album, *offic. Matth. p. 600. Boerb. I.*
- - album, flore pleno, *Boerb. IV.*
 - - purpureo - croceum; Hemerocallis, 1. *Matth. p. 630; Lilium bulbiferum, 19. Moris. Boerb. V.*
 - - floribus reflexis, pallide purpurascentibus, punctatis; Martagon vulgare, *Matth. p. 600; Boerb. X.*
 - - quod Martagon Constantinopolitanum, flore luteo; Hemerocallis, 2. *Matth. Boerb. XIV.*
 - - Byzantinum, miniatum, *Boerb. XVI.*
- LILIUM CONVALLIUM, flore albo, *offic. Matth. p. 631. Boerb. I.*
- - flore rubente, *Boerb. II.*
 - - flore pleno, variegato, *H. Pis. T. 40. Boerb. III.*
- LINARIA, latifolia, Dalmatica, luteo, magno flore, *Boerb. II.*
- - odorata, flore, ex coeruleo, purpureo, minore, *Riv. Monop; Dod. altera, 2. 1. 26. Boerb. III.*

LINA-



*Linum humile hyssope facie
flores parvos luteos*

Schubert del.

Krügner sc.

52
(25)
3

- No. LINARIA, vulgaris, flore maiore, Riv. Monop;
Osyris, Matth. 837. Boerb. VI. offic.
- - flore pallido, luteo, minore, rictu aureo,
Pannonica 1. Clus. H. 322.
 - - flore albo, 13. Moris. f. 5. T. 13. Boerb. XII.
 - - flore, ex coeruleo, et albo variegato, mi-
nore, an Boerb. XIII?
 - - flore paruo, fere toto coerulescente, cal-
cari breuiore, ceterum ut 22. Moris.
f. 5. Tab. 13.
- LINUM, perenne, coeruleum, capitulo mino-
re, Borell. ic. 1008. Boerb. VI.
- - maritimum, luteum; sylvestre, Dod. 4.
2. 25. Zannich. H. Pl. Ven. F. 78. Boerb.
VII.
 - - Africanum, humile, Hyssopi facie, flore
paruo, luteo, fugaci, ramum vid. Tab.
nostra XV. adhuc biennis esse vide-
tur, et ad Class. 1. referenda planta, nisi
perfecerit alio tempore, et singula
aestate semen.
- LINGUA CERVINA; Phyllitis, vel Scolopen-
drium officin. Matth. p. 606; Boerb. I.
- - angustifolia, lucida, folio serrato; Hemi-
onitis maior, crispa, Munting. Aardg.
F. 82; Boerb. II.
 - - multifido folio, T. p. 545. Tab. 320. Boerb. X.
 - - quae Phyllitis undulata, Munting. Aardg.
F. 81.
- LITHOSPERMUM, perenne, offic. flore albo,
2. Matth. p. 657. Boerb. I.
- - perenne, flore coeruleo, 4. Matth. p. 658.
Lobel. obs. p. 245. Boerb. II.
- LOTUS, tetragonolobus, flore luteo, Riv. Te-
trapet. Boerb. IV.

- No. LOTUS, flore maiore, luteo, aruensis, *Riv. Tetrap*; Trifolium corniculatum, 1. *Dod. 4. 4. 17.*
- LUNARIA, maior, filiqua rotundiore, flore albo, *Boerb. III. b.*
- - maior, filiqua rotundiore, flore purpureo; Leucoium lunatum, 3. *Morif. f. 3. T. 9*; etiam dicitur Bulbonach; *Boerb. IV. b.*
 - - Leucoii folio, filiqua oblonga, maiori, flore luteo, *Boerb. V.*
 - - Leucoii folio, filiqua oblonga, ex alis foliorum erumpente, flore luteo, *Boerb. X.*
- LUPULUS, mas, *Matth. offic. p. 839. Boerb. I.*
- - foemina, *Boerb. II.*
- LYCHNIS, coronaria, flore purpureo, *Matth. p. 599. Boerb. I. b.*
- - coronaria, flore albo, *Boerb. IV. b.*
 - - hirsuta, Chalcedonica, flore coccineo, maior, *Lobel. obs. p. 183. Boerb. IX.*
 - - hirsuta, Chalcedonica, flore incarnato, maior, *Boerb. X.*
 - - hirsuta, Chalcedonica, flore candido, maior, *Boerb. XI.*
 - - hirsuta, Chalcedonica, flore pleno, miniato, *Boerb. XII.*
 - - alba, multiplex, *Matth. p. 706*; Ocymoides, *J. B. 3. 343*; *Boerb. XVIII.*
 - - sylvestris, alba, simplex, *Matth. p. 706. Boerb. XIX.*
 - - sylvestris, purpurea, simplex; Ocymoides, *J. B. 3. 343*; *Boerb. XX.*
 - - purpurea, multiplex, aliorum Ocymastrum; *Boerb. XXI.*

- No. **LYCHNIS**, sylvestris, quae Been album, *offic. F. B. 3. 356. Boerb. XXVII.*
- - sylvestris, quae Been album, flore albo, pleno, *Boerb. XXIX.*
 - - Suecica, calyce rotundo, amplissimo, *Tabm. 9. p. 675. Boerb. XXXI.*
 - - sylvestris, quae Saponaria, *offic. Matth. p. 442; Boerb. XXXV.*
 - - quae Saponaria, flore pleno, *Boerb. XXXVI.*
 - - sylvestris, viscosa, rubra, angustifolia, 29. *Moris. f. 5. T. 21. Boerb. XL.*
 - - sylvestris, viscosa, rubra, flore pleno *Boerb. XLI.*
 - - folio inferiori Bellidis, hirsuta, flore carneo; an Noctiflora Dubrensis *Boerb. LV?*
- LYCOPodium** *offic.*; Muscus terrestris, *Matth. p. 65. Moris. 1.*
- - quod Muscus terrestris, Juniperi folio; Lycopodium *Rupp; Muscus, Moris. P. III. 624. Fig. 3. T. 5. f. 15.*
 - - Sabinae, vel Abietis folio, *Rupp. F. B. 3. 759; Boerb. Muscus LII.*
- LYCOPUS**, palustris, glaber; Pseudo-Marrubium, *Riv. Monop; Boerb. I.*
- LYSIMACHIA**, lutea, maior, quadrifolia, 1. *Matth. p. 675. minor, lutea, Moris. T. 10. f. 5; Boerb. I.*
- - bifolia, aut trifolia; Blattariae affinis, 14. *Moris. f. 12. T. 16; Boerb. II.*
 - - orientalis, foliis glaucis, flore purpureo, *H. Pis. T. 40. Boerb. IV. b.*
- M.

MAJORANA, perennis, *Riv. Monop.*

MALVA, folio rotundo, flore roseo; Crescendi,

- No. scendi, florendique modo cetero-
quin conuenit cum Sicula, *Boccon.*
Rar. 68.
- MALVAE ROSEAE, et perennis species, plu-
res, flore simplici, et pleno, *Boerb.*
P. I. p. 269.
- MALUS, hortensis, *Matth. p. 200*; et eius variae
species, *Boerb. P. II. 249.*
- - syluestris, *Tabm. 1420.*
- MANDRAGORA, fructu rotundo, mas, *J. B. 3.*
617. Boerb. II.
- MARRUBIUM, album, vulgare, *offic. Riv. Monop.*
Matth. p. 604. Boerb. I.
- - angustifolium, *H. Eyst. Aest. O. 6. Fol. 9. F.*
3. Boerb. IV.
- MATRICARIA, flore simplici, *offic. 1. Moris. f. 6.*
T. 10; Boerb. I.
- - disco nudo, *2. Moris. f. 6. T. 10. Boerb. IV.*
- - flore simplici, fistuloso, *Moris f. 6. T. 10.*
Boerb. V.
- - flore pleno, *Boerb. IX.*
- MEDICA, maior, falcata, flore purpuro-viola-
ceo; Foenum Burgundicum, *Lobel.*
obs. p. 498; Boerb. I.
- - eadem, foliis minoribus, flore ex viridi,
et violaceo variegato.
- - falcata, maior, flore luteo, *Riv. Tetrap.*
- MELILOTUS, fruticosa, lutea, *officin. Riv. Te-*
trap. Boerb. I. b.
- - fruticosa, candida, *Boerb. II. b.*
- MELISSA, vulgaris, *officin. Riv. Monop. Boerb. I.*
- - Romana, molliter hirsuta, et graeolens,
Boerb. III.
- - humilis, latifolia, maximo flore, purpu-
rascente; Melissophyllum, *Riv. Mo-*
nop; Boerb. V.

- No. MENIANTHES; Trifolium fibrinum, *officin.*; Trifolium maius, 2. *Tabm. p. 906*; Boerb. I.
- MENTHA, crispa, *officin.* Riv. Monop. Boerb. II.
- - crispa, folio, ex aureo, et viridi variegato, Boerb. IV.
 - - verticillata, latifolia, neque crispa, 1. *Dodon. 1. 4. 10. Riv. Monop.*
 - - folio angustiore, verticillata, Riv. Monop. 4. *Dodon. Boerb. VII.*
 - - aruensis, verticillata, hirsuta; Calamintha, 2. *Dodon. 1. 4. 12. Boerb. IX.*
 - - palustris, spicata, *offic. Riv. Monop.*; an verticillata Boerb. X?
- MENTHASTRUM, Anglicum, niueum, H. Eyst. O. 7. fol. 3. Fig. 1. Riv. Monop. Boerb. III.
- - Anglicum, foliis viridibus, Riv. Monop. syluestre, H. Eyst. Aest. O. 7. fol. 3. F. 2.
- MERCURIALIS, perennis; Cynocrambe, foemina, Matth. p. 891. Boerb. III.
- MESPILUS, Germanica, vulgaris, 2. Matth. pag. 210. Boerb. I.
- - folio laurino, maior, Boerb. II.
 - - Apii folio, sylvestris; Oxyacantha; Spina acuta, Matth. p. 149; Boerb. VI.
 - - spinosa; Oxyacantha, flore pleno, *Munting. Aardgew. Fig. 46; Boerb. VII.*
 - - folio subrotundo, fructu rubro; Chamaemespilus Gesneri; Cotoneaster, J. B; Boerb. XIII.
- MEUM, *offic. Riv. Pentap. Lobel. 494. Boerb. P. I. 49.*
- MILLEFOLIUM, flore purpurascence, Matth. p. 799. Boerb. I.
- - flore albo, *offic. Boerb. III.*
 - - nobile, odore Camphorae, flore albo, J. B. 3. 140. Boerb. V.

- No. MILLEFOLIUM, tomentosum, luteum; Stratiotes millefolia, flauo flore, *Clusii H. 330; Boerb. X.*
- - vulgare, maius, album, foliis eleganter variegatis, *Boerb. XV.*
- MOLLUGO, latifolia, montana, ramosa, *offic;* Hepatica stellata, *Tabm. 201; Matri-sylua; Boerb. I.*
- - montana, minima; Gallium, *Tabm. 433.*
- MOLY, latifolium, liliflorum, 1. *Moris. f. 4. T. 16. Boerb. I.*
- - purpureum, 3. *Moris. l. c.*
 - - latifolium, luteum, odore Allii, 5. *Moris. l. c.*
 - - angustifolium, umbellatum; Ornithogalum, umbellatum, album; Moly, 7. *Moris; Boerb. III.*
 - - moschatum; Allium moschatum, iuncifolium, 6. *Moris. f. 4. T. 14; Boerb. IV.*
- MORUS, fructu nigro, *offic. Matth. p. 230. Boerb. I.*
- - alba, *Matth. p. 230. Boerb. II.*
- MOSCHATELLINA; Ranunculus, 14. *Moris. T. 28. f. 4; Ranunculus minimus septentrionalium, flore muscoso, Lobel. Adv. p. 300; Boerb. P. II. 72.*
- MUSCARI, obsoletiore flore, odoratissimo; Bulbus vomitorius, *Matth. p. 452; Boerb. I. gen. 1.*
- - flauo flore; Tibcadi; *Boerb. III. gen. 1.*
 - - coeruleum, maius; Hyacinthus, arbuteo flore, coeruleo, 3. *Moris. f. 4. T. 11. Boerb. I. gen. 2.*
 - - aruense, iuncifolium, exalbidum; Hyacinthus, 6. *Moris. f. 4. T. 11; Boerb. III. gen. 2.*
 - - aruense, latifolium, purpurascens, co-
- mo-

- No. mofum; Hyacinthus, 1. *Morif. Boerb.*
 I. gen. 3.
 MUSCUS, terrestris, abietiformis, 9. *Morif. f. 15.*
 T. 5. p. 624.
 MYRRHIS, tuberosa, semine minore, striato,
 leui; bulbosa, *J. B. 3. 83; 8. Morif. f. 9.*
 T. 10; foetens, Riv. Pentap. Boerb. I. b.
 - - odorata, *Riv. Pentap. offic. Boerb. P. 1. 69.*
 - - trilobata, Canadensis, *Riv. Pentap. Boerb.*
 XII.
 - - Podagrariae folio, *Riv. Pentap. Boerb.*
 XIII.
 - - foliis Pastinacae, lacte virentibus; Dau-
 cus Siculus, *Zanon. p. 78. F. 30. Boerb.*
 XIV. b.
 MYOSOTIS, incana, repens, *Tournefort. p. 145;*
 Holosteum marinum vulgo dictum;
 Boerb. III.
 - - aruensis, subhirsuta, flore maiore, *T. 245;*
 Auricula muris, pulchro flore, albo,
 J. B. 3. 360; Holosteum Cariophyl-
 laeum, Tabern. ic. 543.
 MYRTILLUS, *officin. Matth. p. 196; Vaccinia ni-*
 gra, Dod. 6. 2. 7; Vitis Idaea Boerb. I.
 - - fructu rubro; *Vaccinia rubra, Dodon. 6.*
 2. 8. p. 758.
 - - fructu albo; *Vaccinium, Rupp. p. 39.*

N.

- NARCISSO-LEUCOIUM; Leucoium bul-
 bosum, triphyllum, 6. *Matth. p. 860;*
 Boerb. I.
 - - quod Leucoium bulbosum, vulgare, hexa-
 phyllum, 7. *Matth. p. 860; Boerb. III.*

- No. NARCISSO-LEUCOIUM, hexaphyllum, polyanthos, *Lobel. p. 64. J. B. 2. 592.*
- NARCISSUS, Illyricus, liliaceus; Constantinopolitanus, 3. *Matth. p. 859. H. Eyst. Vern. O. 3. F. 16. Boerb. XXIV.*
- NARCISSI diuersi, folio lato, flore, in fastigio caulis, uno plerumque, *Boerb. P. II. 121. 122.*
- - folio lato, fastigio caulis ferente plures flores, *Boerb. P. II. 122.*
 - - folio angusto Junci, *Boerb. P. II. 123.*
- NIDUS AVIS, *Riv. Hexap; Orchis abortiua, 18. Moris. f. 12. T. 16.*
- NUMMULARIA, repens, officin. flore luteo, *Matth. p. 716. Boerb. I.*
- NUX JUGLANS, offic. *Matth. p. 223. Boerb. I.*
- - fructu maximo, *Boerb. II.*
- NYMPHAEA, flore albo, offic. *Matth. p. 643; Leuconymphaea maior, Boerb. I.*
- - maior, offic. flore luteo, *Matth. p. 643. Boerb. I.*
 - - alba, minima, quae Morsus ranae, *Dodon. 4. 5. 3; Microleuconymphaea, Boerb. P. I. 282.*

O.

- OENANTHE, Chaerophylli foliis, Asphodeli radice, viroso succo, 2. *Moris. f. 9. T. 7. Boerb. I.*
- - maxima, folio Apii, caulibus atro-purpureis, flore albo, *Boerb. II.*
 - - Apii folio, caule firmiore, 3. *Moris. Boerb. III.*
 - - triflora, aquatica, caulibus fistulosis, 8. *Moris. l. c. Riv. Pentap.*

OENAN-

- No. OENANTHE, quae aliorum Bulbocastanum, folio leuiter inciso, Lusitanicum; Boerb. IX.
- OMPHALODES, latifolia; Borrago minima, 3. Moris. f. 11. T. 26; Boerb. I.
- ONAGRA, latifolia, Tournef; Lysimachia Virginiana, corniculata, lutea, Moris. 7. T. 11. f. 3. Borell. ic. 1232; Boerb. I. b.
- ONOBRYCHIS, maior, filiculis echinatis, cristatis, Riv. Tetrap. Boerb. I.
- - filiculis, aculeis maioribus donatis, Boerb. II.
- OPHIOGLOSSUM, Matth. p. 447. offic. Boerb. P. I. 27.
- OPHRIS, vel bifolium, Riv. Hexap; Pseudorchis, 1. Moris; Boerb. I.
- OPULUS, Ruellii; Sambucus aquatica, 3. Matth. p. 874; Boerb. I.
- - flore globofo; Sambucus aquatica, polyanthos, 4. Matth. p. 874; Boerb. II.
- ORCHIS, flore albo, punctato; militaris, minor, Riv. Hexap. Rupp. p. 293; Clus. H. 268.
- - militaris, globosa; Militaris prima, Riv. Hexap.
- - militaris, minima, Riv. Hexap.
- - vulgaris, flore purpureo, Riv. Hexap.
- - vulgaris, flore albo, barba albicante.
- - spica purpurea, foetida, Clus. H. 268.
- - quae petalis herbaceis, rubrisque punctis instruitur, et prae ceteris speciebus foetet; Testiculus, Lobel. obs. 88.
- - spiralis, Riv. Hexap; Confer. Orchidum flores apud Vaill. sigillatim Nu. 6. T. 30.
- OREOSELINUM, maius, Apii folio; Ceruaria, Riv.

No.

Riv. Pentap; Libanotis nigra, Theophrasti; Boerb. I.

OREOSELINUM, minus, Apii folio, *Riv. Pentap. Boerb. II.*

ORIGANUM, vulgare, maius, *offic. Riv. Monop. Boerb. IV.*

- - vulgare, minus, foliis, ex argenteo, variegatis, floribus pallidis, rubris, *Riv. Monop. Boerb. VI. offic.*

ORNITHOGALUM, Narbonense, spicatum, flore albo, 3. *Matth. p. 413. Boerb. II.*

- - Narbonense, spicatum, flore luteo.

- - umbellatum, medium, angustifolium, *Clus. H. 188. flore extus pallide viridi, Boerb. VI.*

- - minus, flore luteo; *Lobel. obs. p. 72. Boerb. VIII.*

- - exoticum, Neapolitanum, magno flore, minori innato, *J. B. 2. 631. Boerb. XI.*

OROBANCHE, *Matth. p. 409. Riv. Monop.*

- - ramosa, floribus purpurascens, 11. *Moris. f. 12. T. 16. officin; Squamaria Riv. Monop; Dentaria, H. Eyst. Vern. O. 1. Fol. 1. F. 1.*

- - spuria; Coralloriza *Rupp. Fl. Jen. p. 242; Orobanche 21. Moris. f. 12. T. 16.*

OROBUS, sylvaticus, flore purpureo, 10. *Moris. T. 7. f. 2. Riv. Tetrap. Boerb. I.*

- - Viciae folio, 6. *Moris. T. 6. f. 2. Riv. Tetrap. Boerb. II.*

OSMUNDA, racemosa; Lunaria botrydis racemosa, *Breyn. Cent. 1. p. 184. ad Cap. 95; Filicula 26. Moris. officin.*

- - lunato folio; Lunaria botrydis, *Garid; Boerb. II.*

Oti-

- No. OTITES, *Tabm. p. 1704*; *Lychnis muscosa, Moris. 5. f. 5. T. 20.*
 OXYCOCCUS; *Vaccinia palustris, Dodon. p. 758. J. B. 1. 525.*
 OXYS, flore albo, *Boerb. I.*
 - - flore luteo; *Trifolium acetosum, 2. Matth. p. 608*; *Alleluia offic; Boerb. II.*

P.

- PALMATA ORCHIS, flore albo, folio maculato, viridi; *Palmata, Riv. Hexap. Boerb. III.*
 - - flore diluto, purpureo, angusto folio, maculato, obscuro, *Riv. Hexap. Boerb. IV.*
 - - florum striis purpureis, folio latiore, maculato, *Boerb. V.*
 - - angustifolia, *Riv. Hexap.*
 - - Alpina, spica luteo-viridi, *Rupp. Fl. Jen. 242. J. B. 2. 776.*
 PAPAVER, hirsutissimum, Orientale, flore maximo, puniceo; *T. Voy. Tom. 2. 118. Commel. Rar. Boerb. XVII.*
 PARIETARIA, offic. 1. *Moris. f. 5. T. 30. p. 600*; *Helxine, Matth. p. 781. Boerb. I.*
 PARIS, offic. *Matth. p. 767. Garid. Boerb. P. II. 72.*
 PARNASSIA; *Gramen Parnassi, Lobel. p. 330*; *Hepaticus flos, Tabm. p. 527; Boerb. P. I. 243.*
 PASTINACA, sylvestris, offic. *Boerb. I. b.*
 - - sativa, offic. *Riv. Pentap. Boerb. II. b.*
 PENTAPHYLLOIDES, flore rubro, palustre; *Pentaphyllum, 12. Tabm; Matth. p. 720; Boerb. I.*
 - - rectum, fruticosum, flore luteo, *Eboracense,*

No.	<p>cenſe, <i>Raji, Boerb. IV; ramum vid. Tab. noſtra XVII.</i></p> <p>PENTAPHYLLOIDES, argenteum; <i>Potentilla, vel Anſerina, offic. Matth. p. 718. Boerbau. V.</i></p> <p>- - ſupinum, 3. <i>Moriſ. ſ. 2. T. 20. Boerb. VI.</i></p> <p>PERFOLIATA, montana, latifolia, <i>Boerb. III.</i></p> <p>PERSICA, viridis, et alba, <i>Boerb. I.</i></p> <p>- - flore pleno, <i>Boerb. II.</i></p> <p>PERSICARIA, vulgaris, non maculoſa, 1. <i>Matth. p. 440. officin. Boerb. I.</i></p> <p>- - maculoſa, <i>offic. Boerb. III.</i></p> <p>- - urens; <i>Hydropiper; Boerb. VI.</i></p> <p>PERVINCA, vulgaris, anguſtifolia, flore ſimplici, coeruleſcente, <i>offic. Boerb. III.</i></p> <p>- - vulgaris, anguſtifolia, flore albo, <i>J. B. 2. 132. Boerb. IV.</i></p> <p>- - vulgaris, anguſtifolia, flore pleno, rubro, coeruleſcente; <i>Daphnoides 2. Tabm. p. 1270. Boerb. VI.</i></p> <p>- - vulgaris, anguſtifolia, variegata ex argenteo, et viridi, <i>Boerb. VIII.</i></p> <p>PETASITES, maior, flore rubro, <i>offic. Boerb. I.</i></p> <p>- - maior, flore albo, <i>Boerb. II.</i></p> <p>- - minor, <i>Tuſſilaginis anguloſo folio, Matth. p. 615. Boerb. III.</i></p> <p>PEUCEDANUM, <i>Riv. Pentap. Matth. p. 579. offic. Boerb. III.</i></p> <p>PHALANGIUM, non ramoſum, 1. <i>Matth. p. 607. Boerb. I.</i></p> <p>- - ramoſum, maius, flore candido, 2. <i>Matth. p. 607. Boerb. II.</i></p> <p>PELLANDRIUM, <i>Riv. Pentap; Cicutaria, tenuifolia, C. B. P. Boerb. I.</i></p> <p>PHILADELPHUS; <i>Syringa 1. Tabm. p. 1457; Boerb. I.</i></p>
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Pentaphylloides rectum
frutescens.

- No. PHYTOLACCA, Americana, fructu maiore; Amaranthus baccifer, aut Solanum racemosum, magnum, Virginianum, flore albo, 22. *Moris. f. 13. T. 1; Boerb. I.*
- PIMPINELLA, spica breui, rubra; Pimpinella, siue Sanguisorba maior, *Matth. 729; 7. Moris. f. 8. T. 18. Boerb. II.*
- - Sanguisorba Italica, foliis glabris; Pimpinella odore cucumeris. Comparatur *lc. Lob. p. 412. Moris. 2. Boerb. III.*
 - - Sanguisorba Tingitana, folio eleganter laciniato, 4. *Moris. l. c. Boerb. IV.*
 - - Agrimonoides, odorata, *Bocc. Rar. 58. 9. Moris. l. c. Boerb. V l. b.*
- PINUS, sylvestris, *J. B. 1. L. 9. p. 253. Matth. 1. p. 97. Boerb. II.*
- - humilis, julo purpurascens; Pinaster, 3. *Austr. Clus; Boerb. III.*
- PISUM, marinum, perpetuum, *Munting. Aardg. F. 230. Boerb. XXII.*
- PLANTAGO, maior, latifolia, offic. *Matth. p. 375. Boerb. III.*
- - latifolia, media, *Boerb. IV.*
 - - lato, sanguineo folio, *Boerb. VI.*
 - - maior, angustifolia, offic. *Matth. p. 376. Boerb. IX.*
 - - folio crasso, gramineo, 27. *Moris. sect. 8. T. 16; Coronopus nostras maritima, J. B. 3. 511.*
- PLATANUS, Virginiensis, *Boerb. II.*
- POEONIA, mas, offic. *Matth. p. 655. Boerb. I.*
- - foemina, offic. *Dodon. 187. Boerb. II.*
 - - mas, flore albo, *H. Eyst. Aest. O. 6. F. 13. f. 1. Boerb. VI.*
 - - folio maxime laciniato, flore kermesino, simplici, *Boerb. VIII.*

- No. POEONIA, foemina, flore pleno, rubro, maiore, *Boerb. IX.*
- - flore pleno, coloris, ex rubro, et roseo variegati, *Boerb. X.*
 - - tenuifolia, caesia; flore pleno, ex petalis latioribus, et angustioribus permistis, rubro, *Boerb. XII.*
- POLEMONIUM, flore coeruleo; Valeriana Graeca, *Tabm. p. 460; Boerb. I.*
- - flore albo, *Boerb. II.*
- POLYGALA, frutescens, folio buxi, flore maximo, *H. Eyst. Vern. O. 6. Fol. 12. F. 3. Boerb. VI.*
- POLYGONATUM; Sigillum Salomonis latifolium, vulgare, *offic. Matth. p. 678. B. I.*
- - maximum, *Boerb. III.*
 - - flore pleno, *Boerb. IV.*
 - - angustifolium, non ramosum, 14. *Moris. f. 13. T. 4. Boerb. VII.*
- POLYPODIUM, *offic. 1. Matth. p. 887. Boerb. I.*
- - angustifolium, folio vario; Lonchitis, 2. *Matth. p. 661. f. B. 3. 737; Boerb. VI.*
- POPULAGO; Caltha palustris, *Munting. Aardg. F. 122; Tussilago, 4. Matth. p. 616; Boerb. I.*
- - flore pleno, *Boerb. II.*
- POPULUS, alba, *Matth. p. 129. Boerb. I.*
- - nigra, *Matth. p. 129. Boerb. III.*
 - - tremula, Lybica, *Matth. p. 130. Boerb. IV.*
- PORRUM, commune, capitatum, *offic. 1. Moris. f. 4. T. 15. Boerb. I.*
- POTAMOGETON, latifolium, *Matth. p. 796. Moris. 1. T. 29. f. 5. p. 586. Boerb. II.*
- - longo, ferrato folio, *Boerb. III.*
- PRIMULAE VERIS, Constantinopolitanae, diuersae species, *Boerb. P. I. 198. 199.*
- PRIMU-

- No. PRIMULA VERIS, umbellata, odorata, praten-
fis, flore luteo, *offic. Boerb. I. P. I. 199.*
- - umbellata, pallido flore, elatior, praten-
fis, 6. *Tabm. p. 700. Boerb. II.*
 - - geminato flore, aurantio, 3. *Tabm. p. 700.*
Boerb. III.
 - - Anglicana, flore luteo, pleno, *Matth. p.*
802. Boerb. IV.
 - - hortensis, umbellata, caule, et flore coc-
cineo, folioso, *Boerb. V.*
- PRUNUS, vel pruneolus, aut Acacia spuria *offi-*
cin; Prunus sylvestris Matth. p. 217;
Boerb. I.
- - hortensis, flore pleno.
 - - hortensis, flore simplici, et eius diuer-
sae species, *Boerb. P. I. 241.*
- PSEUDO-ACACIA, filiquis glabris, *Riv. Terrap.*
Boerb. II.
- PSYLLIUM, maius, supinum, angustifolium,
perenne, 1. *Moris. T. 17. f. 8. Matth. 2.*
p. 753. Boerb. II.
- PTARMICA, vulgar. *offic. Matth. p. 441; Boerb. I.*
- - flore pleno, *Boerb. II.*
- PULEGIUM, vulgare, *officin. Riv. Monop. Boerb. I.*
- - angustifolium, ceruinum, *offic. Riv. Mo-*
nop. Boerb. II.
- PULMONARIA, folio maculato, argenteo,
Munting. Aardg. Fig. 232; Symphy-
tum, 9. Moris. f. 11. T. 29; Boerb. II.
- - vulgaris, latifolia, folio maculato, et non
maculato, *offic. Clus. H. CLXIX.*
 - - folio longiore, non maculato, flore ele-
ganti, e rubente coeruleo, *Clus. H.*
CLXIX. Moris. 5. f. 11. T. 29. Boerb. IV.
- PULSATILLA, tenuiore folio, *Matth. p. 462.*
Boerb. I.

- No. **PULSATILLA**, Anemones folio, flore clauso, coeruleo, *Boerb. II.*
- - flore albo, 3. *Moris. f. 4. T. 26; 4. Tabm. p. 81. Lobel. p. 149.*
- PYROLA**, maior, *offic. Riv. Pentap. Boerb. I.*
- - minor, *Riv. Pentap. Boerb. II.*
 - - monanthemos, odore liliorum conual-
lium, flore singulari, *Riv. Pentap.*
 - - folio mucronato, *Riv. Pentap. Moris. 4. f. 12. T. 10.*
 - - Arbutifolia, *Riv. Pentap. Moris. 5. f. 12. T. 10.*
- PYRUS**, hortensis, *Matth. p. 208; et diuersae
eius species; Boerb. P. II. 247.*
- - sylvestris, *Tabm. 1425.*
 - - flore pleno.

Q.

- Q**UERCUS, *Matth. p. 179. Boerb. I.*
- Q**UINQUEFOLIUM, rectum, luteum, ma-
ius; Pentaphyllum 1. *Moris. f. 2. T. 19.
Boerb. I.*
- - maius, repens, flore luteo, *offic. Matth.
p. 719. Boerb. II.*
 - - rectum, caule rubro, hirsutius, *Boerb. III.*
 - - erectum, folio subtus argenteo, 3. *Matth.
p. 720; Boerb. VI.*
 - - minus, repens, vulgare, *Boerb. VII.*
 - - minus, repens, luteum, flore tetrapeta-
lo; Tormentilla *offic. Matth. p. 674;
Boerb. VIII.*
 - - flore albo, montanum, 2. *Matth. p. 719.
Boerb. IX.*

R.

- R**ANUNCULUS, pratensis, erectus, acris, 16.
Moris. Tab. 28. f. 4. Boerb. I.
- - pratensis, in folii medio notatus ma-
cula nigra, *Boerb. II.*

RANUN-

- No. RANUNCULUS, pratensis, erectus, dulcis, 17.
Morif. l. c. Boerb. III.
- - pratensis, repens, hirsutus, *Morif. 18. l. c. Boerb. VI.*
 - - hortensis, inclinans, flore pleno, *Boerb. VII.*
 - - magnus, valde hirsutus, flore luteo, *Boerbau. VIII.*
 - - montanus, Aconiti folio, albus, flore minore, 4. *Matth. l. c. Boerb. XI.*
 - - folio Aconiti, flore albo, multiplici, *Matth. l. c. Boerb. XII.*
 - - pratensis, radice verticilli modo rotunda; 5. *Matth. p. 459. Boerb. XIII.*
 - - bulbosus, flore pleno, *Boerb. XIV.*
 - - nemorosus, vel sylvaticus, folio subrotundo, 15. *Morif. T. 28. f. 4. Boerb. XIX.*
 - - rutae folio, flore pleno, *Boerb. XXIX;* similis praecocis 1. *Clus. foliis rutae, Hist. 232.*
 - - aquaticus, folio rotundo, et capillaceo, 31. *Morif. T. 29. f. 4. Boerb. LVII.*
 - - aquaticus, capillaceus, 32. *Morif. l. c. Boerbau. LVIII.*
 - - aquatilis, albus, fluitans, Peucedani folio, *Boerb. LIX.*
 - - longifolius, palustris, maior, *Boerbau. LXII.*
 - - longifolius, palustris minor, *Boerbau. LXIII.*
 - - hortensis, et eius diuersae species.
- RANUNCULUS, corniculatus, flore albo, *Tabm. 5. p. 794. Riv. Monop.*
- - corniculatus, flore coeruleo, spica longiore, *Dod. 2. 1. 9. p. 165; Morif. 46. T. 5. f. 5. p. 463.*

- No. RAPUNCULUS, corniculatus, capite globoso, coeruleo, *Riv. Monop*; capitatus, *Moris. 47. T. 5. f. 5*; Rapuntium, *Col. Rar. 224.*
- RHAMNUS, catharticus; Spina infectoria, 3. *Matth. p. 144; offic. Boerb. I.*
- RHUS, Virginianum, vel Sumach, *Munting. Aardg. p. 107. F. 18. offic; Boerb. II.*
- RESEDA, maxima *Plinii*, flore luteolo, *Label. p. 110; Boerb. I.*
- RIBES, bacca rubra, *offic. Matth. p. 151. Boerb. I.*
- - bacca alba, *offic. Boerb. III.*
- - minor, fructu rubro, *H. Eyst. O. Vern. Fol. 14; Boerb. V.*
- - bacca nigra, *Dodon. p. 737. Boerb. VI.*
- ROSA, lutea, simplex, *H. Eyst. Vern. Ord. 6. Fol. 5. Fig. 1. Boerb. I.*
- - lutea, multiplex, *H. Eyst. l. c. Fol. 2. Fig. 4. Boerb. IV.*
- - campestris, spinosissima, flore albo, odore, *H. Eyst. l. c. Fol. 5. F. 4. Boerb. VII.*
- - campestris, spinosissima, flore, ex albo, et suauerubente variegato, odore, *Boerhau. VIII.*
- - alba, flore pleno, *H. Eyst. l. c. Fol. 3. Fig. 1. Boerb. X.*
- - rubra, multiplex, *Boerb. XVIII.*
- - Prouincialis, flore incarnato, pleno, *H. Eyst. F. 2. F. 3. Boerb. XIX.*
- - rubicunda, Saccharina dicta, *H. Eyst. l. c. F. 4. F. 3. Boerb. XXI.*
- - flore, ex rubro, nigricante, pleno, *H. Eyst. l. c. F. 4. F. 1; Boerb. XXII.*
- - flore magno, pleno, ex atro rubente et pallide rubro variegato, ocysime marcescente, *Boerb. XXIII.*

ROSA,

- No. ROSA, Praenestina, variegata, plena, *H. Eyst. l. c. F. 2. Fig. 2. Boerb. XXIV.*
- - sylvestris, incarnato flore, *H. Eyst. l. c. F. 6. F. 1. Boerb. XXVI.*
 - - multiplex, media, centifolia, *Boerbau. XXVIII.*
 - - Prouincialis, flore pleno, atro-purpureo, holoserico, *Boerb. XXXIV.*
- RUBIA, tinctorum, fatiua, *offic. Matth. p. 659. Boerb. I.*
- - sylvestris, Monspessulana, maior, *Boerb. II.*
- RUBEOLA, sylvestris, quadrifolia, aspera; an *Boccon. Mus. T. 75?*
- - quadrifolia, laevis, flore albo; Rubia, 1. *Moris. f. 9. T. 21.*
- RUBUS, vulgaris, fructu nigro, *Matth. 714. Boerb. I.*
- - repens, fructu caesio, *Boerb. II.*
 - - Idaeus, fructu albo, *officin. Matth. p. 714. Boerb. III.*
 - - Idaeus, fructu rubro, *offic. Boerb. IV.*
 - - flore albo, pleno, *Boerb. VI.*
- RUTA, latifolia, *offic. Matth. p. 540. Boerb. I.*
- S.
- SABINA, folio Tamarisci, mas dicta, *offic. Lobel. obs. p. 625. Boerb. I.*
- - folio Cypressi, *offic. Matth. p. 120. Lobel. 625. Boerb. II.*
- SAGITTA, latifolia, maior; *Matth. p. 797. Boerbau. I.*
- - minor, angustifolia, *Tabm. 1121. Boerbau. III.*
- SALICARIA; *Lyfimachia* purpurea, spicata, 2. *Matth. p. 675; Boerb. I.*
- SALIX, alba, arborescens, *Lobel. obs. p. 567. offic. Boerb. I.*

- No. SALIX, lutea, fatiua, folio crenato, *Matth. p. 175. Boerb. IV.*
- - humilis, repens, *Matth. p. 175. Boerb. XVI.*
- SALVIA, vulgaris, latifolia, *officin. Riv. Monop. Boerb. I.*
- - maior, folio, ex luteo, et viridi variegato, *Munting. Aardg. F. 236. Boerb. IV.*
 - - latifolia, crispa, *Boerb. VI.*
 - - minor, aurita, et non aurita, *offic. Riv. Monop. Boerb. X.*
- SAMBUCUS, vulgaris, *offic. Matth. p. 873. Boerb. I.*
- - fructu albo, *Boerb. II.*
 - - racemosa, fructu rubro, *Lobel. Adv. 444. Boerb. III.*
 - - laciniato folio, 2. *Tabm. p. 1439. Boerb. IV.*
 - - humilis; Ebulus, *offic. Matth. p. 874; Boerb. V.*
- SANICULA, *offic. Riv. Pentap. Boerb. P. I. 73.*
- SATUREIA, montana, durior; Thymbra, *Dodon. 287; perennis, Riv. Monop. Boerb. II.*
- SATYRIUM, flore albo, odorato, *Riv. Hexap; offic. Orchis bifolia, Boerb. VIII.*
- SAXIFRAGA, alba, capsula bicorni, 4. *Matth. p. 694. Boerb. I.*
- - alba, flore pleno, *Boerb. II.*
 - - Sedi folio, angusto, ferrato; Sedum *Moris. 20. sect. 12. T. 9; Boerb. VIII.*
 - - foliis subrotundis, ferratis, *C. B. Prodr. 132. Boerb. IX.*
- SCABIOSA, Alpina, folio Centaurii maioris, flore luteolo, 10. *Moris. sect. 6. T. 13. Boerb. IV.*
- - pratensis, hirsuta, *officin. flore purpurascence, 1 Moris. Matth. p. 689. Boerb. V.*
 - - pratensis, hirsuta, flore albido.

- No. SCABIOSA, vulgari similis, folio viridi, flore
coerulescente; an *Boerb. VI?*
- - glabra, integro folio; Succisa *offic.* flore
coeruleo, *Matth. p. 464; Boerb. VIII.*
 - - folio latiore Succisae, valde humilis, flo-
re albo, *Barell. ic. 163.*
 - - flore cinereo, capitulo globoso, foliis in
tenuissimas lacinias diuisis, *H. Eyst. O.*
Aest. Fol. 9. F. 2. Boerb. XXVIII.
 - - flore ochroleuco, 23. *Moris. Boerb. XXXI.*
 - - perennis, Sicula, flore sulphureo, *Boerb.*
XLVIII.
- SCLAREA, maxima, vulgaris, flore coerule-
scente, *offic. Riv. Monop. Boerb. I.*
- - Aethiopica, lanuginosa, incana, lacinia-
to folio, flore albo, *Riv. Monop. Boer-
bau. VI.*
 - - Indica, floribus variegatis; Horminum,
16. *Moris. f. 11. T. 13; Boerb. X.*
 - - glutinosa, flore luteo, quae Colus Jouis,
Riv. Monop. Boerb. XV.
 - - pratensis, foliis ferratis, flore albo; Sal-
via agrestis, *H. Eyst. Vern. O. 9. Fol. 2.*
F. 3; Boerb. XIX.
 - - quae Horminum sylvestre, maius, flore
albo, foliis integris, *Barell. ic. 187.*
 - - pratensis, foliis ferratis, flore coeruleo;
Horminum, *Riv. Monop; Boerb. XX.*
 - - pratensis, flore suauerubente, *Boer-
bau. XXI.*
- SCORDIUM, *Riv. Monop. offic. Boerb. I.*
- - quod Salvia agrestis; Scorodonia, *Riv.*
Monop; Boerb. II.
- SCORZONERA, latifolia, sinuata, Hispanica,
offic. Matth. 4. p. 410. Boerb. I.

- No. SCORZONERA, latifolia, humilis, neruosa, Pannonica, *II. Clus. H. CXXXVIII.*
- - Germanica, folio Plantaginis, angusto, *Tabm. 6. p. 996.*
- SCROPHULARIA, nodosa, foetida, flore atropurpureo, punicante, folio obscuriore, *Matth. p. 791. Tabm. p. 930. offic. Boerb. III.*
- - radice fibrosa; Betonica aquatica, *Dodon. 1. 2. 31. Tabm. p. 934; Boerb. IV.*
 - - Melissæ, aut Scorodoniae folio, *Moris. App. sect. 5. T. 35. Boerb. VI.*
- SEDUM, maius, vulgare, *offic*; Semperuium, *1. Matth. p. 785. Boerb. VIII.*
- - minus, luteum, Tamarisci folio, *Matth. 3. p. 785. Boerb. XV.*
 - - teretifolium, esculentum; Semperuium 2, *Matth. p. 785; Sedum 24. Moris. Boerb. XVII.*
 - - paruum, acre; Semperuium vermiculatum, *offic. Matth. 4. p. 785. Boerb. XIX.*
 - - minus, vermiculare, nec acre, *Boerb. XX.*
- SERPILLUM, vulgare, maius, *Riv. Monop. offic. Boerb. I.*
- - vulgare, minus, *Boerb. II.*
 - - folio variegato, *Boerb. III.*
 - - odore Citri, *Riv. Monop. Boerb. VI.*
 - - longiori, et tenuiori folio, sylvestre; *Zygis Dioscorid. Clus. H. 358; Dodon. 2. 4. 8.*
- SERRATULA, foliis minus profunde sectis, *1. Tabm. 439.*
- - foliis profunde sectis, *3. Tabm. 439. Matth. p. 672. Boerb. I.*
- SIDERITIS, vulgaris, hirsuta, erecta, flore luteolo,






*Siler fl. luteo, folio
crasso Splendente*

- No. teolo, galeae inferiori limbo purpureo; *Riv. Monop. Boerb. II.*
- SILAUM; Sefeli pratenfe, *Riv. Pentap. Boerb. I.*
- - quod Angelica pratenfis, *Riv. Pentap; Boerb. IV.*
- - quod Ligusticum, Cicutae folio, *H. Pis. T. 39; Boerb. V.*
- SILER, quod Angelica montana, Aquilegiae folio, *T; Moris. Siler 3. f. 9. T. 3. Riv. Pentap. Boerb. I.*
- - Africanum, flore luteo, folio crasso, splendente; *ramum vid. Tab. nostra XVIII.*
- SISARUM, *Riv. Pentap. Boerb. P. I. 54.*
- SISYMBRIUM, aquaticum; Nasturtium humile, aquaticum, *offic. Matth. p. 379.*
- - Orientale, facie Barbareae, folio Plantaginis, *Boerb. III.*
- - Erucae folio, glabro; Barbarea maior; *Moris. Eruca 11. Sect. 3. T. 5; Nasturtium hyemale offic. Boerb. IV, a. b.*
- - Erucae folio, glabro, vel Barbarea minor; *Boerb. V. b.*
- - quod Rapistrum aquaticum, 2. *Tabm; Raphanus, 4. Moris. sect. 3. Tab. 7; Boerb. VII.*
- - repens, folio Nasturtii, flore luteo; Eruca, 17. *Moris. f. 6. T. 3; 2. Tabm. p. 836. Boerb. IX.*
- SIMUM, latifolium, maximum, *Riv. Pentap. J. B. 3. 175. Boerb. I.*
- - aquaticum, foliis multifidis, longis, serratis; Cicutaria, *Riv. Pentap; Boerb. II.*
- - minus, *Riv. Pentap. Boerb. III.*
- - aromaticum; Sison *Matth. p. 552; Amomum officin. et Suion dictum; Ammi, Laueris folio, Borell. ic. 1190; Boerb. VI. b.*

- No. SMILAX, laevis; Monophyllon, *Matth. p. 709.*
 feu Unifolium; *Boerb. II.*
- SMYRNIUM, *Matth. p. 566. Boerb. I.*
- - perfoliatum, Creticum, *Matth. l. c. Boerb. II. b.*
- SOLANUM, lignosum, scandens; Dulcamara;
 Vitis sylvestris, *Matth. p. 181; Boerb. I.*
- - tuberosum, esculentum; Arachidna
Matth. p. 758; Boerb. IX.
- SONCHUS, hieracites, asper, *Moris. 13. f. 7. T. 6.*
Boerb. II.
- - laevis, flore coeruleo, *Tabern. p. 500.*
- SORBUS, domestica, 1. *Matth. p. 215. Boerb. I.*
- - aucuparia, 2. *Matth. p. 215. Boerb. II.*
- SPARGANIUM, ramosum, *Matth. p. 702; Boerb. I.*
- SPHONDYLIIUM; Branca ursina, offic; *Riv. Pentap. Boerb. I.*
- - maius; Panax quorundam, et 3. *Moris. sect. 9. T. 17; an Panax Riv. Pentap? Boerb. IV.*
- SPIRAEA, *Theophrasti, Munting. Aardg. F. 48. p. 203. Boerb. I.*
- - Hypericonis folio, non crenato; Hypericum arborescens, *Munting. Aardg. F. 181. Boerb. III.*
- STACHYS, montana, lanuginosa, *Riv. Monop. Boerb. I. a. b.*
- - palustris, angustifolia, *Riv. Monop.*
- - foetida, latifolia, sylvestris, *Riv. Monop. 10. Moris. f. 11. T. 11; Galeopsis Boerb. I.*
- - *Dioscoridis; Scorodotis Plinii, flore luteo, Lob. Aduers. 228. Park. Th. 47.*
- - folio obscure virente, flore purpurascen-
 te; cum nigra conuenire videtur *Ba-
 rell. icon. 298; ramum vid. Tab. nostra XIX.*

*Stachys folio
obscura virenti
fl. roseo.*



- No. STAPHYLODENDRON; Pistacia, *Matth. p. 222; Boerb. I.*
- STATICE, latifolia, *Tourn*; Gramen polyanthemum, maius, *Dodon. 4. 4. 7. p. 554. Boerb. I.*
- - foliis angustioribus, flore rubente; Gramen polyanthemum, minus, *Dod. p. 554 Boerb. II.*
- - foliis angustioribus, flore magis albido. *Boerb. III.*
- STELLARIA aquatica, *Rupp. Fl. Jen. 43*; Foeniculum aquaticum, stellatum, *Tabern. ic. 187.*
- SYMPHYTUM, flore rubro, *offic. Matth. p. 683. Boerb. I.*
- - flore albo, *offic. Boerb. II.*
- T.
- TAMNUS; Bryonia nigra, flore minori, luteolo; Vitis nigra, *Matth. p. 883. Boerb. P. II. 62.*
- TANACETUM, vulgare, *officin. Dodon. p. 36. Boerb. II.*
- - folio crispo, *i. Moris. f. 6. T. 6. Dodon. p. 36. Boerb. III.*
- TAXUS, *Boerb. I.*
- - sylvestris, *Matth. p. 773.*
- TELEPHIOIDES, *T. Cor*; Telephium *VII. Clus. H. LXVII; Boerb. I.*
- THALICTRUM, Canadense, caule purpurascante, staminibus albis, *Corn. 186. B. I.*
- - Canadense, simile *Cornutiani p. 186.* florum staminibus saturatius purpurascantibus, *Boerb. III.*
- - maius, florum staminibus purpurascantibus; Thalictrum, flore incarnato, *H. Eyst. Vern. O. 1. Fol. II. F. 1; Ruta pratensis*

- No. tensis, maior, *IV. Tabern. ic. 120; Boerb. IV.*
- THALICTRUM, maius, filiqua angulosa, striata, Thalictum flore albo, *Hort. Eyst. l. c. Fig. 2. Boerb. VI.*
- - maius, flauum, staminibus luteis; glauco folio, 3. *Moris. f. 9. Tab. 20; Ruta pratensis maior, 1. Tabern. 120; B. VIII.*
- - pratense, angustifolium, 8. *Moris. f. 9. Tab. 20; Ruta pratensis maior, angustifolia, Tabern. 5. p. 121. Boerb. IX.*
- - minus, 12. *Moris. l. c. Ruta pratensis, minor, 6. Tabern. 121; Boerb. XI.*
- - minimum, foetidissimum, 13. *Moris. l. c. Boerb. XII.*
- - humile, foliis latioribus, spica laxiore; an 10. *Moris. P. 3. p. 325?*
- THAPSIA, Alpina, lucida, Thalictri, aut Carotae folio, flore albo, *Boccon. Mus. Tab. 77. Boerb. VII.*
- THLASPI, montanum, luteum, *J. B. 2. p. 929.*
- - aruense, perfoliatum, maius, *J. B. 2. 938. Boerb. XII. a. b.*
- THUYA; arbor vitae offic. *Matth. p. 123; Boerb. P. II. 180.*
- THYMELAEA, Germanica, Lauri folio, deciduo, flore purpureo; Laureola, *Matth. 842; Boerb. II.*
- - Lauri folio, flore albido, *Boerb. III.*
- THYMUS, offic. *Riv. Monop. Boerb. II.*
- THYSSELINUM, *Riv. Pentap;* aliorum Oelsnitium; *Boerb. II.*
- TILIA, foemina, offic. *Matth. p. 156. Boerb. I.*
- - mas, *Matth. p. 155, folio magno, oblongo.*
- TITHYMALUS; Cataputia offic; Esula latifolia, maior, *Riv. Tetrap. bienn; Boerb. I.*
- TITHY-

- No. TITHYMALUS, latifolius, an Characias I. *Clus. H. 188?*
- - palustris, fruticosus, *Zannich. H. Pl. Ven. F. 217; Esula maior, offic; Boerb. XIII.*
 - - helioscopius; *Esula Solifera, Riv. Tetrap.*
 - - Pini, vel potius Linariae folio, 27. *Moris. f. 10. T. 1.*
 - - cyparissias, repens, *Moris. 29. sect. 10. T. 2.*
- TOXICODENDRON, triphyllum, glabrum; *Vitis Munting. Aardg. F. 60; Edera, Corn. H. Pl. p. 97; Boerb. I.*
- - folio sinuato, magis glabro, ceteroquin simile praecedentis, *Boerb. II.*
- TRAGOPOGON, pratense, luteum, minus, *B. III. b.*
- - pratense, luteum, maius, *offic. Tabm. p. 994. Boerb. IV. b.*
 - - flore aureo, foliis gramineis, caule purpurascens, *Boerb. V. b.*
 - - purpuro-coeruleum, Porri folio; *Tabm. Barbula hirci p. 994; Boerb. VIII. b.*
- TRAGOSELINUM, maius, umbella candida, *Tourn; Pimpinella maior, Clus. H. CXCVII. Riv. Pentap; Saxifraga magna, Dodon; offic. Boerb. I.*
- - maius, coeruleum; *Elsholzii Pimpinella.*
 - - minus; *Pimpinella saxifraga, vulgaris Pimpinellae folio, minor, Riv. Pentap. offic. Moris. 6; Boerb. III.*
 - - quod *Pimpinella, minor, Clus. l. c; media Riv. Pentap; Boerb. IV.*
 - - vel *Saxifraga, Pannonica, Clus. H. CXCVI; Pimpinella, foliis tenuibus, nigra radice, Riv. Pentap. b.*
- TRICHOMANES, *offic. Matth. p. 833. Boerb. I.*
- TRIENTALIS; *Pyrola, Alfine flore, 6. Moris. f. 12. T. 10. conf. Rupp. Fl. Jen. p. 15.*

- No. TRIFOLIUM, montanum, spica longiore, rubente, *Boerb. III.*
- - pratense, purpureum, *offic. Boerb. VII.*
 - - album, *offic. Boerb. IX.*
- TULIPARUM, praecocium, et serotinarum, plures species, *Boerb. P. II. 238.*
- TURRITIS, foliis inferioribus, cichoraceis, hispidis; *Brassica sylvestris, 22. Moris. f. 3. T. 2; Bursa pastoris, foliis superioribus Perfoliatae, f. B. 2. 938. Boerb. I. b.*
- - vulgaris, glabra; quae convenit cumicone Sinapi albi, *Hist. Lugd. 1168. a. b.*
- TUSSILAGO, vulgaris, *offic. 1. Matth. p. 64. Boerb. I.*
- - rotundifolia, minor, montana, Alpina, 2. *Clus. H. p. 113. Boerb. II.*
- V.
- VALERIANA, hortensis, latifolia, *officin. maior, Riv. Monop. Boerb. I.*
- - angustifolia, *Riv. Monop; Phu vulgare, offic. Tabm. 455. Boerb. II.*
 - - palustris, minor; Phu minus, 4. *Tabm. p. 455; minor, Riv. Monop. Boerb. VI.*
 - - marina, flore purpureo, *Riv. Monop. Boerb. IX.*
 - - marina, flore albo, *Boerb. X.*
- VERATRUM, flore subviridi, *Boerb. I.*
- - vel Helleborus albus, *offic. Matth. p. 843. flore atro-rubente, Boerb. II.*
- VERBASCUM, magnum, latifolium, luteum, *offic. Dodon. 1. 5. 27. p. 143. Matth. 1. p. 800. Boerb. I. b.*
- - mas dictum, angustioribus foliis, floribus pallidis, *Boerb. IV. b.*
 - - Lychnitis, flore albo, paruo, *Boerb. V. b.*
 - - nigrum, crispo, et sinuato folio, flore luteo, *Zannich. H. Pl. Ven. F. 205. B. VI. b.*

VER-

- No. VERBASCUM, nigrum, staminibus, in luteo flore, purpureis, facie 3. *Matth. p. 800. B. VII.*
- VERBENA, Americana, altissima, Urticae foliis angustioribus, spicis brevioribus, floribus coeruleis, *Boerb. I.*
- - Americana, Urticae folio, floribus albidis, *Moris. 3. f. 11. T. 25. Zanon. Fig. 77. B. IV.*
 - - vulgaris, offic. *Riv. Monop;* Verbenaca, *Matth. 742; Boerb. VI.*
- VERONICA, maior, latifolia, erecta, *Moris. 2. f. 3. Tab. 22. Boerb. I.*
- - spicata, longifolia; spicata *Riv. Monop. Boerb. III.*
 - - montana, *Riv. Monop.*
 - - montana, angustifolia, minor, *Riv. l. c.*
 - - mas, supina, et vulgatissima; Veronica *Riv. l. c. Boerb. VI. offic.*
 - - maior, frutescens, altera; Veronica pratensis, latifolia, *Riv. l. c. Boerb. VII.*
 - - erecta, sylvestris, *Riv. Monop.*
 - - aquatica, maior, folio subrotundo; Beccabunga dicta, *Riv. Monop. Boerb. XIII.*
 - - aquatica, minor, folio subrotundo; Beccabunga minor, *Riv. l. c. Boerb. XIV.*
 - - aquatica, maior, folio oblongo, *Boerb. XV.*
- VIBURNUM, *Matth. p. 186. Boerb. I.*
- VICIA, perennis, acutiori folio; Vicia sepium, *Riv. Tetrap; Boerb. IV.*
- VIOLA, flore coeruleo, offic. *Riv. Pentap. Boerb. I.*
- - flore coeruleo, pleno, *Riv. Pent. Boerb. II.*
 - - flore coeruleo, medio, rubro.
 - - flore albo, *Riv. Pentap. Boerb. III.*
 - - Martia, inodora, sylvestris, *Riv. Pentap. Boerb. VII.*
 - - montana, lutea, grandiflora; *Riv. Pentap. Boerb. X.*

- No. VIOLA, palustris, angustis Persicae foliis, mucronatis, et serratis, *Rupp. Fl. Jen.* 233.
- VIRGA AUREA, latifolia, flore minore, 22. *Morif. f. 17. T. 23. Boerb. II.*
- - latifolia, flosculis minimis, 23. *Morif. f. 7. T. 23. Boerb. IV.*
- - angustifolia, panicula speciosa, Canadensis, flosculis minimis, 27. *Morif. f. 7. T. 23. Boerb. VI.*
- - angustifolia, minus ferrata, offic. 7. *Matth. p. 712. Boerb. X.*
- - Mexicana, Limonii folio, floribus uno versu saepe dispositis; panicula laxiore, et foliis minus perforatis, differt ab 17. *Morif. sect. 7. Tab. 13. Boerb. XI.*
- VITIS, vinifera, *Boerb. II.*
- - aepyrena; Vitis Corinthiaca; *Boerb. III.*
- - Apiana, laciniatis foliis, *Corn. H. Pl. Can. p. 182. Munting. Aardg. F. 59. Boerb. IV.*
- - quinquefolia, Canadensis, scandens; Edera, *Corn. 100; Boerb. XI.*
- ULMUS, *Matth. p. 135. Boerb. I.*
- ULMARIA, pratensis, offic. *Tabm. p. 1162. Boerb. I.*
- - floribus in longas spicas digestis; Barba caprae, *Tabm; Drymopogon; Morif. f. 9. T. 20. F. 2. Boerb. II.*
- URTICA, urens, maxima, offic. 2. *Matth. p. 789; B. II.*
- VULNERARIA, rustica; Anthyllis leguminosa, flore luteo, *Riv. Tetrap; Boerb. I. b.*
- - rustica, flore suauerubente; *Barell. ic. 553. Boerb. III. b.*
- X.
- XIPHII, vel Iridis bulbosae, species diuersae, *Boerb. P. II. 125.*
- XYRIS, *Lobel. obs. p. 37; Matth. p. 702; Spatula foetida, J. B. 2. 731.*

CLASSIS TERTIA
P L A N T A R U M
ANNUARUM.

No.

A.

A BUTILON, *Avicennae, H. Eyst. Aest. O. 6.*
F. 10. Matth. p. 662. Boerb. I.

- - annuum, *Indicum Camerarii, J. B. 2. 959.*
Boerb. II.

- - Americanum, reptans, flore giluo; ce-
terum simile habetur *H. E. p. 5. F. 4.*

A CETOSA, Americana, foliorum longissimis
pediculis; *Acetosa Vesicaria H. Eyst.*
Vern. O. F. 15. Munting. Aardgew. Fig.
78. Moris. 7. f. 5. T. 28. Boerb. VIII.

- - *Ocymi folio, Neapolitana, 14. Moris. f. 5.*
T. 28. Munting. Aardg. Fig. 78. Boer-
hau. XI.

A CINOS; *Clinopodium aruense, Ocymi facie;*
Riv. Monop. Boerb. I.

A CRIVIOLO, maxima, odorata, flore aurantio,
H. L. B. p. 629; Cardamindum, Riv.
Pentap; Boerb. I.

- - flore sulphureo, *Boerb. II.*

A DONIS, hortensis, flore minore, atro ruben-
te, *H. Eyst. Aest. O. 5. F. 11. f. 2. Boerb. I.*

- - sylvestris, flore phoeniceo, folio longio-
ri, *Boerb. IV.*

A GERATUM, laciniatis foliis, inodorum, Afri-
canum; *Elichrysum inodorum gla-*
brum, H. L. B. 227; Boerb. III.

H 2

ALCEA,

- | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. | <p>ALCEA, montana, flore rubello pallido <i>Col. 1. 147</i>; folio rotundo, <i>Boerb. VI.</i></p> <p>- - flore albo, moschato, maiori; ceteroquin fere similis vulgaris; sed humilior planta.</p> <p>ALKEKengi, Indicum, maius; Solanum Halicacabum Indicum <i>J. B. 3. 609</i>; Indicum glabrum Chenopodii folio, <i>H. Elth. T. 12. H. Eyst. Aest. O. 13. F. 11. Boerb. IV.</i></p> <p>- - Indicum, minimum, fructu virescente, <i>H. L. B. p. 571. Boerb. V.</i></p> <p>- - Indicum, glabrum, capsici folio, calyce, quinque striis ex nigro purpureis, in angulis notato, <i>H. E. T. 11.</i></p> <p>ALSINE, minor, multicaulis, <i>C. B. P.</i>; minima <i>Dod. p. 30. Boerb. IV.</i></p> <p>- - petalis quinque integris, equiseti folio; Spergula maior, <i>J. B. 3. 719. Arenaria aruensis, vulgator, Rupp; Boerb. V.</i></p> <p>- - tetrapetalos, minima, glabra, Alsinella, <i>Crameri; Park. Caryophyllus muscosus, Theatr. p. 1340.</i></p> <p>- - tetrapetalos, verna, glabra, <i>T.</i>; glauca <i>Vaill. T. 3. Fig. 2. Boerb. XIV.</i></p> <p>- - verna, glabra, floribus umbellatis, albis, petalis bis incisiss, <i>Tournef. p. 242</i>; Holosteum caryophyllaeum, <i>Tabm. 542.</i></p> <p>ALYSSUM, fruticosum, incanum; Thlaspi Mechlinense, <i>Lobel. obs. p. 108</i>; 7. Thlaspi <i>Moris. sect. 3. T. 16. Boerb. VI. a. b.</i></p> <p>- - vulgare, Polygoni folio, caule nudo; Bursa pastoris, loculo oblongo, <i>6. Moris. f. 3. T. 20; Boerb. IX.</i></p> <p>- - segetum, foliis auriculatis, acutis; Myagrum</p> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

No.

grum fatium, *Matth.* p. 815; *Sesamum offic.* sed spurium; *Myagrum* 2. *Moris.* f. 3. T. 21; *Boerb.* XIII.

ALYSSUM, fegetum, foliis auriculatis, fructu maiore; *Myagrum* 1. *Moris.* f. 3. T. 21; *Boerb.* XIV.

AMARANTHOIDES, *Lychnidis* folio, capitulis purpureis, *H. A. Part. I. F.* 45; *Amarantho* affinis, *Breyn. Cent.* 1. 110; *Tournef.* T. 429. *Boerb.* P. II. 99.

- - *Lychnidis* folio, capitulis argenteis, maioribus.

AMARANTHUS, maximus, spicatus, flore rubro, folio obscuriore, purpurascens maculis, semine nigro; *Blitum Indicum*, *Matth.* p. 357. *Tabm.* p. 817.

- - maximus, paniculis longis, nodosis, pro-pendentibus, rubris, semine rubello, similis maioris, *Dodon.* 5. 1. 4. *Boerb.* II.

- - sylvestris *Nouae Angliae*, totus viridis, spica densa; conuenit cum minoris *Barell.* ic. 680. *Boerb.* VII.

- - maximus, spica herbida, laxa, *Barell.* ic. 648.

- - Indicus, spinosus, spica herbacea, *H. L. B.* p. 33. *Boerb.* VIII.

- - Indicus, spinosus, spica, et caulibus subinde purpurascens, *Tournef.* p. 236.

- - cristatus, flore rubro, *Matth.* p. 737. *Boerb.* I. 2. gen.

- - cristatus, colore coccineo, *Barell.* ic. 508. *Boerb.* V.

- - cristatus, colore luteo, *Barell.* ic. 507. *Boerb.* VI.

- - spicatus, purpureus, *Lobel.* p. 126. *Matth.* p. 737. *Boerb.* VII. 2. gen.

- No. A M A R A N T H U S, spicatus, flavescent, *Barell. ic. 476. Boerb. XI.*
- - tricolor, *Lobel. p. 127. Boerb. XIX.*
 - - tricolor, folio variegato, obscuriore; *Boerb. XX.*
- A M B R O S I A, maritima, C. B. P. hortensis, fativa, *Lobel. p. 442. Barell. ic. 1144. Boerb. II.*
- A M M I, maius, offic; vulgare, *Dodon. p. 299; Ammioselinum latifolium, Riv. Pentap; Boerb. I.*
- - foliis plurimum incis, et non nihil crispis; varietas praecedentis; *Boerb. II.*
 - - foliis tenuioribus, quod Ammioselinum, *Riv. Pentap.*
- A M M O I D E S, maius, odore Origani; an Ammi perpusillum, *Lobel. obs. p. 414? Ammi, odore Cumini, Riv. Pentap; Boerb. I.*
- - quod Ammi pusillum, *Caesalp; Ammi videtur esse minus, Riv. Pentap; Boerhan. II.*
- A N A G A L L I S, flore phoeniceo, mas, officin. *Matth. p. 464. Boerb. II.*
- - flore coeruleo, foemina, *Matth. p. 464. Boerb. III.*
 - - Hispanica, latifolia, flore maiore, coeruleo, *T. p. 142.*
- A N C H U S A, angustifolia, procumbens, Lithospermi facie; Echioides, flore albo, *Riv. Monop; Lithospermum, 7. Moris; Boerb. IV.*
- A N D R O S A C E, vulgaris, latifolia, annua, *Matth. 2. p. 645. Clus. CXXXIV. Boerb. P. I. 201.*
- A N E T H U M, hortense, offic. *Riv. Pentap. Boerb. I.*
- A N G U R I A; Citrullus dicta; Semine nigricante, carne rubra, *Dod. p. 653. Boerb. P. II. 79.*

AN-

- No. ANGURIA, semine viridi, carne alba.
- - Americana, *Hort. Carolsr.* fructu eduli, echinato; Cucumis echinatus, *P. Bat. p. 134.*
- ANONIS, purpurea, spicata, alopecuroides, maior, *Matth. p. 501. Boerb. VI.*
- - viscosa, spinis carens, lutea, maior, odore hirci; Natrix, *Riv. Tetrap; Matth. p. 502. Moris. 9. f. 2. T. 17. Boerb. IX.*
 - - viscosa, spinis carens, lutea, minor, nec ita graueolens, *H. Eyst. Aest. O. 10. F. 1. Fig. 2. Boerb. X.*
 - - filiquis ornithopodii, *Boerb. XI.*
 - - Americana, folio latiore, subrotundo, flore luteo; Anil, quod Indigo Guadelopens; *Boerb. XV.*
 - - Asiatica, frutescens, floribus luteis, et amplis; Crotolaria Asiatica, *H. L. B. p. 197. Riv. Tetrap; Boerb. XVIII.*
 - - alopecuroides, mitis, annua, purpurascens, *H. E. p. 28. T. 24.*
 - - alopecuroides, pusilla, hirsuta; flore ex albo, et rubro colore mixto, 14. *Moris. P. II. p. 171; conuenit cum Barell. obs. 831. ic. 354.*
 - - maritima, folio lucido, ferrato, flore exiguo, luteo, *Bocc. Rar. p. 70.*
- ANTHYLLOIDES, *Plukn. Phyt. T. 12. Fig. 3.* petalis quinque, extus viridiusculis, intus albicantibus, integris.
- ANTIRRHINUM, minimum, flore rubente, rictu luteo, *J. B. 3. 465.*
- - aruense, angustifolium, flore rubro, folio Linariae, *Riv. Monop. Boerb. XIV.*
 - - minimum, flore albo, *Barell. ic. 656. Boerb. XV.*

- No. APARINE, aspera, vulgaris, 1. *Morif. f. 9. T. 22.*
flore albo, *Boerb. I.*
- - femine coriandri saccharati, *Vaill. Bot. Paris. T. 4. F. 3. Boerb. IV.*
- APHACA, *Lobel. obs. p. 518. Boerb. P. II. 45.*
- APIUM, quod Anisum, *offic. Riv. Pentap. Boerb. XVI.*
- APOCYNUM, Americanum; Canadensis, Cornutiani simili folio glabriore, flore umbellato, *Aurantio, Boerb. XVII.*
- ARGEMONE, Mexicana; Papaver spinosum, foliis lacteis, flore luteo, 5. *Morif. f. 3. T. 14. Borell. ic. 1141; Boerb. P. I. 280.*
- - capitulis spinosis, oblongis.
- ASPERUGO, vulgaris, T; Buglossum sylvestre, procumbens, 13. *Morif. f. 11. T. 26. p. 439; Garid. Boerb. P. I. 191.*
- ASPERULA, arvensis, flore coeruleo, 2. *Morif. f. 9. T. 22. Boerb. III.*
- ASTER, Chenopodii folio, flore purpureo, ingenti, specioso, *H. E. p. 38. T. 34.*
- ASTERISCUS, annuus, Lusitanicus, odoratus; Chrysanthemum Conyzoides, *Breyn. Cent. 1. cap. 77. p. 158; Zanon. p. 30. F. 11. Boerb. VIII.*
- ASTRAGALUS, luteus, Monspeliacus, procumbens; siliqua curua, *Riv. Tetrap; Boerb. IV. gen. 1.*
- - annuus, angustifolius, flosculis subcoeruleis; stellatus, *Riv. Tetrap; Garid. Boerb. VIII.*
- - Canadensis, flore viridi, flauescente, fructu triangulari, *Riv. Tetrap. Munting. Aardg. F. 110. Boerb. IX.*
- - supinus, siliquis villosis, glomeratis, Hispanicus, siliqua epiglottidis, flore pur-

No.

purpurascente maiore, *H. L. B. p. 75.*
Boerb. IV. gen. 2.

ASTRAGALUS, pumilus, filiqua epiglottidis
 forma, flore albo, *H. L. B. 77*; Glaux
 minima, *Riv. Tetrap*; *Boerb. V. gen. 2.*

ATRIPLEX, hortensis, alba, *offic. 12. Moris. f. 5.*
T. 32. Boerb. I.

- - hortensis, rubra, *Boerb. II.*
- - sylvestris, folio deltoide, triangulari, si-
 nuato, *14. Moris. f. 5. T. 32. Boerb. IV.*
- - angusto, oblongo folio; maiori, et mino-
 ri specie, *Moris. 15. et 20. f. 5. Tab. 32.*
Boerb. V.

- - maritima, folio laciniato, *Moris. f. 5. T. 32.*
F. 17. Boerb. VII.

- - maritima, Indica; folio minus laciniato
 differt ab praecedente.

- - Indica, incana, maioranae folio; *H. Ca-*
rolsr; admodum forma convenit cum
 Atriplice, *H. E. Fig. 46. p. 47.*

AVENA, vulgaris, alba, *offic. Boerb. I.*

- - sylvestris, pilosa, aristis recurvis; Festu-
 ca, *Barell. ic. 75. F. 2. Boerb. V.*

B.

BALSAMINE, lutea; Noli me tangere; *Barell.*
ic. 1197; Impatiens, *Riv. Tetrap*; *Boer-*
hau. I.

- - foemina, flore diluto, rubro, *Riv. Tetrap.*
Boerb. II.

- - foemina, flore candido, simplici, *Boer-*
hau. III.

- - foemina, flore candido, pleno, *Boerb. V.*

- - foemina, flore, partim candido; partim
 rubro, *Boerb. VII.*

- No. BALSAMINE, foemina, flore carneo, simplici, *Boerbau. VIII.*
- - foemina, flore variegato, pleno, *Boerb. IX.*
 - - foemina, flore maiore, rubro, specioso, pleno, *Boerb. XVI.*
- BASELLA, *Hort. Malab. P. 7. 24. Boerb. P. II. 266.*
- BETA, alba, 2. *Moris. f. 5. T. 30. Lobel. obs. p. 124. Boerb. I.*
- - rubra, radice Rapae, 6. *Moris. f. 5. T. 30. Lobel. p. 124. Boerb. IV. utraque officin.*
- BETONICA, Siberiensis, folio laciniato, odorato; *vid. Tab. nostra XX.*
- - maxima, folio Scrophulariae, floribus incarnatis, *P. B. p. 106; Sideritis Canadensis altissima, Tournef; Boerb. VII.*
- BIDENS, vulgaris, foliis tripartito diuisis, *Boerbau. I.*
- - folio non dissecto; Verbesina; Chrysanthemum, 22. *Moris; Boerb. II.*
 - - Canadensis, latifolia, flore luteo, semine latiore, *H. E. p. 51. Boerb. III.*
 - - Americana, Apii folio; Chrysanthemum, *Herm. P. B. p. 123; Boerb. IV.*
 - - Americana, latifolia, semine angusto, *H. E. p. 51.*
- BLATTARIA, folio multifido, flore luteo, *Bocc. Rar. p. 61; sed nostra quoque est folio viridi, sicut Boerb. VII.*
- BLITUM, maius, album, *offic. 2. Moris. f. 5. T. 30. Dod. 5. 1. 4. Boerb. I.*
- - rubrum, maius, *J. B. 2. 966. Boerb. II.*
 - - minus, album, *Dod. 5. 1. 4. Boerb. III.*
 - - quod Amaranthus Graecus, sylvestris, angustifolius, *Boerb. V.*
 - - Amaranthi minoris, peregrini nomine missum, flore albo, fructu rubro.

Betonica
flor.

Siberiensis
Coeruleo

Tab. XX.



Schubert del.

Krügner sc.

- No. BORRAGO, flore coeruleo, offic. *Matth. p. 825. Boerb. I.*
 - - flore albo, *Boerb. II.*
 BRASSICA, capitata, alba, 1. *Moris. offic. Boerb. I.*
 - - capitata, rubra, 2. *Moris. offic. Boerb. VII.*
 - - gongylodes, *Tabm. p. 789. caule rapum gerens, Boerb. VIII.*
 - - cauliflora; florida, 10. *Moris. f. 3. T. 1. Boerb. X.*
 - - fimbriata, *Tabm. 12. p. 786. Boerb. XI.*
 - - crispa, alba, Neapolitana, Brocoli dicta, *Menzel. Ind. multilingu; similis Brassicae, 15. Tabm; ann. et bienn. sicut praecedentes species.*
 - - campestris, perfoliata, flore albo, 19. *Moris. f. 3. T. 2. p. 210.*
 BUGLOSSUM, Creticum, sylvestre, flore azureo; Buglossoides, flore minus aperto, folio verrucoso; 8. *Moris. f. 11. T. 26. Boerb. IV.*
 - - Creticum, variegatum, flore ex albo, et rubro vario, folio, verrucis albis obfito, 10. *Moris. f. 11. T. 26; Borrigo, Zan. p. 46. F. 18; Buglossoides Cretica, Riv. Monop; Boerb. V.*
 BUPHTHALMUM, Creticum, Cotulae facie, flore albo, *Breyn. Cent. 1. p. 154; Chamaemelon, 13. Moris. f. 6. T. 9. Fig. 12.*
 BUPLEURUM, angustissimo folio, *Col. Rar. 247. Boerb. II.*
 BURSA PASTORIS, maior, folio non sinuato, offic. 1. *Moris. f. 3. T. 20. Boerb. I.*
 - - maior, folio sinuato, 2. *Moris. Boerb. II.*
 C.
 CALTHA, seu Calendula, flore simplici, Citrino, offic. *H. Eyst. Aest. O. 5. F. 4. Boerb. I.*
 CAL-

- No. CALTHA, vulgaris, medio ruffo, *H. Eyst. Aest. O. 5. F. 3. Boerb. III.*
- - polyanthos, maior, flore luteo, pleno, *Tabm. 2. et 3. p. 711. Boerb. V.*
 - - aruensis, minor, semine echinato, 6. *Moris. f. 6. T. 4. Boerb. VI.*
 - - Africana, flore intus albo, extus violaceo; Calendula Africana, humilis, *H. L. B. p. 105; Boerb. X.*
 - - Africana, flore intus albo, extus leuiter violaceo, semine plano, cordato, pediculis pene aphyllis, *H. A. P. II. F. 33. Boerb. XI.*
- CAMPANULA, aruensis, erecta, flore violaceo, 21. *Moris. f. 5. T. 2; Speculum Veneris; Boerb. XII.*
- - aruensis, erecta, flore albo, *Boerb. XIII.*
 - - pentagonia, perfoliata, 23. *Moris. Barell. ic. 1133. Boerb. XV.*
- CANNABINA, flore purpurascens; Cannabis spuria *Riv. Monop; Boerb. I.*
- - flore magno, luteo, labiis purpureis; Cannabis spuria, flore maiore, *Riv. Monop. Barell. ic. 1158; Boerb. III.*
- CANNABIS, non florens; sed semen ferens, fatiua, offic; mas dicitur *Hoffm; 1. Moris. f. 11. T. 25. Boerb. I.*
- - sterilis, 2. *Moris. f. 11. T. 25. Matth. p. 664. Boerb. II.*
- CAPSICUM, filiqua longa, propendente, purpurea, offic; Piper Indicum, *Matth. p. 434. H. Eyst. Aut. O. 1. F. 7; Boerb. I.*
- - filiqua longa, flauescente, *H. Eyst. Aut. O. 1. F. 9. Boerb. V.*
 - - filiqua latiore, rotundiore, purpurea, maiore

No.

iore; *H. Eyst. Aut. O. 1. F. 10; f. 1. Boerb. VIII.*CAPSICUM, filiqua rotundiore, minore, purpurea; *H. Eyst. l. c. F. 10. f. 2.*- - filiqua surrecta, oblonga, rubra, *H. Eyst. Aut. O. 1. F. 11. f. 1.*- - filiqua propendente, aurea, conica, maiore, *Boerb. X.*- - filiqua propendente, aurea, conica, minore; Fructuum diuersas species vide *Clus. Cur. post. p. 97. sqq. Moris. f. 13. T. 2. Hort. Eyst. O. Aut.*CARDAMINE, pratensis, magno flore, purpurascens; *Iberis Fuchsi; Nasturtium 7. Moris; Boerb. I.*- - flore albo, exiguo; *Eruca palustris minor, Tabm. 2; Boerb. V.*CARDUUS, spinosissimus, angustifolius, vulgaris, flore purpureo; sylvestris 3. *Dod. 5. 5. 21. p. 728. Boerb. II. a. b.*- - spinosissimus, angustifolius, vulgaris, flore albo, *Boerb. III. a. b.*- - lanceatus, latifolius, flore purpureo, 9. *Park. p. 982. Tabm. p. 1078. Moris. 7. f. 7. T. 31. Boerb. V. a. b.*- - albis maculis notatus, vulgaris; *Mariae offic. Tabern. 1078. Boerb. X. a. b.*- - Syriacus, albis maculis notatus, flore purpureo, *J. B. 3. 53. Boerb. XII. a. b.*- - exoticus, albis maculis notatus, flore albo, *Boerb. XIII. a. b.*- - nutans, capite magno, odore, nutante, 6. *Moris. f. 7. T. 31. J. B. 3. 56. Boerb. XVI. a. b.*

- - tomentosus, Acanthi folio, vulgaris; Acan-

No.

Acanthium 2: *Tabm. p. 1064; Moris. l. f. 7. T. 30. Boerb. XVII. a. b.*

CARDUUS, Creticus, Acanthi folio, viridi, flore purpurascens, *Boerb. XXII. a. b.*

- - canescens, aculeis flauescentibus munitus; Chamaeleon Salmanticense *Tabm. p. 1078. Clus. H. CLV; Boerb. XXV.*

- - spinosissimus, caule glabro, moschatus; capite minore, segetibus frequens, *16. Moris. f. 7. T. 32. auenarius, muscatus, Park. Th. 959. a. b.*

- - palustris, caulium alis, foliisque atro-viridibus, spinis mollioribus, plurimis, *12. Moris. p. 153; Polyacantha Theophrasti, Lobel. p. 479; Boerb. XXXIII. a. b.*

CARLINA, sylvestris, *Garidell. Tabm. 1077.*

- - sylvestris, quae Heracantha, *Tabm. 1076. a. b.*

- - flore rubente, patulo, *Moris. H. 3. 162. Garidell. Boerb. VI.*

CARTHAMUS, flore croceo offic; Cnicus, *Matth. p. 888; Boerb. I.*

CARUI; Carum offic. *Riv. Pentap; Boerb. I. a. b.*

- - femine maiore, Hispanicum, *Boerb. II. a. b.*

CASSIA, hexaphylla, minus foetida, foliis Sen-nae Occidentalis, subtus incanis, *H. E. p. 73. T. 63.*

CATANANCE, latifolia, flore luteo; Chondrilla, *Barell. ic. 1135. Bocc. Mus. T. 7; Boerb. II.*

- - angustifolia, flore luteo; Stoebe, Plantaginis folio, *Pr. Alpin. Exot. p. 286; Boerb. III.*

CAU-

- No. CAUCALIS, aruensis, echinata, magno flore;
Echinophora, flore magno, *Riv. Pentap. Boerb. I.*
- - maior, Daucoides, Tingitana, 4. *Moris. f. 9. T. 14*; Echinophora Tingitana, *Riv. Pentap; Boerb. II.*
 - - Monspeliaca, echinata; Echinophora, femine magno, *Riv. Pentap. Boerb. III.*
 - - prima, *Riv. Pentap*; Anthriscus quorundam, *J. B. 3. 83; Boerb. VI.*
 - - aruensis, paruo flore; Echinophora prima, *Riv. Pentap; 6. Moris. f. 9. T. 14.*
 - - Mauritanica, vulgaris similis; sed femine maiore.
 - - Africana, folio minori Rutae, *Boerb. X. cum icone.*
 - - sylvestris, folio Chaerophylli, *Riv. Pentap; Myrrhis sylvestris, Col. 1. 112; Cerefolium sylvestre, Tabm. 284; Boerb. XI.*
 - - nodosa, echinato femine, 10. *Moris*; ad alas florens, *Riv. Pentap. Boerb. XII.*
 - - maritima, humillima; Lappula Canaria, vel Caulalis maritima, *J. B. 3. 2. 81; 7. Moris. f. 9. T. 14.*
- CENTAURIUM, minus, rubrum, *offic. Matth. p. 488. Boerb. I.*
- - minus, flore albo, *H. Eyst. Vern. O. 5. F. 8. Boerb. II.*
 - - minimum, ramosum, purpureo flore, *Rupp. Fl. Jen. p. 17; 6. Moris. 2. 566.*
 - - luteum, perfoliatum, *Clus. H. CLXXX. Matth. p. 489. Barell. ic. 515. Boerb. IV.*
- CEREFOLIUM, *offic. Riv. Pentap. Boerb. I.*
- - sylvestre, Cicutae folio, *Riv. Pentap. Boerb. II.*

- No. CERINTHE, quorundam maior, versicolore
flore, ex flauo, purpuro-violaceo, 1.
Moris. f. 11. T. 29. Boerb. I.
- - quorundam maior, flore ex rubro purpu-
rascente, 3. *Moris. sect. 11. T. 29. Boerb. II.*
 - - asperior, flauo flore, 2. *Moris. Boerb. III.*
 - - minor flore flauo, clauso, 5. *Moris. Clus.
H. CLXVIII. Boerb. IV. a. b.*
- CHAMAEDRYs, foliis laciniatis, 2. *Matth. p. 597.
Lobel. obs. 209; Iva moschata Riv. Mo-
nop; Boerb. III.*
- CHAMAEMELUM, vulgare, offic. Anthemis,
Matth. p. 649; 1. Moris. f. 6. T. 12. Boerb. I.
- - vulgare, tenuifolium, inodorum; Cotula
non foetida, *J. B. 3. 120; 8. Moris.
Boerb. VI.*
 - - foetidum; Cotula offic. *J. B. 3. 121; 3. Matth.
p. 649. 10. Moris. sect. 6. T. 11. Boerb. VII.*
 - - marinum, *J. B. 3. 122. Borell. ic. 521. Boerb.
VIII.*
 - - Africanum, nudum, humifusum; cete-
roquin capite, et foliis Pyrethri, ra-
dice eiusdem saporis.
 - - Aethiopicum, lanuginosum, *Breyn. Cent.
1. 148; Cotyla Africana, caesio caly-
ce, eleganti, flore albo, 14. Moris. f. 6.
T. 12. Boerb. XVI.*
- CHAMAEPITYs, lutea, vulgaris, folio trifido,
officin. *Matth. p. 670. Riv. Monop. Boer-
bau. I.*
- CHENOPODIUM, folio triangulo; Bonus Hen-
ricus, offic. *Matth. p. 449; Boerb. I.*
- - quod dicitur Pes Anserinus; Atriplex, 3.
Matth. p. 362; 1. Tabm. p. 812. Boerb. IV.
 - - folio sinuato, candicante; Atriplex 3.
Moris. f. 5. T. 31. Boerb. VI.

CHE-

- No. CHENOPODIUM, angustifolium, laciniatum, vel non laciniatum, maius, et minus, *Boerb. VII.*
- - foetidum; Atriplex foetida 6. *Moris. f. 5. T. 31; Vuluaria, Tabm; p. 812. Boerb. IX.*
 - - Lini folio, villoso; Herba studiosorum, *Tabm. p. 1211; Boerb. X.*
 - - Ambrosioides, folio sinuato; Botrys *Matth. p. 620; offic. 7. Moris. f. 5. T. 31. Boerb. XI.*
 - - Ambrosioides, Mexicanum; Botrys Mexicana, *Munting. Aardgew. F. 118; 8. Moris. f. 5. T. 31. Boerb. XII.*
 - - incanum, Hispanicum, Lini folio, *Feussier.*
 - - Kali folio, semine splendente; Kali minus, *H. Eyst. Aest. O. 6. F. 1. fig. 3; Boerb. I. P. II. 91.*
- CHENOPODIO - MORUS, maior; Atriplex, Mori fructu, vel fragifera, 9. *Moris. f. 5. T. 32; Boerb. I.*
- CHONDRILLIS AFFINIS, Trinciarella, *J. B. 2. 1021.*
- CHONDRILLA, Sonchi folio, flore luteo, pallescente; Lactuca sylvestris, murorum, *J. B. 2. 1004; Boerb. I.*
- CHRYSANTHEMUM, folio Matricariae, flore luteo, *H. Eyst. Aest. O. 5. F. 6. Boerb. I.*
- - folio Matricariae, flore luteo, pleno, *Boerb. II.*
 - - flore, partim candido, partim luteo; Creticum 3. *Moris. f. 6. T. 4. Boerb. III.*
 - - folio Matricariae, flore albo, pleno, *Boerhau. IV.*
 - - segetum, facie Bellidis sylvestris, foliis glaucis, Papaveris hortensis instar, profunde incisus, maius; Chrysanthemum *Dodon. 2. 3. 20. Boerb. IX.*

- No. C I C E R sativum, flore ex purpura rubente, femine rubro, *Riv. Tetrap. Boerb. I.*
 - - flore candido, fructu pallido.
- C I C U T A, maior, *Riv. Pentap; Boerb. I.*
 - - minor, Petroselino similis; Cynapium *Riv. Pentap; Boerb. II.*
- C L I N O P O D I U M, fistulosum, pumilum, flore coerulecente, *Plukn. T. 164. F. 4. Moris. 5. f. 11. T. 8. Boerb. VIII.*
 - - Origano simile, flore albo, *T. 195. C. B. P. 225.*
- C L Y M E N U M, Hispanicum, flore vario, filiqua non articulata, *Boerb. I.*
 - - Hispanicum, flore vario, filiqua articulata; Lathyrus folio pinnato, *Riv. Tetrap; Boerb. II.*
 - - Bithynicum, filiqua singulari, flore minore, *Boerb. III.*
- C N I C U S; Atractylis lutea *Dod. 5. 5. 17; Boerb. II.*
 - - Atractylis alba dictus; Carduus Atractylidis facie, flore leucophaeo, *Tourn. Cor. p. 33.*
 - - exiguus, capite cancellato, semine tomentoso, flore purpureo; Carduus minimus, *Park. Th. p. 959. Prosp. Alp. Exot. 254; Boerb. IV.*
 - - sylvestris, hirsutior; Carduus benedictus, *offic. Matth. p. 594; Boerb. V.*
- C O C H L E A R I A, Hederae folio, 3. *Moris. Boerb. II. a. b.*
 - - folio subrotundo, *offic. Matth. p. 380. 1. Moris. f. 3. T. 20. J. B. 2. 942; Sisymbrium, Zanon. F. 72. p. 188; Boerb. III.*
- C O L O C Y N T H I S, fructu rotundo, maiore, *Matth. p. 877. Boerb. P. II. 80.*
- C O L U T E A, Africana, annua, foliis parvis, mucrona-

- No. cronatis, vesiculis compressis, *H. A. P. II. Fig. 44. Boerb. V.*
- COMMELINA, flore coeruleo, procumbens, Saponariae folio, *H. E. p. 93; Ephemerum Curassauicum, biscutatum, Herm. P. B. p. 146; Flos vid. apud Plum. N. G. T. 38. Boerb. P. I. 237.*
- CONVOLVULUS, Indicus, flore violaceo, maiore, *H. Eyst. Aest. O. 13. F. 8. Boerb. X. gen. 1.*
- Indicus, flore albo, purpurascens, femine albo, *7. Moris. f. 1. T. 7. Boerb. XII. gen. 1.*
 - flore coeruleo, folio hederaceo, *H. E. p. 97. F. 93. Boerb. XIII. gen. 1.*
 - Lusitanicus, flore azureo, *Munting. Aardgew. F. 136. Fol. 503. Borell. ic. 322. Boerb. I. gen. 2.*
 - Lusitanicus, flore, et femine albo, *Boerb. II.*
 - Siculus, annuus, coeruleus, minimus, flore paruo, auriculato, *Boccon. Rar. T. 48, Boerb. IV. gen. 2.*
- CONYZA, coerulea, acris, *Matth. p. 629; Moris. 25. f. 7. T. 20. Boerb. III.*
- capitata, globosa, *Bocc. Rar. p. 13; sed capitulis magis confertim ad cauliculos positis; 14. Moris. f. 7. T. 20.*
 - minor, flore globoso, luteo; Chrysanthemum conyzoides, palustre, *31. Moris. P. 3. p. 19. Conyza 2. Tabm. p. 1244. Boerb. IX.*
 - Americana, Lamii folio, Cacaliae flosculis; Eupatorium, Senecionis facie, *Herm. P. B. p. 161; Boerb. X.*
- CORCHORUS Plinii, vel Melochia; *Moris. f. 3. T. 15. F. 4. p. 283; Hypecoon, folio integro; Boerb. P. I. 318.*

- No. CORIANDRUM, satium, officin. maius, Riv.
Pentap. Boerb. I.
- - sylvestre minus, testiculatum, C.B.P.
Riv. Pentap. Boerb. II.
- COR INDUM, folio, et fructu maiore; Pisum
cordatum, *H. Eyst. Aest. O. 13. F. 11;*
Vesicaria Riv. Tetrap; Boerb. I.
- - folio, et fructu minore, *Boerb. II.*
- CORONA SOLIS; flore aureo, semine nigro;
Chrysanthemum 38. Moris. f. 6. T. 6;
Boerb. I.
- - maxima, flore aureo, semine albo; *B. II.*
- - maxima, flore aureo, semine cinereo,
Boerb. II.
- - maxima, flore aureo, semine striato,
Boerb. II.
- - flore pallido sulphureo, semine nigro,
Boerb. III.
- - flore pleno, aureo, semine albo, *Boerb. V.*
- - flore flauescente, pleno, radio minore,
semine albido.
- - flore flauescente, pleno, semine fusco.
- CORONILLA, Cretica, herbacea, flore paruo,
purpurascente, *T. Cor. Boerb. VII.*
- CORONOPUS, hortensis, C.B.P. p.32. *Matth. p.*
383 Boerb. I.
- COTULA, flore luteo, radiato, *T; H. Eyst. Aest.*
O. 14. Fol. 13. F. 4. Boerb. I.
- - flore pallido, radiato, *Boerb. II.*
- - flore luteo, nudo; *Chrysanthemum Va-*
lentinum, Clus. H. 332. Boerb. V.
- CRUCIATA, tomentosa, flosculis luteis, in
corniculis longis, hispidis, *Barell. ic.*
541. f. 2. Col. Rar. 1. 297. Boerb. III.
- CUCUMIS, oblongus, satius, vulgaris, flore
luteo, *6. Moris. f. 1. T. 6; officin. Boerb. I.*
- Cu-



Cucumis Orientalis fructu Citriformi.

- No. CUCUMIS, orientalis, *H. Carolsr.* fructu Citri formi; *ramum vid. nostra Tab. XXI.*
- CUCURBITA, lagenaria, flore, et fructu albo, folio maiore Melonis, *offic. 1. Moris. f. 1. T. 5. Boerb. I.*
- - longior, *Dod. 5. 2. 6. Boerb. III.*
- - latior, *Dod. l. c. Boerb. IV.*
- CUMINOIDES, vulgare; Cuminum sylvestre, capitulis globosis, *J. B. 3. 2. 23; Moris. Umbelliferis affinis, f. 9. T. 13; Boerb. P. I. 132.*
- CUMINUM, *offic. Riv. Pentap. Boerb. P. I. 49.*
- CUSCUTA, *offic. Matth. p. 879.*
- CYANUS, floridus, odoratus; Turcicus, flore purpureo, *Park. Th. p. 481. Boerb. III.*
- - odoratus, Turcicus, flore albo, *Boerb. IV.*
- - moschatus, flore luteo; moschatus Orientalis, *9. Moris. f. 7. T. 15; Munting. Aardgew. F. 143. Boerb. VI.*
- - fegetum, flore coeruleo, *officinar. Boerb. VII. et plures diuersae species, Matth. p. 389.*
- CYNOGLOSSUM, minus, hirsutum, vineale, flosculis minimis, coeruleis, *10. Moris. f. 11. T. 30; Lappula Rivini; Boerb. VII.*
- CYSTICAPNOS, Africana, scandens, *Boerb. P. I. 310. cum icon.*

D.

- D**AUCUS, vulgaris; Pastinaca sylvestris, tenuifolia, *Dod. 5. 3. 9; Staphylinus Riv. Pentap; Boerb. I. a. b.*
- - fatius, radice alba; Staphylinus fatius, *Riv. Pentap; Boerb. II a. b.*
- - fatius, radice Aurantii coloris, *Boerb. IV a. b.*
- - fatius, radice atro-rubente, *Boerb. V. a. b.*

- No. DELPHINIUM, Platani folio; Staphisagria offic.
flore coeruleo, Riv. Pentap. Matth. p.
850; Boerb. II.
- - fegetum, flore coeruleo, offic. Riv. Pentap;
Consolida regalis, C. B; Boerb. IV.
- DELPHINII hortensis plures species, flore sim-
plici, et pleno, Boerb. P. I. 302.
- DENSLEONIS, folio Erysimi, vulgaris, Borell.
ic. 237. Boerb. XI.

E,

- ECHINOPUS, minor, capite magno, flosculis
purpuro-violaceis; Carduus, Borell.
ic. 144; Scabiosa, Par. Bat. 224; Boerb. V.
- ECHIUM, ramosius, annuum, flore suauiter ru-
bente, caule, rubris punctis notato,
6. Moris. f. 11. T. 27; fortassis erit varie-
tas illius, quod est apud Tourn. Voy.
Tom. II. p. 107.
- ELATERIUM, offic; Cucumis sylvestris, Asininus
dictus, Matth. p. 849. Boerb. P. II. 77.
- ENDIVIA, seu Intybus vulgaris, offic. flore coe-
ruleo, 2. Moris. f. 7. T. 1; Cichorium
latifolium, Boerb. I.
- - vulgaris; Cichorium latifolium, flore
candicante, Boerb. II.
- - flore coeruleo, 1. Moris. f. 7. T. 1; Cicho-
rium angustifolium, Boerb. III.
- - crispa, 3. Moris. f. 7. T. 1; Cichorium cri-
spum, Boerb. V.
- ERUCA, sylvestris, flore luteo, foetens, foliis
magis profunde dissectis, 16. Moris. T.
6. f. 3. Zannichell. Hist. Pl. Venet. F. 178.
Boerb. I.
- - maior, sativa, flore albo, striato, 1. Moris.
f. 3. T. 5. Boerb. II.

ERU-



Erysimum Monsperfulanum
Sinapios folio.

- No. ERUCA, minor, lutea, sylvestris, Bursae Pastoris folio, Italica, *Barell. ic. 1016.*
- ERUCAGO, segetum, *Tournef. 103; Eruca Mons-peliaca, Moris. 24. f. 3. T. 6; Boerhau. P. II. 10.*
- ERVUM, offic. Riv. Tetrap. Boerb. I.
- ERYSIMUM, offic; Irio, *Matth. p. 431; Boerb. I.*
- - Monspeffulanum, Sinapios folio; an ma-
ius, et angustifolium, 4. *Moris. sect. 3.*
Tab. 3. Boerb. III? ramum, et florem,
vid. nostra Tab. XXII.
- - polyceratium, C. B; Irio, 2. *Matth. p. 431;*
Boerb. VI. a. b.
- EUPHRASIA, offic. flore albo, ramosa, *Matth. p.*
721. H. Eyst. Aest. O. Arb. F. 13. F. 3. Riv.
Monop. Boerb. I.
- - pratensis, rubra, *Col. Rar. 1. 202; 10. Moris;*
Odontites, Riv. Monop; Boerb. II.
- - montana, lutea, 16. *Moris. f. 11. T. 24; O-*
dontites, Riv. Monop; Col. 1. 203.
- - non ramosa, pratensis, flore coeruleo,
purpurascente, *H. Eyst. Aest. O. Arb.*
F. 13. F. 4. Moris. f. 11. T. 24.

F.

- FABA, maior, offic. Riv. Tetrap. Boerb. I.
- - minor, offic. Riv. Tetrap; Equina, C. B.
Boerb. III.
- FAGONIA, Cretica, spinosa, T. 265; Trifolium
spinosum, Creticum, 5. *Moris. T. 14. f.*
2. Clus. H. CCXLII.
- FAGOPYRUM, vulgare, erectum; Frumentum
Saracenicum, 1. *Moris. f. 5. T. 29. officin.*
Matth. p. 320. Boerb. I.
- - vulgare, scandens: Frumentum Sarace-
nicum, 2. *Moris; Boerb. II.*

- No. FAGOPYRUM, Turcicum, semine maiori, anguloso.
- FERRUM EQUINUM, filiqua singulari, *Garid. Riv. Tetrap. 1. Moris. f. 2. T. 10. Boerb. I.*
- - filiqua multiplici, 2. *Moris. f. 2. T. 10. Boerbau. II.*
- FICOIDES, Africana, folio Plantaginis, undulato, micis argenteis adperso, flore argenteo, *Volck. 166. Boerb. I. gen. 3.*
- - Africana, procumbens, Portulacae folio, flore luteo; Kali aizoides, Canariense, *Volck. p. 236.*
- - siue Ficoidea, Hispanica, folio longiore, *H. E. p. 143. Boerb. XII. gen. 3.*
- FILAGO, quae Impia, *Dod. 1. 3. 14*; Gnaphalium offic. maius, capitulis in summitate positis, et nonnihil rubentibus; de cetero idem, ac 10. *Moris. f. 7. T. 11. et 2. Matth. 625; Boerb. I. a. b.*
- - minor, repens, *Dod. 1. 3. 14.*
- - maritima, capite folioso, *Clus. H. 328*; Gnaphalium Alpinum, 5. *Moris. f. 7. T. 11*; Leontopodium, *Lobel. ic. 255; Boerb. V.*
- - minor, tomentosa, erecta; Gnaphalium 3. *Clus. H. 329; Boerb. VI.*
- FOENICULUM, vulgare, Italicum, semine oblongo; Erratici, *Matth. specie; Boerbau. II.*
- FOENUM GRAECUM, offic. *Riv. Tetrap. Boerb. I.*
- - sylvestre, alterum, *Dod. 4. 3. 15. Boerb. IV.*
- - polyceratum, Creticum, maius, flore luteo, *Breyn. Cent. 1. T. 33. Boerb. V.*
- - polyceratum, minus, *Riv. Tetrap. Mons-peliacum, Breyn. Cent. 1. T. 33. Boerbau. VI.*

- No. FOENUM GRAECUM, sylvestre, Meliloti facie,
T. Cor. 28; Melilotus, Italica, corni-
 culis incurvis, folio latiore, *J. B.* 2. 372.
- FUMARIA, vulgaris, flore purpureo, *offic. Riv.*
Tetrap. Boerb. II.
- - minor, tenuifolia, flore niueo, *Boerb. IV.*
 G.
- GALEOPSIS, annua, Hispanica, rotundiore
 folio, *T. Inst. p.* 186; Ocymastrum Va-
 lentin. *Clus. H. XLII.*
- - patula, segetum, flore purpurascence;
 Ladanum segetum, folio latiore, *Riv.*
Monop; Boerb. III.
- - flore paruo, roseo; quae Stachys aruen-
 sis, minima, *Riv. Monop.*
- GALLIUM, multicaule, supinum, minimum,
 an *Rupp. Fl. Jen. p.* 3. *Vaillant p.* 78?
 sed cauliculos quatuor foliola per in-
 terualla cingunt.
- GARIDELLA, *Tournef.* foliis tenuissime diui-
 sis; *Garidell. Tab.* 39. *Boerb. P. I.* 283.
- GERANIUM, Africanum, Coriandri folio, flo-
 re incarnato, et striis rubris, *Riv.*
Pentap. Boerb. VIII. a. b.
- - Africanum, Uuae crispae folio, floribus
 exiguis, rubellis, *H. L.* 289. Africa-
 num, flore minuto, *Riv. Pent. Boerb.*
XIX.
- - minori folio, rotundo, 3. *Matth. p.* 621;
 Columbinum, *offic. J. B.* 3. 473. flore
 ex coeruleo purpurascence; Maluae
 folio rotundo, maius, 2. *Moris. Boerb.*
XLI.
- - femine nigro, coeruleo flore; Bohemi-
 cum, minus, Batrachioides, annuum,
 1. *Moris. f. 5. T. 15. H. E. p.* 159. *Boerb. XLII.*

- | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. | GERANIUM, annuum, rotundifolium, montanum, saxatile, lucidum, foliis crassis,
<i>H. Eyst. Vern. O. 1. F. 10. Boerb. XLVIII.</i> |
| - - | myrrhinum, quod illi <i>Barell.</i> radice perenni, simile, <i>ic. 1245.</i> |
| - - | Creticum, acu longissima, flore coerulescente, <i>Riv. Pentap. Boerb. LIV.</i> |
| - - | Cicutae folio, minus, et supinum, <i>J. B. 3. 479. Boerb. LV.</i> |
| - - | moschatum, Cicutae folio, <i>Riv. Pent. Boerb. LVIII.</i> |
| - - | folio Alceae, tenuiter laciniato, flore exiguo purpureo, femine tenui, <i>Boerhau. LXII.</i> |
| | GLAUCIUM, hirsutum, flore phoeniceo; Papauer corniculatum, <i>Clus. H. XCI. Lobel. p. 141; Boerb. II.</i> |
| - - | glabrum, flore phoeniceo, 2. <i>Moris. f. 3. T. 14. Boerb. III.</i> |
| - - | flore violaceo; Papauer corniculatum, 3. <i>Moris. f. 3. T. 14. Lobel. p. 141; Boerb. IV.</i> |
| | GRAMEN, dactylon, angustifolium, spicis villosis, 14. <i>Moris. p. 184. Ischaemum, 2. Tabm. p. 534.</i> |
| - - | dactylon, foliolatiore; Gramen Ischaemon <i>Plinii, 2. Moris. f. 8. T. 3. Tabm. 1. p. 534; Gramen mannae esculentum, Lobel. p. 13; Boerb. II.</i> |
| - - | dactylon, Orientale, maius, frumentaceum, femine Napi, <i>Plukn. Almag. p. 174. Phyt. T. 91. F. 5. granis impletur fere, ut H. M. P. 12. p. 149. T. 78.</i> |
| - - | Gras Montbelgardensium; Festuca graminea, gracilis, <i>Barell. ic. 83. Num. 1. Boerb. VII.</i> |
| - - | seu Festuca auenacea, sterilis, spicis depen- |

- No. dependentibus, Bromos dicta, *Moris. 11. f. 8. T. 7.*
- GRAMEN, alopecuroides, seu paniceum, spica rotundiore, *Barell. ic. 116. No. 1. Boerb. VII.*
- - alopecuroides, minus, spica virescente, diuulsa, *Barell. ic. 115.*
 - - Barcinonense, *Tournef*; Alopecurum minus heteromalla panicula, *Barell. ic. 4.*
 - - segetum, altissimum, panicula miliacea, sparsa, *C. B. Th. p. 34; Moris. f. 8. T. 5.*
 - - paniceum, panicula aspera, simplici, *11. Moris. f. 8. T. 4. p. 189. Boerb. V.*
 - - tremulum, maius, phalarinum, *45. Moris. f. 8. T. 6. Boerb. IV.*
 - - tremulum, maximum, phalaroides, citrinum, maius, *Barell. ic. 23. Moris. 48. f. 8. T. 6. Boerb. VI.*
 - - tremulum, minus, panicula parua, *Boerb. VIII.*
 - - Africanum, aculeatum, echinatum, *4. Moris. f. 8. T. 5.*
 - - Loliaceum, spica longiore; Lolium verum, *offic. Gesneri; 1. Moris. p. 181. f. 8. T. 2. Boerb. I.*
 - - nemorosum, iunceae panicula, calyculis paleaceis; Holostium, *Matth. p. 687; Tabm. Gramen iunceum, 6. p. 536; Boerb. II.*
- GRANADILLA, hederæ hirsuto folio, flore albo, fructu reticulato, *Herm. P. B. p. 173. Boerb. V. a. b.*

H.

HEDYPNOIS; Hieracium, capite inclinato, femine adunco, *C. B. P; Intybus 6. Moris. f. 7. T. 1; Lobel. obs. 115. Boerb. I.*

HE-

- No. HEDYPNOIS, Mauritanica, folio paullo minus laciniato, calyculis minoribus.
- HEDYSARUM, annuum, flore rubente, filiqua undulata, *Riv. Tetrap. Boerb. V.*
- - annuum, angusto viciae folio, flore parvo purpurascente, an *Boerb. VIII?*
- HELIANTHEMUM, salicis folio; Cistus humilis, annuus, *Lobel. Obs. 552; Boerb. VIII.*
- - Orientale, Oleae folio, flore luteo, *Sheppard. Boerb. X. a. b.*
- - annuum, Rosmarini folio, flore luteo, minori, perianthio striato, vesicario; similis *Barell. ic. 440; Boerb. XII.*
- HELIOTROPIMUM, maius, *Dioscoridis*, flore albo, 1. *Matth. p. 893. Moris. 7. f. 11. T. 31. Boerb. I.*
- - Americanum, vel Canariense, Hormini folio, flore coeruleo, *Dodart. Memoir. p. 83. Boerb. IV.*
- - minus, angustifolium, aruense, hirsutum, flore minore; Scorpiurus, 1. *Moris. f. 11. T. 31; Boerb. VII.*
- - angustifolium, palustre, glabrum; Echium Scorpioides, *Matth. p. 471; Scorpiurus, 2. Moris; Boerb. VIII.*
- HESPERIS, Leucoii folio, non ferrato; Leucoium luteum, sylvestre, angustifolium, 4. *Tabm. p. 693. Moris. 18. T. 8. f. 3; Keiri sylvestre nonnullorum; Boerb. X.*
- - Leucoii folio, dentato, paruo flore, luteo; similis *H. E. 180. F. 177. Boerb. XII.*
- - maritima, flore rubro, latifolia, filiqua tricuspide; Leucoium 13. *Moris. f. 3. T. 8; Boerb. XV.*

HESPE-

- No. HESPERIS, Chia, faxatilis, Leucoii folio, serrato, flore paruo, rubello, *Boerb. XVII.*
- - similis Burfae Pastoris; Draba *s. Moris. f. 3. T. 7*; an Hesperis *Boerb. XXIII?*
- HIERACIUM, Echioides, capitulis Cardui benedicti, flore luteo, *38. Moris. f. 7. T. 5. Boerb. II.*
- - amygdalas amaras olens, vel odore Apulii, *Boerb. VI.*
 - - lanatum; Sonchus, *J. B. 2. 1026. Boerb. VII.*
 - - medio nigrum; Baeticum maius, barbatum, *Herm. P. B. p. 185; Boerb. IX.*
 - - folio Dentis Leonis, flore suauerubente, foetens, Apulum, *3. Moris. f. 7. T. 4; Boerb. XVII.*
 - - folio Chondrillae, glabrum; Chondrilloides *29. Moris. f. 7. T. 7; 2. Tabm. p. 494.*
 - - minus, Dentis Leonis folio, oblongo, angusto, glabro, *C. B. P. 35. Moris. f. 7. T. 4; Hyoseris 2. Tabm. p. 490.*
 - - foliis summe laciniatis, *3. Tabm. 491. a. b.*
 - - Intybaceum, *6. Tabm. p. 492.*
 - - folio Endiuiae, capite magno, striato, *Boerb. XXXVIII.*
- HORDEUM, offic. *Boerb. I.*
- HORMINUM, satium, coma purpuro-violacea, *J. B. 3. 309. Barell. Creticum, ic. 1233. Boerb. V.*
- - coma rubra, *J. B. 3. 309. Boerb. VI.*
- HYOSCYAMUS, vulgaris, vel niger, officin. *Riv. Monop. Boerb. I.*
- - Creticus, albus, flore rubello; Aegyptius, *Clus. H. LXXXIII. Boerb. II.*
- HYOSERIS, *1. Tabm. p. 490*; Endiuia minima, caule,

No.

caule, sub capite fistulosiore, 3. *Morif. f. 7. T. 1.*

HYPERCUM, Fumariae folio, flore luteo, *Dodon. 3. 4. 20. p. 446. Tourn. T. 115. Boerb. P. 1. 307.*

- - Fumariae tenuiore folio; quod conuenit cum *ic. Barell. 352.*

I.

JACEA, stellata, folio Papaueris erratici; Calcitrapa, *J. B. 3. 89; Carduus, Spina Stella, Tabm. 2. p. 1080; Boerb. I.*

- - stellata, Spina solstitialis dicta, Cyani folio, 27. *Morif. f. 7. T. 34. Dodon. 5. 5. 15. Boerb. II.*

- - spinosa, caule alato, capite lanuginoso, 29. *Morif. p. 145. Tom. 3; Carduus alatus, tomentosus, Lusitanicus, flore luteo, T; Boerb. VI.*

- - Cyanoides, caule alato, peregrina, Napi folio, *Morif. 20. f. 7. T. 26. Boerb. X.*

- - foliis Cichoraceis, villosis, altissima, flore purpureo; Stoebe Salmanticensis, 1. *Clus. H. IX. Boerb. XXXI.*

- - cauliculis squamatis, argentea, maior, flore purpurascence, 16. *Morif. f. 7. T. 26; Stoebe Salmantica, III. Clus. H. X; Boerb. XXXIV.*

- - foliis candicantibus, tenuiter laciniatis, calyculis non splendentibus, *J. B. 3. 31. Boerb. XXXV.*

JACOBAEA, Afra, folio Botryos, *Boerb. III. c. icon.*

- - Africana, flore amplo, purpureo, elegantissimo, folio Senecionis, *Volck. p. 225. Boerb. IV.*

- - vulgaris, offic. *J. B. 2. 1057. Boerb. X.*

JACO-

- No. JACOBÆA, Senecionis folio, viscoso, flore luteo; Pannonica, 1. *Clus. H. XXI*; Eri-
geron tomentosum, *Lobel. obs. p. 113*;
Boerb. XIII.
- - folio lato, laciniato, obscuro, flore lu-
teo, an 18. *Moris. f. 7. T. 17?*
- JALAPA, flore flauo; Mirabilis Peruuiana, 1.
Moris. f. 15. T. 1. H. Eyst. Aut. O. 2. F. 4;
Boerb. I.
- - flore purpureo, *Boerb. II.*
- - rugoso fructu, *officin. Boerb. V.*
- - flore albo, purpureo, eleganter variega-
to, *H. Eyst. Aut. O. 2. F. 3. f. 1. Boerb. VI.*
- JONTHLASPI, spicatum, quod est apud *J. B. 2.*
935; magis hoc conuenit cum nostro,
quam icon *Col. 1. 284. et Garid; Boerb. I.*

K.

- K**ALI, spinosum; quod flore albo differt ab
illa specie flore purpureo, *Buxbaum.*
Cent. 1. T. 12; 11. Moris. f. 5. T. 33; Tra-
gum, *Matth. p. 731; Boerb. II.*
- KETMIA, vesicaria, Veneta, *Barell. ic. 471. Boer-
bau. XVII.*
- - vesicaria, Africana; Alcea Capitis Bonae
Spei, *Barell. ic. 472. Boerb. XVIII.*
- - Indica, aculeata, foliis digitatis, *H. A. P.*
I. p. 35. F. 18. Boerb. XX.
- - Americana, urens, flore luteo, fructu
pyramidali, fulcato, *H. A. P. II. p. 153.*
- KNAWEL; Polygonum, graminis folio, 6. *Mo-
ris. f. 5. T. 29*, polyspermum, grami-
nis folio, flore viridi, et albo; *Boerb.*
I. P. II. 93.

No.

L.

LACHRYMA JOBI; Lithospermum arundinaceum, *Matth. p. 657; Boerb. P. II. 166.*

LACTUCA, sylvestris, costa, et foliis, in ambitu spinosis, *Dod. 635. Boerb. I.*

- - sylvestris, angusto, saligno, et longiore folio, costa spinosa, albicante, *Rupp. Flor. Jen. 166.*

LACTUCAE variae species, ex illis LV. quas retulit *Boerb*; inter eas Lactuca sativa, non capitata, *J. B. 2. 997. et Dodon. officinarum, Boerb. VI.*

LAMIUM, folio, caulem ambiente; Galeopsis, *Riv. Monop; Boerb. X.*

LAMPSANA; Endivia Napifolia, *Moris. 9. f. 7. T. 1; Boerb. I.*

LAPATHUM, Aegyptiacum, capsula barbata, *H. Pis. T. 37. F. 1. Boerb. XVI.*

LATHYRUS, distoplatiphyllus, hirsutus, magno, et peramoeno, odore flore, *H. A. P. II. F. 80. Boerb. IV.*

- - praecedentis similis, magno flore, albo, et odore, vexillo rubro.

- - Tingitanus, siliquis Orobi, flore amplo, ruberrimo, 1. *Moris. f. 2. T. 3. Boerb. V.*

- - Hispanicus, flore ochroleuco, *Riv. Tetrap. Boerb. VIII.*

- - Indicus, flore purpureo, siliqua hirsuta, *Riv. Tetrap.*

- - angustifolius, siliqua Ochri, alata, vexillo coeruleo, siliqua latiore, *Riv. Tetrap. Boerb. XI.*

- - angustifolius, idem, flore albo.

- - sativus, flore albo, 6. *Moris. f. 2. T. 2; Cicercula, Dod. p. 513; Boerb. XII.*

LATHY-

- No. LATHYRUS, Syriacus, amphicarpos, 5. *Moris. App. f. 2. Tab. 25. Boerb. XVII.*
- LAVATERA, folio, et facie Althaeae, flore albo, *Boerb. I.*
- - Africana, flore pulcherrimo; Malua, femine tecto, Pannonica, vel aestiua, trimestris, Hispanica, *Moris. 2. f. 5. T. 17; Boerb. II.*
- LENS, vulgaris, *Riv. Tetrap. Matth. p. 340. Boerb. I.*
- - maior, vulgaris, semine cinereo, et nigro, variegato, *Riv. Tetrap. Boerb. II.*
- LEUCANTHEMUM, Bellidis facie, umbelliferum; Aster Canadensis, 47. *Moris. f. 7. T. 22; Bellis, Borell. ic. 388; Boerbau. XI.*
- LIMONIUM, minus, annuum, peregrinum, folio Asplenii, bullato, *Boerb. VIII.*
- LINARIA, aruensis, coerulea, *H. E. F. 198; sed minus odora, quam ea C. B. Prodr. 107. Boerb. IV.*
- - triphylla, minor, flore luteo, pallido, calcari purpureo; ceteroquin Americanae similis, *Riv. Monop; Hispanica 1. Clus. H. 320. Boerb. X.*
- - Chalepensis, flosculis albis, *Riv. Monop. Triumph. obs. p. 87. Boerb. XV.*
- - hirsuto folio, subrotundo, flore, ex herbido flauescente, 27. *Moris. f. 5. T. 14; Elatine mas, J. B. Boerb. XVII.*
- - hirsuto folio, acuminato, in basi auriculato, flore luteo, 28. *Moris; Elatine, foemina, J. B. Boerb. XVIII.*
- LINOSYRIS, *Riv. Rupp. Fl. Jen. p. 76; Anonymos, Lini folio, Clus. H. 324.*
- LINUM, fatium, 1. *Moris. f. 5. T. 26. officin. 3. Matth. p. 334. Boerb. II.*

- No. LINUM, fatium, latifolium, Africanum, fructu maiore, *Boerb. IV.*
- - pratense, flosculis albis, catharticum, 19. *Morif. f. 5. T. 26.*
- LOTUS, flore rubro, filiqua angulosa; tetragonolobus 7. *Morif. f. 2. T. 18. Riv. Tetrap. Boerb. V.*
- - praecedentis similis, folio variegato, *Boerb. VI.*
 - - tetragonolobus, flore luteo, filiqua angulosa, angusta; an *Boerb. VII?*
 - - filiquis Ornithopodii, 8. *Morif. f. 2. T. 18. filiqua arcuata, Riv. Tetrap. Boerb. X.*
 - - pentaphyllos, minor, hirsuta, angustissima filiqua; oligoceratos, Cretica, filiquis longis, erectis, 4. *Morif. f. 2. T. 18. Boerb. XI.*
 - - pentaphyllos, filiqua cornuta; Trifolium corniculatum, Creticum *Prosp. Alp. Exot. 268. Tourn. 403; Boerb. XII.*
- LUFFA, Arabum; Cucumis reticulatus, *Vesling. flore flauo; Cucumis Aegyptius, Prosp. Alpin. Morif. Append. f. 1. T. 7.*
- LUPINUS, peregrinus, maior, vel villosus, coeruleus, *Riv. Tetrap. Boerb. I.*
- - sylvestris, flore coeruleo, minore, *Riv. Tetrap. Boerb. II.*
 - - peregrinus maior, flore incarnato, *B. III.*
 - - fatius, offic. flore albo, *Riv. Tetr. Boerb. IV.*
 - - sylvestris, flore luteo, *Riv. Tetr. Boerb. VI.*
- LUTEOLA, Salicis folio; Pseudofrutium, *H. Eyst. Aest. O. 1. F. 15; Boerb. P. I. 251.*
- LYCHNIS, fegetum maior, flore rubescente, 31. *Morif. f. 5. T. 21; Pseudo-Melanthium, Matth. p. 581; Nigellastrum Dod; B. VI.*
- - fegetum maior, flore albo; Pseudo-Melan-

No.

Melanthium, *H. Eyst. Aest. O.1. F. 4.*
Boerb. VII.

LYCHNIS, Pseudo-Melanthio similis, Afra,
glabra, angustifolia, *H. L. B. 393. Bocc.*
Rar. p. 27. T. 14. Boerb. VIII.

- - Cretica, flore paruo, calyce striato, pur-
purascente, *T. Cor. Boerb. XXII.*

- - sylvestris, latifolia, calyculis turgidis,
striatis, pericarpio ampullato, pyra-
midali, sulcato, flore roseo, *33. Morisf.*
f. 5. T. 21. Boerb. XXV.

- - sylvestris, angustifolia, calyculis turgi-
dis, striatis, minoribus, pyramidalibus,
flore carneo, *J. B. 3. 350. Boerb.*
XXVI.

- - segetum, rubra, folio Perfoliatae; per-
foliata, et vaccaria, aut pentagonia;
27. Morisf. f. 5. T. 21. Boerb. XXXIX.

- - Orientalis, annua, supina, Anthirrini
folio, flore minimo, purpurascente,
H. E. p. 205; an Lychnis maritima, Ce-
paeae folio, Bocc. Mus. T. 118? Boerb.
XLIV.

- - viscosa, purpurea, latifolia, laevis; Cen-
taurium adulterinum, *J. B. 3. 355; Mu-*
scipula H. Eyst. Aest. O.1. F. 7; Morisf.
26. f. 5. T. 21. Boerb. L.

- - viscosa, alba, latifolia, laevis, *H. Eyst. l.c.*
Boerb. LI.

- - viscosa, foliis inferioribus Bellidis, flore
minimo, rubro, *Boerb. LII.*

- - noctiflora; Ocymoides non speciosum,
J. B. 3. 344; pericarpio oblongo, ma-
iori, flore luteo, viscosa, Boerb. LVI.

- - sylvestris, minima, flore muscoso, *Boer-*
hau. LVIII.

- No. **LYCHNIS**, fegetum, meridionalium, hirsuta, floribus albis, uno versu dispositis, *Morif. 36. p. 544. App. T. 36. f. 5. Boerb. LXI.*
- - hirta, minor, floribus variegatis; Lusitanica, flore picto, *Boerb. LXII.*
 - - fegetum, meridionalium, hirsuta, floribus roseis, uno versu dispositis, *Boerbau. LXV.*
 - - pericarpio pyramidali, striato, reticulato, viscosa, flore luteo, interne carneo, semine cuboide, punctato, *Morif. p. 542. icon. 28. App. f. 5. T. 36.*
- LYCHNI-SCABIOSA**, flore rubro; Scabiosa Orientalis, *H. Pisan. T. 48; Boerb. P. I. 131.*
- LYCOPERSICON**, fructu Cerasi, rubro, *B. II.*
- - fructu Cerasi, luteo, *Boerb. III.*
 - - fructu, luteo, striato, *Galen, Lob. Obs. 140. Boerb. IV.*
 - - fructu rubro, *Galen, Matth. p. 761. Boerb. V.*
 - - fructu rubro, striato, duro, *Solanum H. Eyst. Aut. O. 1. F. 5; Boerb. VI.*
- M.
- M**AJORANA, vulgaris, annua, offic. *Riv. Monop. Boerb. I.*
- MALVA**, vulgaris, flore minore, folio rotundo, offic. *Tabm. p. 1150; minor repens, pumila, Lobel. p. 371. Boerb. II.*
- - Syriaca, pumila, flosculis albidis, ad cauliculos conglobatis, 4. *Morif. P. II. p. 521. App. f. 5. T. 35. Boerb. IV.*
 - - Sinensis, erecta, flosculis albis, minimis, *Boerb. V.*
 - - vulgaris, flore maiore, subrubente, folio sinuato, offic. *Tabm. 1. p. 1150. Boerbau. VI.*
 - - vulgaris, flore purpureo, pulchriore.

MAL-

- No. MALVA, sylvestris, flore albo, folio sinuato, *Boerb. VII.*
- - rotundifolia, Italica, flore amplo, purpurascens; Althaea, *Barell. ic. 479; Boerb. IX.*
 - - folio vario, stellata, *J. B. 2. 950. Boerb. XI.*
 - - foliis crispis, *3. Moris. f. 5. T. 17. Boerb. XIII.*
 - - Americana, Ulmi folio, floribus congestis, *Boerb. XV.*
- MALVINDA, unicornis, *H. E. p. 217; Althaea, Carpini folio, flosculis luteis, Bocc. Rar. p. 11. T. 6; Moris. Alcea, 7. f. 5. T. 19; Malva Zanon. F. 53. p. 132; Alcea utriusque Indiae, semine, simplici aristâ donato, Boerb. XI.*
- MAYS, granis aureis; Frumentum Indicum C. *B. P; 1. Moris. f. 8. T. 13. Boerb. I.*
- - granis rubis, *Boerb. II.*
 - - granis coeruleis.
 - - granis flauescentibus, vel albidis.
- MEDICA, fructu echinato, maiore, *Riv. Tetrap. 7. Moris. f. 2. T. 15. Boerb. VII.*
- - fructu echinato, maiore, albidior.
 - - fructu echinato, maiore, oblongo, spinis sursum et deorsum, *8. et 9. Moris. Boerb. X.*
 - - fructu echinato, maiore, rotundior, spinis sursum et deorsum spectantibus.
 - - fructu echinato, minori, *Riv. Tetrap. spinis infirmis, 19. Moris.*
 - - fructu echinato, minori, spinis firmis; Trifolium cochleatum, *2. Dodon. p. 565; 18. Moris. Boerb. V.*
 - - fructu echinato, exiguo, *J. B. 2. 386.*
 - - fructu echinato, minimo; echinata hirsuta, *J. B. 2. 386.*

- | | |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| No. | MEDICA, fructu echinato, mediocri, rectis, brevioribus spinis. |
|-----|----------------------------------------------------------------|
- - fructu echinato, dicarpos, alba, 17. *Morif.*
 - - fructu echinato, spinis rarioribus, reflexis, fructu tribuloide, 20. *Morif.*
 - - fructu echinato, ad latera reflexis spinis, brevioribus.
 - - fructu echinato, echinis rectis, brevioribus.
 - - fructu echinato, minori, echinis brevioribus, 10. *Morif.*
 - - fructu quasi doliato, maiore, non spinoso; similis fructus Trifolii falcati, 2, *Morif. l.c*; doliata, non spinosa maior, *H. Carolsr.*
 - - fructu doliato, minore, non spinoso.
 - - fructu doliato minore, quodammodo spinoso, 13. 14. *Morif.*
 - - Cretica, orbiculata, fructu utrinque turbinato, maiore, *Boerb. XXII.*
 - - fructu scutellato, maiore, oris crispis, 1. *Morif. Boerb. III.*
 - - fructu scutellato, maiore, oris non crispis, 2. *Morif.*
 - - fructu scutellato, minore; similis fructui Trifolii falcati, 1. *Morif.*
 - - fructu cochleato, singulari, *Riv. Tetrap. 3. Morif. Boerb. II.*
 - - fructu cochleato, minori, ad margines leuiter echinato, 11. *Morif.*
 - - fructu cochleato, minimo, ad margines leuiter echinato, *H. Carolsr*; minor est species, quam 18. *Morif.*
 - - fructu cochleato, maiore, capsula turbinata, plana, 5. *Morif.*

- No. MEDICA, fructu cochleato, dicarpos, turbinata, rugosa, 6. *Morif. Boerb. VI.*
- - fructu cochleato, minore, rugoso, albo, 4. *Morif. Boerb. IV.*
- MEDICAGO, annua, Trifolii facie, siliqua falcata, crenata; Medica, 3. *Morif. f. 2. T. 16. Boerb. II.*
- - Vulnerariae facie, Hispanica, flore luteo; Falcata, folio Anthyllidis, *Riv. Tetrap; Borell. ic. 576; Boerb. III.*
- - maritima, annua, trifolia, polycarpos, fructu toroso, non spinoso, *H. Pis. T. 42. F. 2.*
- MELAMPYRUM, coma purpurascens, *Riv. Monop. 1. Morif. f. 11. T. 23. Boerb. I.*
- - luteum, sylvaticum, *Riv. Monop. Boerb. II.*
- MELILOTUS, supina, Cretica, folliculis rugosis, minoribus, spicis densis, 5. *Morif. f. 2. T. 16. Boerb. III.*
- - lutea, feminis pericarpio magno, rugoso, rotundo, albo; Orientalis, folliculis rugosis, maioribus, 4. *Morif. f. 2. T. 16; Boerb. IV.*
- - Messanensis; Italica, minor, folliculis striatis, singularibus, *Riv. Tetrap. Morif. 9. f. 2. T. 16; Boerb. V.*
- - capsulis, reni similibus, in capitulum congestis; minima, *Riv. Tetrap. 8. Morif. f. 2. T. 16. Boerb. VI.*
- - maior, odorata, violacea, 10. *Morif; Tabm. Trifolium odoratum, fativum offic. p. 896; Riv. Tetrap. Boerb. VII.*
- - Cretica, fructu plano, orbiculari, maximo; Trifolium peltatum, *J. B. 2. 381; Boerb. VIII.*

- No. MELO, vulgaris, offic. 4. *Morif. f. 1. T. 6*; Melopepo, *Matth. p. 396*; *Boerb. I.*
- - reticulatus, *J. B. 2. 244. Boerb. V.*
 - - rotundus, minimus, cortice tenuissimo, saccharinus, *Morif. App. f. 1. T. 8. Boerb. VII.*
 - - Turcicus, semine signato.
- MELONGENA, fructu oblongo, violaceo, *Matth. p. 760. H. M. 10. p. 147. T. 74*; *Boerb. I.*
- - fructu oblongo, albo, *Boerb. II.*
 - - fructu oblongo, flauo, *vid. Morif. P. III. 524.*
 - - fructu longissimo, violaceo; similis apud *Rauwolff. itiner. L. 4. n. 73.*
- MELOPEPO, fructu maximo, albo; Pepo Indicus maximus, compressus, *Lobel. 365. 4. Morif. f. 1. T. 5*; *Boerb. II.*
- - verrucosus; Pepo verrucosus, 7. *Morif. f. 1. T. 5*; *Boerb. IV.*
 - - tuberosus, et verrucosus, *Boerb. V.*
- MERCURIALIS, testiculata, mas, offic. *Matth. 1. p. 890. Boerb. I.*
- - spicata, foemina, *Matth. 2. p. 890. Boerb. II.*
- MILIUM, offic. flauis granis, *Matth. p. 328. Boerb. I.*
- - nigris granis, 2. *Morif. f. 8. T. 5. Boerb. II.*
 - - arundinaceum, subrotundo semine; Sorgo nominatum, fructu albo, *Hort. Eyst. Aut. O. 2. F. 13. F. 2.*
- MOLDAVICA, quae Cedronella, flore coeruleo, *Riv. Monop. Boerb. I.*
- - quae Cedronella, flore albo, *Riv. Monop. Boerb. II.*
 - - Orientalis, flore minore, purpurascens, folio Ocymi, *Commel. Rar. F. 29. Tournef. Cor.*

- No. MOLDAVICA, Orientalis, Salicis folio, flore
maiore, albido, *a. b.*
- - Orientalis, Salicis folio, flore maiore, coe-
ruleo.
- MOLUCCA, laevis; Melissa Moluccana, odo-
rata, *Munting. Aardg. F. 217; Riv. Mo-
nop. Boerb. I.*
- MOMORDICA, vulgaris, *offic*; Balsamina mas,
aut cucumerina, *Matth. p. 884; H. Eyst.
Aut. O. 1. F. 4. Boerb. I.*
- - fructu luteo, rubescence, *Boerb. II.*
- - Americana, fructu reticulato, sicco, *Com-
mel. Rar. F. 22. Boerb. V.*
- MYAGRUM, monospermum, latifolium, gla-
brum, siliqua ventricosa, breui; Ra-
phanistrum, *4. Moris. f. 3. T. 21. p. 267;
Boerb. I.*
- MYOSOTIS, Hispanica, segetum; Ceration,
vel Alsine corniculata, *Clusii*; Lych-
nis *37. Moris. f. 5. T. 21; Boerb. I.*
- - Orientalis, perfoliata, Lychnidis folio,
H. E. 295. Boerb. V.
- - aruensis, hirsuta, paruo flore, *T. 245. F.
B. 3. 359.*
- MYOSURUS, *f. B. 3. 512*; Cauda muris, *Dod*;
Plantagini affinis, *Moris. f. 8. T. 17*; Ra-
nunculus, graminis folio, flore cau-
dato, *LXI. Boerb. it. P. II. 102.*
- MYRRHIS, nodosa, annua, semine aspero, *an
Boerb. VI?*
- - annua, semine striato, laeui, prima *Riv.
Pentap. Boerb. VII.*
- - annua, semine striato, villoso, incano;
Daucus Creticus, *f. B. 3. 2. 56; Boerb.
IX. a. b.*

No.

N.

NAPUS, sylvestris, offic. Dod. 1. 4. 27. H. Lugd. p. 645. Moris. 2. f. 3. T. 2. p. 214. Boerb. P. II. 13.

- - fatuus, offic. Bunias; Moris. 1. f. 3. T. 2. Napus Dod. p. 663.

NASTURTUM, sylvestre, Dalechamp; Thlaspi f. B. 2. 925; Thlaspidium, Nasturtii folio, flore albo, Riv. Tetrap; Boerb. I.

- - hortense, vulgatum, offic. C. B. P. 1. Moris. f. 3. T. 19. Boerb. II.

- - crispum, 4. Moris. Boerb. III.

- - sylvestre, folio Oxyridis, 7. Moris; Thlaspi, 16. Tabm. p. 853; f. B. 2. 914. Boerb. V.

- - sylvestre, capsulis cristatis, repens, folio cornu cerui, Dod. p. 110; 9. Moris. Boerb. VI. a. b.

- - sylvestre, tenuissime incisum, 7. Moris; Iberis, Matth. p. 237; Boerb. VII.

- - sylvestre, Valentinum, Clusii, H. CXXX. 8. Moris. f. 3. T. 19; Eruca Lobel. p. 102; Boerb. IX.

NICOTIANA, maior, latifolia, flore rubro offic. Moris. 1. f. 5. T. 11. Boerb. I.

- - minor, flore luteo; Petum, aut Priapaea Knauth; 4. Moris. f. 5. T. 11. f. B. 3. 630. H. Eyst. Aut. O. 2. F. 10. Boerb. III.

- - minor, flore luteo; infundibulo et calyce longiori.

NIGELLA, arvensis, cornuta, flore coeruleo, offic. 1. Moris. f. 12. T. 18. Boerb. I.

- - latifolia, flore maiore, simplici, coeruleo; Hispanica, 9. Moris. l. c. Boerb. II.

- - latifolia, flore simplici, albo, Hispanica.

- - angustifolia, flore coeruleo, maiore, simplici, Romana, 7. Moris. l. c. Boerb. III.

Ni-

- No. NIGELLA, angustifolia, flore maiore, pleno, coeruleo, Romana, 8. *Moris. l. c. Boerb. IV.*
- - flore minore, simplici, candido, 4. *Moris. l. c. offic. Boerb. V.*
 - - Chalepensis, lutea, corniculis longioribus, 10. *Moris. f. 12. T. 18.* semine plano, alato; *an Boerb. VI?*
- NISSOLIA, vulgaris; Lathyrus angustifolius, sine capreolis, *H. R. Monsp. p. 112; Boerbau. P. II. 25.*
- O.
- OCYRUS, folio integro, capreolos emittente, semine pullo, *Tournef. T. 219; Ervilia, Dod; Moris. Lathyrus, 8. f. 2. T. 3; Boerb. P. II. 43.*
- - folio integro, capreolos mittente, semine nigro.
- OCYMUM, latifolium, maculatum, vel crispum, *Barell. ic. 1065. Moris. 3. f. 11. T. 20. Boerbau. III.*
- - foliis fimbriatis, viridibus, *H. Eyst. Aest. O. 7. F. 10. Boerb. V.*
 - - caryophyllatum, maius, *offic. Riv. Monop. 1. Matth. p. 407. Moris. 1. Boerb. VII.*
 - - vulgatus, medium, flore, et caule albo, *Matth. 2. p. 407. Barell. ic. 1055; 9. Moris. Boerb. XIV.*
 - - medium, foliis viridibus, in ambitu luteis.
 - - minus, angustifolium, foliis ferratis, *Riv. Monop. Boerb. XVIII.*
 - - minimum, caryophyllatum, *Matth. p. 407. Riv. Monop. Boerb. XXI.*
 - - latifolium, *C. B. Prodr. 109.* folio minus maculato.

- No. **OMPHALODES**, Lusitanica, Lini folio, flore albo, *Barell. ic. 1234*; Cynoglossum, *ii. Moris. f. 11. T. 30*; *Boerb. II.*
- ONAGRA**, angustifolium, *8. Moris. f. 11. T. 3*; Lyfimachia, folio Persicae, *Barell. ic. 990*; *Boerb. III.*
- ORNITHOPODIUM**, radice, tuberculis nodosa, *J. B. 2. 351. Boerb. III.*
- - Portulacae folio; Scorpioides, *Riv. Tetrap. Garidel. Moris. 5. T. 11. f. 2*; *Boerbau. IV.*
 - - floribus luteis, filiquis non articulatis, in circulum contortis, *H. Carolsr.*
- ORYZA**, *Matth. p. 326. offic. Boerb. P. II. 160.*
- P.
- PANICUM**, Germanicum, panicula minore, *1. Moris. f. 8. T. 3. domesticum, 1. Matth. p. 328. Boerb. I.*
- - Italicum, panicula maiore, *2. Moris. et Matth. Boerb. II.*
 - - maritimi nomine missum; panicula, praeter ceteris breuiore.
 - - Indicum coeruleum, *J. B. 2. 441.*
- PAPAVER**, erraticum, Rhoeas, maius, *offic. Dod. p. 444. Moris. 6. f. 3. T. 14*; et diuersae species, *Matth. p. 745. Boerb. XVIII. et sequ.*
- - erraticum, capitulis minoribus, hirsutis, folio Anemones, *9. Moris. Lobel. pag. 144. Boerb. XXXII.*
 - - erraticum, hispidis, longiusculis capitulis, *Boerb. XXXIII.*
 - - hortense, flore nigro, pleno, *Lobel. obs. p. 142.*
 - - hortense, flore niueo, valde laciniato, simplici et pleno; satium, *Lob. obs. 142.*

No.

142. *Matth. p. 745*; et plures diuersae species; inter eas vero, quae gaudet flore et semine, albo ac nigro, *Dodon. 3. 4. 16. officin.*

PARTHENIASTRUM, Americanum, Ambrosiae folio, paruo flore, albo; Matricaria, Americana, *Boerb. XI.*

PEDICULARIS, pratensis, lutea; Crista galli, *Riv. Monop; Boerb. I.*

- - pratensis, purpurea, *Riv. Monop. Boerb. II.*

- - Chamaedryos folio, flore luteo; Trixago, 2. *Barell. ic. 774.*

PELECINUS, vulgaris; Utrunque ferrata, *Riv. Tetrap; Boerb. P. II. 55.*

PEPO, vulgaris; Cucurbita maior, rotunda, *C. B. P. 7. B. 2. 218; Boerb. II.*

- - rotundus, Aurantii forma, *H. Eyst. Aut. O. 3. F. 2. Boerb. III.* et plures Peponis species, *Boerb. P. II. 78.*

PERCEPIER, Anglorum, *J. B;* Alchimilla, 4. *Morif. f. 2. T. 20. Boerb. P. II. 93.*

PERFOLIATA, vulgatissima, aruensis, 1. *Morif. f. 9. T. 12; Riv. Pentap. officin. Boerb. I.*

- - longioribus foliis, 2. *Morif. Boerb. II.*

PERSICARIA, Orientalis, maxima, Nicotianae folio, calyce florum purpureo, *Commel. Rar. F. 43. Boerb. XI.*

PHALANGIUM, humile, Africanum, floribus luteis, *Boerb. III.*

PHALARIS, maior, semine albo; 1. *Morif. f. 8. T. 3. Matth. p. 659. Boerb. I.*

PHASEOLUS, vulgaris, fructu albo, 1. *Morif. f. 2. T. 5. Riv. Tetrap. Boerb. I.*

- - vulgaris, fructu rubro, *Boerb. III.*

- - vulgaris, fructu luteo, *Boerb. IV.*

- - vulgaris, fructu albo, et nigro, striato.

PHA-

- No. PHASEOLUS, vulgaris, fructu albo minore,
Venereus dictus, *Boerb. X.*
- - vulgaris, minor, fructu incano, cuius hilum limbo fusco cingitur, *Boerb. XI.*
 - - vulgaris minor, fructu albo, cuius hilum limbo nigro cingitur.
 - - puniceo flore, fructu magno, nigro, 4 *Morif. Boerb. XII.*
 - - puniceo flore, fructu, ex nigro, et colosino variegato, *Boerb. XIII.*
 - - Indicus, flore, et fructu candidissimis, *Boerb. XIV.*
 - - Americanus, radice strumosa, flore purpureo, *Hort. Carolsr. Boerb. XVIII.*
 - - Aegyptiacus, nigro semine; Lablab; *Clus. H. CCXXVII. Boerb. XIX.*
 - - Aegyptiacus, semine ruffo, *Boerb. XX.*
 - - Aegyptiacus, semine obsolete luteolo, *Boerb. XXI.*
 - - -pruriginosus, *H. Malab. P. 8. p. 61. T. 35. Nai Corana.*
 - - orthocarpos, Indicus, flore coeruleo, siliqua crassiore, semine nigro.
 - - orthocarpos, Insulae Barbados, flore pallido, rubente, siliqua tenuiore, semine, ex purpureo nigricante.
 - - orthocarpos, Americanus, flore pallido, luteo, semine flauescente, *Riv. Tetrap.*
 - - orthocarpos, Americanus, flore pallido, coeruleo, semine flauescente.
- PISUM, maius, quadratum, fructu subflavo, *H. Eyst. Aest. O. 13. F. 5. Boerb. III.*
- - siliqua carnosâ, incurva, seu falcata, eduli, *Riv. Tetrap. Boerb. X.*
 - - nanum, *Riv. Tetrap. Boerb. XIII.*
 - - praecox, Anglicum, *Boerb. XV.*

PISUM,

- No. PISUM, hortense, maius, flore, et fructu albo,
Boerb. XVII.
- - comosum, *Riv. Tetrap.*
 - - cortice eduli, fructu fusco, *Boerb. XXIII.*
- PLANTAGO, rosea, floribus, quasi in spica dispositis, *Matth. p. 375. Boerb. II.*
- - folio denticulato, angusto, paniculis Lagopi, 13. *Moris. f. 8. T. 16;* seruari etiam, inter perennes in Hibernaculo potest; *Boerb. XI.*
- POLYGALA, flore coeruleo, *offic. Matth. 836. Boerb. I.*
- - flore rubro, *Boerb. II.*
 - - flore albo, *Boerb. III.*
- POLYGONUM, vulgare, mas, *offic. Matth. p. 676. latifolium, Boerb. I.*
- - oblongo, angusto folio, *Boerb. II.*
- PORTULACA, domestica, *Matth. p. 372. Boerb. I. offic.*
- - aurea, foliis flavis, *Boerb. II.*
 - - angustifolia, sylvestris, *Matth. p. 372. Boerb. III.*
 - - Curassauica, lanuginosa, procumbens, *H. A. P. I. F. 5. Volck. p. 341. Herman. P. B. p. 215. Boerb. IV.*
- PSYLLIUM, maius, erectum, latifolium, annuum, *offic. 2. Moris. f. 8. T. 17. Boerb. I.*

Q.

- QUAMOCLIT, foliis tenuiter incis, et pinatis; Conuoluulus, *Moris. 7. f. 1. T. 4. Borell. ic. 60; Boerb. I.*
- - Americana, folio Hederae, flore coccineo, *Commel. Rar. p. 21. Boerb. II.*

R.

- RANUNCULUS, stellatus, echinatus, Creticus, 24. *Moris. f. 4. T. 29. Boerb. XXI.*

RANUN-

- No. RANUNCULUS, aruensis, echinatus, minor,
Moris. 23. f. 4. T. 29. Boerb. XXII.
- - parvus, palustris, folio trifido, *Moris. 20. f. 4. T. 28. Boerb. XXVII.*
- RAPHANISTRUM, segetum, flore luteo, vel pallido, 1. *Moris. f. 3. T. 13. Boerb. I.*
- - aruense, flore albo, *Boerb. II.*
- - flore albo, striato, filiqua articulata, striata, minore, 4. *Moris. f. 3. T. 13. Boerb. III.*
- - minimum, Monspeliense, filiquis articulatis, striatis, 3. *Moris. l. c.*
- - dispermum, *Rupp. Fl. Fen. p. 57. a. b.*
- RAPHANUS, maior, niger, orbicularis, 1. *Moris. f. 3. Tab. 13.*
- - maior, niger, radice pyriformi, vel longiori, 2. *Moris.*
- - maior, albus, orbicularis.
- - maior, albus, radice pyriformi, vel longiori.
- - minor, oblongus, 4. *Moris.*
- - minor orbicularis.
- RAPISTRUM, monospermum, orientale, Raphani folio, flore luteo, maximum, 3. *Moris. f. 3. T. 13. Boerb. II.*
- - maximum, rotundifolium, monospermum, *Cornut. H. Pl. Can. p. 148. Hispanicum, 1. Moris. f. 3. T. 13. flore albo, Boerb. III.*
- - aruense, folio auriculato, monospermum, flore luteo; Myagro similis, filiqua rotunda, 7. B; *Moris. f. 3. T. 21. et conf. p. 267; Myagrum, Zanon. F. 54. p. 134; Boerbau. IV.*
- RAPUM, rotundum, 1. *Matth. p. 346; Rapa sativa, rotunda radice, candida, offic. 1. Moris. f. 3. T. 2; Boerb. I.*


RAPUM,

- No. RAPUM, radice oblonga, 2. *Matth* p. 346; Rapa, 2. *Moris. f. 3. T. 2. Boerb. VII.*
- RESEDA, flore albo, *Boerb. II.*
- RHAGADIOLUS; Hieracium filiqua falcata, *Matth. p. 561; Boerb. I.*
- RICINOIDES, ex qua paratur Tournesol Gal-
lorum, *T. Inst. p. 655; Heliotropium*
minus, tricoccum Plinii, *Matth. 893.*
Clus. H. XLVII. Acad. Reg. Par. A.
1712. T. 17.
- RICINUS, vulgaris offic. caule cinereo, *Matth.*
p. 862. Moris. 1. f. 10. T. 3. Boerb. I.
- - Africanus, maximus, caule geniculato,
rutilante, *Boerb. III.*
- - totus ruber, *H. M. P. 2. F. 32. Munting.*
Aardgew. F. 234.
- - vulgaris, minor, *H. Eyst. Aest. O. 8. Fol. 11.*
Fig. 1. Boerb. V.
- RORELLA; Rorida, *Lobel. obs. 472; Ros folis,*
folio rotundo, *H. Eyst. Aest. O. 14. F.*
8. offic. Boerb. I.
- - seu Rorida, folio oblongo, *Lobel. Adv.*
454; Ros folis, 2. Moris. f. 15. T. 4; B. II.
- RUBEOLA, supina, spicata, longissima, latifo-
lia; Pseudo-Rubia, 2. *Moris. f. 9. T. 22;*
Rubia, Barell. ic. 549; Boerb. I.
- RUBIA, sylvestris, 2. *Matth. p. 659. Moris. 2. f. 9.*
T. 21. Boerb. II.
- S.
- SALICARIA, Hyssopi folio, latiore; Gratiola
minor, *Matth. p. 517; Hyssopifolia*
Riv; Boerb. III.
- - Hyssopi folio, angustiore, *Boerb. IV.*
- SALICORNIA, *Dod. 1. 3. 30; Kali geniculatum,*
officin. *C. B. P. 8. Moris. f. 5. T. 35; Boerb.*
P. II. 94.

- No. SAMOLUS *Valerandi*, folio oblongo, *J. B. 3. 780; Zannichell. Hist. Pl. Venet. F. 56. n. 2. Boerb. P. I. 202.*
- - Africanus, folio rotundiore; *ramum vid. nostra Tab. XXIII.*
- SANTOLINA, *Africana, Coronopi folio; Ananthocyclus, H. E. p. 27. F. 26; Boerbau. IX.*
- SATUREJA, *fatiua, offic. 1. Moris. f. 11. T. 17. Riv. Monop. Boerb. I.*
- SCABIOSA, *Syriaca, annua, flore coeruleo, Syvan Syriae dicta, Boerb. XIII.*
- - altissima, annua, foliis Agrimoniae non nihil similibus, *H. L. B. p. 541. 13. Moris. f. 6. T. 13. Boerb. XIII.*
- - stellata, folio laciniato, maior; *Hispanica, flore albo, 5. Tabm. p. 441. Moris. 39. f. 6. T. 15. Boerb. XV.*
- - stellata, minor, folio laciniato, flore pallido coeruleo, *Hispanica Clus; Par. Bat. p. 222.*
- - peregrina, rubra, capitulo oblongo, *26. Moris. f. 6. T. 14. Boerb. XIX.*
- - peregrina, capitulo oblongo, flore atropurpureo, odore Zibethi, *H. Eyst. Aest. O. 9. Fol. 10. F. 1. Boerb. XXI.*
- - peregrina, alba, capitulo oblongo.
- - Cretica, capitulo pappos mentiente, *Boerb. XXXIII.*
- SCANDIX, *femine rostrato, vulgaris, 1. Moris. f. 9. T. 11. Riv. Pentap. Boerb. I.*
- SCLAREA, *glutinosa, annua, flore caesio, foliis oblongis, integris, odorem Thymi debiliorem reddentibus; Bocc. Museo, Tab. 13. Horminum, Barell. ic. 200.*
- SCOLYMUS, *Chrysanthemus; Carduus Chrysanthe-*



Samolus Africanus
folio rotundo



1861
1862

- No. *santhemus, lactescens, 3. Moris. f. 7. T. 35; Boerb. I.*
- SCORPIOIDES, folio Bupleuri; Campoides hispida, filiquis minus contortis, *Riv. Tetrap; Scorpioides, 1. Moris. f. 2. T. 11. Boerb. I.*
- - filiqua crassa, instar Litui contorta, *3. Moris; Campoides, Riv. Tetrap; Boerb. III.*
- - Bupleuri folio, corniculis asperis, magis in se contortis, *2. Moris. Boerb. IV.*
- SCORZONERA, laciniatis foliis minoribus, flore luteo; Tragopogon, *Col. Phyt. P. 2. pag. 21; Boerb. III. a, b.*
- SCROPHULARIA, folio Urticae, flore rubro, *1. Moris. f. 5. T. 8. Boerb. I.*
- - annua, Lamii folio, flore luteo, *2. Moris. Riv. Monop. Boerb. II.*
- SECALE, hybernium, *offic. Boerb. I.*
- - vernum, *Boerb. II.*
- SECURIDACA, lutea, maior, *C. B. P. 10. Moris. f. 2. T. 6. Riv. Tetrap. Boerb. P. II. 52.*
- SEDUM, echinatum, flore albo; *Col. Phytob. p. 42. Semperuium 3; Boerb. XII.*
- - Cepaea dictum, floribus purpurascens, *T. 263; conuenit de reliquo cum Cepaea Matth. p. 666. et cum Boerb. XXII.*
- - palustre, flore rubente, *48. Moris. f. 12. T. 8.*
- SENECIO, vulgaris, *offic. Lobel. p. 112. Boerb. I.*
- - Aegyptiacus, folio Matricariae, *Boerb. II.*
- - Africanus, altissimus, Blattariae, vel Hieracii folio, odore Carotae, *Herm. P. B. p. 226. Boerb. IV.*
- - Bonariensis, purpurascens, foliis imis Coronopi, *H. E. T. 257. p. 344.*

- No. SERRATULA, semine ciliari, elegantissimo;
Crupina Belgarum, *Lobel. p. 116*; Jacea, *Garidell. Herm. P. B. 227*; Centaurium ciliare, 3. *Morif. f. 7. T. 25*; *Boerb. V.*
- SESAMUM, veterum, *Matth. p. 330. Lobel. obs. 514. Morif. 2. 282. Riv. Monop.*
- SICYOIDES, Americana, fructu echinato; Bryonoides vulgo dicta; Cucumis *Herm. P. B. p. 133*; *Boerb. P. II. 80.*
- SIDERITIS, aruensis, latifolia, flore albo, barba luteola, *Riv. Monop. Morif. 14. f. 11. T. 12. Boerb. IV.*
- - flosculis vix ex vasculis prominentibus; conuenit cum *J. B. 3. 427. et VI. Clus. H. XLI. an Lusitanica, Boerb. X?*
 - - vulgaris erecta, Betonicae angustiore folio, flore albo, et luteolo.
- SINAPI, Rapi folio, semine ruffo, filiqua glabra, *offic. 1. Morif. Tab. 3. sect. 3. Boerb. I.*
- - Apii folio, filiqua hirsuta, semine flauo; *offic. album, J. B. 2. 858. Boerb. II.*
 - - Indicum, Lactucæ folio, filiqua glabra, *Par. Bat. 230. Boerb. IV.*
 - - filiqua hirsuta, semine nigro, minore, an quernis foliis *Boerb. VIII?*
 - - filiqua hirsuta, semine nigro, maiore.
 - - Chinense, foliis Acanthi, tenuius, et crebrius laciniatis, filiqua glabra, *Boerbau. XIII.*
- SINAPISTRUM, Indicum, pentaphyllum, flore carneo, non spinosum, *Riv. Tetrap. Boerb. II.*
- - Lusitanicum, triphyllum, flore rubro, filiquis corniculatis, *Riv. Tetr. Boerb. III.*
- SISYMBRIUM, folio Absynthii minoris; Accipitrina

No.

pitrina *Caesalp*; *Sophia offic.* *J. B.* 2.
886. *Tabm.* p. 26; *Boerb.* X.

SOLANUM, acinis nigricantibus, *Moris.* 1. f. 13.
T. 1. Matth. 1. p. 754. *Boerb.* IV. offic.

- - acinis puniceis, *Boerb.* V. offic.

- - acinis ex luteo virescentibus, *B. VI. offic.*

- - Guineense, fructu Cerasi magno, niger-
rimo, umbellato, *Boerb.* XVII.

SONCHUS, asper, non laciniatus, offic. 6. *Moris*;
sed fig. 5. f. 7. *T. 2. Boerb.* IV.

- - laevis, laciniatus, latifolius, flore luteo,
offic. 1. *Moris.* f. 7. *T. 3. Boerb.* VI.

- - laevis, laciniatus, latifolius, flore niueo,
5. *Tabm.* p. 499. *Boerb.* VII.

- - asper, laciniatus, Creticus, flore luteo,
capitulis magnis, semine curuo, 10.
Moris. f. 7. *T. 3*; *Chondrilla Cretica*,
J. B. 2. 1022; *Boerb.* X.

- - laevis, in tenuissimas, et plurimas laci-
nias diuisus, flore luteo; similis La-
ctucae montanae, *Moris.* 19. f. 7. *T. 3*;
Boerb. XIV.

- - humilis, folio laeui, integro, oblongo,
glauco, caulem ambiente, cauliculis
pluribus, ramosis singulis.

SPINACHIA, vulgaris, capsula feminis aculeata,
offic. 1. *Moris.* *Matth.* p. 361. *Boerb.* I.

- - capsula feminis non aculeata, *Matth.* p.
362. 2. *Moris.* f. 5. *T. 30. Boerb.* III.

- - Cretica, supina, capsula feminis aculeata,
T; *Beta Cretica*, semine spinoso, 7.
Moris. f. 5. *T. 30. C. B. Prodr.* 57. *Boerb.* IV.

STRAMONIUM, fructu spinoso, rotundo, flore
albo, simplici; *Datura Turcarum H.*
Eyst. Aut. O. 2. F. 12; *Solanum foetidum*,
spinosum, *Matth.* p. 228; *Boerb.* I.

- No. STRAMONIUM, fructu spinoso, oblongo, caule, et flore violaceo, *Boerb. II.*
- - ferox, *Zanon. F. XXIX. Moris. 4. f. 15. T. 2. Boerb. III.*
 - - fructu spinoso, rotundo, flore duplici, violaceo, *9. Moris. f. 15. T. 2. Boerb. IV.*
 - - folio Hyoscyami, flore toto candido, fructu propendente, rotundo, spinis innoxiiis ornato; Stramonium, *H. Eyst. Aut. O. 2. F. 11; Boerb. VI.*
 - - flore albo, duplici, et triplici, *10. Moris.*

T.

TAGETES; Flos Africanus, et eius diuersae species, flore simplici, et pleno; Chrysanthemum *Moris; Boerb. P. I. 114.*

- THLASPI, aruense, filiquis latis, *offic. 12. Moris. f. 3. T. 17. Lobel. obs. 108. Boerb. I.*
- - aruense, Vaccariae folio, incano, maius, *2. Dodon. p. 701. Lobel. obs. 108. 14. Moris. f. 3. T. 17. Boerb. II.*
 - - spicatum, Persicum, perfoliatum, marinum; verum *Dioscoridis*, flore albo, *Zanon. F. 73. Boerb. III.*
 - - Creticum, flore rubente, *21. Moris. f. 3. T. 17; Thlaspidium, Riv. Tetrap; Boerbau. VIII.*
 - - Cappadocicum, flore albo, *H. Eyst. Aest. O. 7. F. 11. F. 2. Boerb. IX.*
 - - Virginianum, foliis Iberidis, amplioribus, et ferratis; Iberis, *2. Moris. f. 3. T. 21; Boerb. XI.*

THLASPIDIUM, Monspeliense, Hieracii folio, hirsuto; Leucoium biscoctatum, *11. Moris. f. 3. T. 9; Boerb. V.*

THLA-

- No. **THLASPIDIUM**, Apulum, spicatum; Leucium asperum, biscutatum, minus, 12. *Moris. f. 3. T. 9*; Jondraba, *Col. 1. p. 285*; *Boerb. VI.*
- TITHYMALUS**, foliis rotundis, non crenatis, 11. *Moris. f. 10. T. 2. Boerb. XIX.*
- - exiguus, procumbens, Chamaesyce dictus, 19. *Moris. f. 10. T. 2. Boerb. XXVI.*
- TORDYLIUM**, maximum, limbo minus granulato, 1. *Moris. f. 9. T. 16*; quod et Sefeli Creticum, maius dicitur; 1. *Riv. Pentap.*
- - minus, limbo granulato, Syriacum, 7. *Moris. Riv. Pentap. Boerb. II.*
- - Narbonense, minus, *Riv. Apulum*; Sefeli Creticum, *Dod. 311*; folia acutiora apud *Moris.* cum nostra planta non conueniunt; *Boerb. III.*
- - Apulum, minimum, *Moris. 6. Boerb. IV.*
- TRIBULUS** terrestris, Ciceris folio, fructu aculeato, *Moris. f. 2. T. 8. Matth. p. 692. Zannich. H. Pl. Ven. F. 222. Boerbau. P. I. 298.*
- - terrestris, maior, Curassauicus, foliis maioribus, quam in praecedente, et nonnihil hirsutis, fructu paulo maiore, sed minoribus spinis armato, *P. B. p. 236.*
- TRIFOLIUM**, Lagopoides, hirsutum, Hispanicum, flore coccineo, folio rotundo; Lagopus latifolius, *Riv. Tetrap*; maximus *Lobel. p. 499. Clus. H. CCXLVI*; 3. *Moris. f. 2. T. 12. J. B. 2. 376.*
- - aruenfe, humile, spicatum; Lagopus, *offic.*

No.

offic. Riv. Tetrap; 8. Moris. f. 2. T. 13.
Boerb. VI.

TRIFOLIUM, humile, flore albo, spica longiore, glumis breuibus, incanis, *Barell. ic. 697.*

- - subterraneum, *Dodart. Memoir. p. 121.*
Riv. Tetrap. 5. Moris. f. 2. T. 14. semen sub terram condens, Boerbau. XII.

- - flosculis albis, in glomerulis oblongis, asperis, ex geniculis florens, *J. B. 2. 378. Boerb. XV.*

- - Lupulinum, minus, 1. et 2. *Moris. f. 2. T. 13. Riv. Tetrap. Boerb. XVI.*

- - stellatum, flore, ex albo rutilante, spica longa, glumis longis, hirsutis, *9. Moris. f. 2. T. 13. Barell. ic. 860. Boerbau. XVII.*

- - caule nudo, glomerulis glabris, *J. B. 2. 379.*

- - maius, Apulum, rotundifolium, glabrum, flore purpurascens, echinato capite, calyce vesicario, *H. Pis. T. 49.*

- - capitulo spumoso, laeui; fragiferum *14. Moris. f. 2. T. 13; glomerulis tomentosis, J. B. 2. 379. Boerb. XXXIII.*

- - Lagopoides, flore albo, seu Alopecurum, spica globosa, *Barell. ic. 1188. Boerb. XXXVI.*

TRITICUM, 2. *Matth. p. 317. offic. Boerb. I.*

- - spica Hordei, *Boerb. II.*

V.

VALERIANELLA, aruensis, praecox, humilior, semine depresso, nudo, umbilicato,

No.

cato, foliis integris, flore dilute coerulefcente, 36. *Morif. f. 7. T. 16*; Locusta, *J. B. Riv. Monop*; Lactuca agnina offic; *Boerb. I.*

VALERIANELLA, aruensis, praecox, humilis, foliis ferratis, flore albo, femine umbilicato, pyramidali, 35. *Morif. f. 7. T. 16. Boerb. II.*

- - femine stellato, folio ferrato, flore albo; Scabiosae femine, 29. *Morif. f. 7. T. 16. Boerb. III.*

- - Cretica, fructu vesicario, *Boerb. IV. c. icon.*

- - cornucopioides, rubra, Indica, 27. *Morif. f. 7. T. 16. Riv. Monop. Boerb. V.*

- - cornucopioides, Mauritanica, flore purpureo, longiore; rubra, Hispanica, *Barell. ic. 741. F. 2.*

VERBENA, tenuifolia; Verbenaca supina, *Dod. 1. 5. 34. p. 150. Boerb. VII.*

VERONICA, minima, repens, *Riv. Monop. an Boerb. XVIII?*

- - Cymbalariae folio, verna, *T. 145*; folio Hederae, *Riv. Monop. Boerb. XX.*

- - folio Chamaedryos, *Riv. l. c. Boerb. XXII.*

- - coerulea, trifido, aut quinquefido folio; Rutae folio, *Riv. Monop. Boerhau. XXIII.*

- - Chia, folio Cymbalariae, verna, flore albo, umbilico virescente, *Boerb. XXV.*

VICIA, Narbonensis, latissima, folio non serrato, *Riv. Tetrap. Boerb. I.*

- - sativa, vulgaris, femine nigro, segetum *Riv. Tetrap. J. B. 2. 310. Boerb. II.*

- - flore albo, siliqua longa, glabra, *Boerhau. V.*

VICIA,

- No. Vicia, Africana, folio, et filiquis latis, hirsutis, propendentibus, flore ochroleuco; *Moris. App. f. 2. T. 21. Boerb. VI.*
- - latifolia, filiqua tumidiore, semine nigrescente, flore maiore, roseo, an *Boerb. VIII?*
 - - Africana, angustifolia, filiqua lata, hirsuta, flore obsoleto purpureo.
 - - angustifolia, filiqua glabra, longiore, et minus depressa, flore purpureo, *Riv. Tetrap.*
 - - Graeca, flore suauerubente, filiquis breuissimis, *Boerb. X.*
 - - minor, monanthemos, et praecox Parisiensium, *T. Inst. 39*; minima *Riv. Tetrap.*
 - - Bengalensis, hirsuta, et incana, filiquis Pisi, *H. L. B. p. 625*; Cracca Bengalensis, *Riv. Tetrap*; *Boerb. V. 2. gen.*
 - - floribus, et filiquis minimis; Cracca minor, *Riv. Tetrap*; *Boerb. X. 2. gen.*
- VIOLEA, tricolor, hortensis, repens; Flos Trinitatis, aut Jacea, *offic. Matth. p. 822*; *Riv. Pentap. Boerb. XI.*
- - bicolor, aruensis, *Riv. Pentap. Boerbau. XVIII.*
- VIRGA AUREA, annua; Conyza Canadensis, acris, alba, Linariae folio, *Bocc. Rar. 86. T. 46*; *Boerbau. III.*
- - maior, foliis glutinosis, et graueolentibus; Conyza maior, *Clus. H. XX. an Lobel. Adu. p. 146.?* *Dod. p. 51. Boerb. XIII.*
 - - minor, foliis glutinosis, et graueolentibus, *T. Inst. 484. Lobel. Adu. p. 146.*
- VISNAGA; Gingidium, *J. B. 3. 2. 31*; *Riv. Pentap. Lobel. p. 419. Boerb. P. I. 49.*

- No. URTICA, minor, *offic. 3. Matth. p. 790. Boerb. III.*
 - - pilulas ferens, Romana, folio ferrato,
offic. 1. Matth. p. 789. Boerb. IV.
 - - pilulifera, Parietariae folio, 5. *Moris. f. 11.*
T. 25. Boerb. V.
 VULNERARIA, pentaphyllos; Anthyllis Hi-
 spanica, *Munting. Aardgew. F. 101. Riv.*
Tetrap; Boerb. IV.
 - - pentaphyllos, flore purpureo; similis
 dereliquo praecedentis. *a. b.*

X.

- X ANTHIUM, Bardanae folio, minore,
Matth. p. 834; Lappa minor, et Bar-
dana, offic. C. P. B; Boerb. I.
 - - maius, Canadense, fructu, aculeis aduncis
 munito, *Moris. 2. f. 15. T. 2. Boerb. II.*
 - - Lusitanicum, spinosum, *Moris. 3. f. 12. T.*
2. Herm. P. B. p. 247. Volck. p. 406. Boer-
hau. III.

- XERANTHEMUM, flore simplici, purpureo,
 maiore, 2. *Moris. f. 6. T. 12. Boerb. I.*
 - - flore simplici, albo; Ptarmica Austriaca
Clusii, Matth. 2. p. 441; Boerb. III.
 - - flore albo pleno, et purpureo pleno,
Boerb. II. et IV.

Z.

- Z AZINTHA; Cichorium verrucarium, *Matth.*
p. 389; Moris. Intybus, et Endiuia, 4.
f. 7. T. 1; Boerb. P. I. p. 90.



SUPPLENDA.

- p. 8. Apocynum, erectum, latifolium, Zeylanicum, maximum, floribus umbellatis, albis, *Hort. Carolsr. p. 8. n. 73.*
- p. 30. Lauendula, folio longiori, tenuius, et elegantius dissecto, spica multiplici, *Commel. Rar. 27. Boerb. VII. b.*
- p. 60. Campanula, Persicae folio, flore coeruleo, pleno, *B. III. b.*
Campanula, hortensis, folio oblongo; Viola Mariana
Dod. 2. 1. 8; Boerb. XXIV. b.
- p. 86. Lychnis coronaria, flore rubro, pleno, *Boerb. III. b.*
- p. 87. Lychnis, Ocymastri facie, flore viridi, *Par. Bat. p. 199. Boerbau. LXXXI.*
- p. 60. l. 16. 18. 22. p. 61. l. 26. p. 105. l. 14. 17. 19. sub omnium finem, adde: *bienn.*
- p. 28. l. 9. adde: Jacea, *Boerb. XV. p. 42. l. 14.* adde: Aliam hujus Salviae *Boerb. XV. iconem vid. H. A. P. II. Fig. 92. p. 51. l. 17.* adde: *Boerb. II. l. 18;* adde: *Boerb. III. p. 107. l. 15.* adde: *Boerb. II.*

CORRIGENDA.

- p. 30. l. 8. deleatur: *Commel. Rar. 27. l. 33.* lege: *Boerb. III.* pro II.
- p. 46. l. 27. pro *H. A. P. I. F. 14.* lege: minor, pene aphyllus. p. 59. l. 16. lege: *Boerb. I.* pro II. p. 63. l. 12. lege: *Boerb. VI.* pro IV. p. 71. l. 7. lege: *Stoechas*, pro *Staechas*. p. 85. l. 18. lege: *Tab. XVI.* pro XV. p. 89. l. 16. lege: *Mentha Boerb. III. p. 113.* in locum Vicinarum refer. *Craccam p. 67.*

C I T A N T U R

Tabula I. pag. 1.

II. p. 2.

III. p. 3.

IV. p. 3.

V. p. 8. et 28.

VI. p. 11.

VII. p. 13.

VIII. p. 17.

IX. p. 24.

X. p. 24.

XI. p. 32.

XII. p. 32.

Tabula XIII. pag. 36.

XIV. p. 37.

XV. p. 42.

XVI. p. 85.

XVII. p. 96.

XVIII. p. 107.

XIX. p. 108.

XX. p. 122.

XXI. p. 133.

XXII. p. 135.

XXIII. p. 162.

XXIV. p. 31.

Walther, Augustin Friedrich, / Krüger, Johann Gottfried, / Schubert, C. F.

Designatio Plantarum Quas Hortus August. Friderici Waltheri Pathologiae
Professoris Lipsiensis Complectitur Accedunt Novae Plantarum Icones XXIV

Lipsiae 1735

Bamberg, Staatsbibliothek -- Bip.Bot.o.66
urn:nbn:de:hbz:12-bsb11428340-9
VD18 11638222